

مقایسه اثر افشره هیدروالکلی پسته کوهی (*Pistacia Atlantica Kurdica*) و داروی

فلووکسامین بر افسردگی ناشی از استرس بی حرکتی در موش صحرایی نر

*فاطمه بابائی فر^۱(MSc) - دکتر مهدی محمدزاده^۲(MD) - دکتر فرین بابائی^۲(MD)

*نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

پست الکترونیک: Fatemehbabaei706@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۱۰/۱۸ تاریخ ارسال: ۹۶/۰۲/۱۲ تاریخ پذیرش: ۹۶/۰۳/۳۱

چکیده

مقدمه: امروزه استفاده از فرآورده‌های گیاهی به عنوان مکمل یا جانشین داروهای شیمیایی در پیشگیری یا درمان برخی اختلال‌های روانی با عوارض جانبی و هزینه درمانی کم، رواج یافته است.

هدف: مقایسه اثر داروی فلووکسامین با افشره پسته کوهی بر اختلال افسردگی و تغییر بافت هیپوکمپ ناشی از القای استرس بی حرکتی در موش‌های صحرایی نر.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی ۳۰ رأس موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی ۱۷۵ گرم به ۵ گروه شش‌تایی تقسیم شدند. القای استرس بی حرکتی با رسترینر انجام شد. در این آزمایش تیمار موش‌ها در مدت سه هفته با افشره هیدروالکلی پسته کوهی با غلظت ۴۰۰ mg/kg و داروی فلووکسامین با غلظت ۱۲۰ mg/kg از راه گاوآز انجام شد و افسردگی جانوران با آزمون آویزان ماندن دم بررسی شد. همچنین، میزان مالون‌دی‌آلدهید و آنزیم کاتالاز در بافت هموزنه هیپوکمپ و سطوح کورتیکوسترون و قند در سرم خون اندازه‌گیری شد. واکاوی داده‌ها با نرم افزار SPSS آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و پس‌آزمون تعقیبی توکی انجام شد.

نتایج: افزایش معنی‌دار زمان بی حرکتی، مالون‌دی‌آلدهید، کورتیکوسترون، قندخون و کاهش آنزیم کاتالاز و آسیب بافت هیپوکمپ در گروه شاهد دیده شد. در حالی که کاهش معنی‌دار در زمان بی حرکتی و افزایش فعالیت کاتالاز و کاهش قندخون، کورتیکوسترون و مالون‌دی‌آلدهید و آسیب ندیدن در بافت هیپوکمپ گروه تیمار شده با افشره پسته کوهی بوجود آمد. همچنین در گروه تیمار شده با فلووکسامین به تنهایی یا مصرف هم‌زمان با افشره پسته کوهی افزایش زمان بی حرکتی، کاهش مالون‌دی‌آلدهید، کورتیکوسترون و فعالیت کاتالاز نشان داده شد. همچنین، مصرف هم‌زمان دارو با افشره گیاهی سبب کاهش معنی‌دار سطح قندخون شد.

نتیجه‌گیری: افشره هیدروالکلی پسته کوهی یا داروی فلووکسامین افزون بر کاهش افسردگی القاء شده با استرس بی حرکتی باعث بهبود شرایط آنتی‌اکسیدانی در بافت هیپوکمپ در گروه تیمار شد.

کلید واژه‌ها: افسردگی/بی حرکتی/پسته/فلووکسامین/موش‌های صحرایی/هیپوکمپ

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیست و شش، شماره ۱۰۳، صفحات: ۱۳-۱

مقدمه

بیماری‌ها خواهد داشت (۳). نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد قرار گرفتن فراروی بیش از حد استرس سبب القای افسردگی و تغییر رفتار، یادگیری و فرآیندهای بیوشیمی می‌شود (۴). در افسردگی ناشی از استرس بی حرکتی، میزان تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) در مغز افزایش می‌یابد (۵). ROS می‌تواند به واسطه واکنش‌های آنتی‌اکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی از بدن زدوده شوند (۶ و ۷). ناحیه هیپوکمپ با حساسیت بالا به استرس، جزئی از ساختار لیمبیک است که به طور گسترده در افراد دچار افسردگی مورد حمله گونه‌های فعال اکسیژن قرار می‌گیرد. کاهش حجم هیپوکمپ و آتروفی و تغییر در فاکتور BDNF در افراد افسرده استوانش شده

امروزه اختلال عصبی مانند افسردگی در زمره شناخته شده‌ترین اختلال‌هایی هستند که همواره گریبان‌گیر انسان بوده و تلاش زیادی برای شناخت عوامل ایجاد کننده، درمان و کنترل آنها صورت گرفته است. افسردگی می‌تواند با تاثیر عوامل استرس‌زا در انسان ایجاد شود که کمابیش ۷٪ مردم دنیا به آن دچار و گمانه‌آبتلای افراد به آن نزدیک ۲۰٪ است. این اختلال روانی با علائمی مانند علائم جسمی، رفتاری، شناختی، ادراکی و فیزیولوژی همراه است و از نشانه‌های جسمانی آن می‌توان از کاهش اشتها، اختلال کارکرد جنسی و اختلال خواب نام برد (۱، ۲). برپایه پیش‌بینی سازمان جهانی بهداشت افسردگی در سال ۲۰۲۰ دومین جایگاه را در

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

۲. استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

می‌کنند (۹). با رویکرد به سیر افزایشی این اختلال روانی در جامعه، استفاده از فراورده‌های گیاهی به جای داروهای شیمیایی با عوارض جانبی کمتر برای درمان پیشنهاد می‌شود، هر چند مصرف زیاد این فراورده‌ها نیز ممکن است اثر سوء داشته باشد. در برخی مطالعات به نقش اسیدهای چرب ضروری و ترکیبات آنتی‌اکسیدان در درمان اختلالات مختلف عصبی با پتانسیل درمانی بالا اشاره شده است (۲). پسته‌کوهی (*Pistacia atlantica kurdica*) میوه درخت بنه است. این درخت از خانواده آناکاردیسه (*Anacardiaceae*) در نواحی کوهستانی مناطق خشک و نیمه‌خشک به ویژه دامنه‌ای زاگرس دیده می‌شود. در پزشکی سنتی، بخش‌های مختلف بنه، مانند رزین، پوست، و میوه آن اثر درمانی بر بافت‌های کبدی، کلیه، قلب، اعصاب و دستگاه تنفسی دارد. افشره پسته‌کوهی سرشار از اسیدهای چرب غیراشباع اسید اولئیک و لینولئیک، ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی، ویتامین A، B و D است و ویژگی آنتی‌اکسیدانی قوی دارد (۱۶). فلاونوئیدها جز ترکیبات پلی‌فنولی، اثر دارویی متعددی مانند خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالا دارند (۴). برپایه مطالعات پیشین مصرف مواد محتوی آنتی‌اکسیدان می‌تواند از بروز افسردگی پیشگیری کند یا سبب بهبود عوارض ناشی از افسردگی شود (۲۱). بالا بودن میزان مصرف پسته‌کوهی در مناطق محلی و کمی پژوهش‌های انجام شده بر روی آن و سرشار بودن از ترکیبات آنتی‌اکسیدان دلیل انتخاب پسته‌کوهی برای این مطالعه بود. چون تا زمان انجام این مطالعه، مطالعه‌ای مبنی بر تاثیر افشره هیدروالکلی پسته‌کوهی بر افسردگی انجام نشده بود، هدف این پژوهش، سنجش اثر داروی فلووکسامین با افشره پسته‌کوهی بر اختلال افسردگی و بافت ناحیه هیپوکمپ ناشی از القای استرس بی‌حرکتی در موش‌های صحرایی نر بود.

مواد و روش‌ها

حیوانات مورد آزمایش: از ۳۰ رأس موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی ۱۷۵ گرم تهیه شده از خانه حیوانات دانشکده علوم دانشگاه ارومیه استفاده شد. حیوانات در شرایط استاندارد با رعایت دمای 22 ± 2 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی ۴۰٪ با چرخه نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت

است (۸). کاهش حجم هیپوکمپ باعث اختلال در حافظه و خلق و خوی افراد افسرده می‌شود. همچنین، در افراد افسرده پیاپی محور HPA بیش فعال می‌شود و باعث افزایش میزان کورتیزول و هورمون‌های گلوکوکورتیکوئیدی می‌شود. افزایش گلوکوکورتیکوئیدها در کاهش بقای سلول‌های عصبی به اثبات رسیده است (۵).

مکانیسم ابتلای به افسردگی بسیار پیچیده است و عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، ژنتیکی و بیوشیمی در آن دخیل هستند (۹). در سال ۱۹۵۰ نخستین نسل داروهای ضدافسردگی که بسیاری از آنها شیمیایی سنتتیک بودند مانند ضدافسردگی سه حلقه‌ای و مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین، شناسایی شدند (۱۰). مصرف بیش از حد داروهای ضد افسردگی نسل دیرینه‌تر مانند، سه حلقه‌ای مهارکننده‌های مونوآمین‌اکسیدازها (MAOI) می‌تواند کشنده باشد در حالی که نسل جدیدتر مهارکننده‌های انتخابی باز جذب سروتونین (SSRIs) نسبت به آنها مناسب و کاربردی هستند (۱۱). SSRIs با افزایش میزان سروتونین، نوراپی‌نفرین، گلوتامات و فاکتور نوروتروفیک برگرفته از مغز (BDNF) با بستن گیرش دوباره این انتقال‌دهنده‌های عصبی در پایانه‌های پیش‌سیناپسی عمل می‌کنند گرچه افزایش مونوآمین‌ها پس از تجویز داروهای ضدافسردگی پس از چند هفته تجویز پیاپی رخ می‌دهد (۱۲). داروی فلووکسامین جزء داروهای خانواده‌ی SSRIs با نام تجاری Luvox با نیمه‌عمر نزدیک ۱۵ تا ۲۰ ساعت است. این دارو ساختاری سراسر متفاوت از سایر SSRIsها دارد.

کاهش فعالیت آنزیم مونوآمین‌اکسیداز (MAO)، کاهش انتشار سروتونین به فضای سیناپسی و افزایش پیش‌سیناپسی جذب دوباره سروتونین توسط سلول‌های عصبی پیش‌سیناپسی از دلایل کاهش سروتونین است و در بیماران افسرده کاهش سروتونین دیده می‌شود (۱۳). سروتونین از اسیدآمینو-ال-تریپتوفان در نورون‌های هسته رافعه مغز میانی تولید می‌شود و از مهم‌ترین انتقال‌دهنده‌های عصبی است (۱۴، ۱۵). مردم گرایش چندانی به استفاده از داروهای ضدافسردگی ندارند و نزدیک ۶۰٪ افراد درمان‌شونده با دارو به دلیل عوارض جانبی و هزینه اقتصادی آن پس از مدتی مصرف، دارو را قطع

تاریکی نگهداری شدند و آب و غذا به صورت آزاد در اختیار آنها قرار گرفت. در تمامی مراحل آزمایش اصول اخلاق پژوهشی با کمترین آزار در مورد حیوانات رعایت شد. حیوانات به صورت تصادفی به پنج گروه شش‌تایی تقسیم شدند شامل:

گروه کنترل: دریافت تنها آب مقطر با گاوآژ بدون القای استرس بی‌حرکتی

گروه شاهد: بدون دریافت هیچ دارو یا افشره همراه با القای استرس بی‌حرکتی

گروه پسته‌کوهی: دریافت افشره پسته‌کوهی با غلظت ۴۰۰mg/kg به صورت خوراکی همراه با القای استرس بی‌حرکتی

گروه فلووکسامین: دریافت فلووکسامین با غلظت ۱۲۰mg/kg به صورت خوراکی همراه با القای استرس بی‌حرکتی

گروه پسته‌کوهی + فلووکسامین: دریافت افشره پسته‌کوهی با غلظت ۴۰۰mg/kg و داروی فلووکسامین با غلظت ۱۲۰mg/kg به صورت دهانی همراه با القای استرس بی‌حرکتی

القای استرس بی‌حرکتی: استرس بی‌حرکتی با رستریز القاء شد. موش‌ها با جا گرفتن در این محفظه تا حد امکان توان حرکت خود را از دست می‌دادند. موش‌ها روزانه به مدت ۲ ساعت (۹ تا ۱۱ صبح) در ۲۱ روز داخل این محدودکننده‌ها قرار می‌گرفتند. پس از پایان اعمال استرس، حیوانات به قفس‌های خود بازگردانده می‌شدند و پس از نیم ساعت استراحت، افشره یا دارو به صورت خوراکی با گاوآژ تجویز می‌شد (۱۷).


روش افشره‌گیری: پسته‌کوهی پس از تهیه از منطقه دالاهوی استان کرمانشاه و درست شمردن جنس و گونه آن توسط متخصص بیوسیتماتیک گیاهی گروه، در سایه خشک و با آسیاب برقی پودر شده و ۵۰۰ گرم پودر بدست آمده به مدت ۴۸ ساعت در ۴ لیتر حلال هیدروالکلی (با نسبت ۷۰ اتانول به ۳۰ آب) خیسانده شد. سپس، از قیف بوختر برای صاف کردن و برای تبخیر اتانول آن از دستگاه روتاری در شرایط خلاء استفاده شد. سپس، مایع تغلیظ شده در پلیت‌های شیشه‌ای

برای کریستالیزه شدن داخل آون با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد گذاشته شد. ماده نهایی به عنوان افشره پسته‌کوهی برای تیمار حیوانات بکار گرفته شد (۱۸). برپایه مطالعات پیشین پسته‌کوهی در غلظت ۴۰۰mg/kg خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالایی دارد بنابراین، این غلظت برای مطالعه انتخاب شد (۳۶).
روش سنجش افسردگی: برای بررسی اختلال افسردگی در موش‌های تیمار شده از آزمون آویزان ماندن دم استفاده شد. نخست برای بررسی افسردگی موش تیمار شده با یک بند از دم به سقف یک چارچوب فلزی شیشه‌ای بسته شد. سپس، آزمون با یک فعالیت حرکتی شدید موش آغاز شده و به دنبال آن موش از دم آویخته شده کاملاً به وضعیت بی‌حرکتی، غیرفعال و بدون واکنش رسید. مدت بی‌حرکتی با دستگاه کرونومتر اندازه‌گیری شد. کل زمان آزمون آویزان ماندن موش ۶ دقیقه بود که دو دقیقه اول برای سازگاری حیوان با شرایط در نظر گرفته شد. در چهار دقیقه پسین، گرایش زمانی که حیوان هیچ حرکت و عکس‌العملی از خود نشان نمی‌داد با کرونومتر به عنوان زمان بی‌حرکتی اندازه‌گیری و ثبت شد (۱۹).

سنجش بیوشیمی و هورمونی: جهت تهیه نمونه سرم خون، پس از بیهوش کردن حیوان، قفسه سینه شکافته و از قلب موش خونگیری شد. سپس، نمونه‌های خونی تهیه شده به مدت ۱۰ دقیقه با ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. در نمونه‌های سرمی خون موش‌ها میزان کورتیکوسترون به روش الکتروکیمیلومینسنس و نیز میزان گلوکوکورتیکوئیدها، همچنین بافت مغزی خارج شده از بدن موش‌ها برای سنجش بیوشیمی به فریزر ۷۰ درجه سانتی‌گراد ترابرده شد. برای سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدی بافت مغز، سطح مالون‌دی‌آلدهید (MDA) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. درجه پراکسیداسیون لیپیدها بر مبنای میزان تشکیل مالون‌دی‌آلدهید به کمک ضریب جذبی MDA در طول موج ۵۳۵ نانومتر محاسبه و به صورت نانومول بر گرم بافت غیرخشک (nmol/g tissue) گزارش شد (۲۰). همچنین، میزان فعالیت کاتالاز در مغز برپایه توانایی آن در تجزیه پراکسیداسیون هیدروژن به روش Aebi تعیین شد. تجزیه H₂O₂ با کاهش

نتایج

بررسی آماری نتایج نشان داد گروه شاهد در مقایسه با گروه کنترل در مدت بی حرکتی در آزمون معلق ماندن دم اختلاف معنی دار داشت ($p \leq 0/001$). از سویی اختلاف سراسر معنی دار بین گروه تیمار شده با افشره پسته کوهی با غلظت 400 mg/kg در سنجش با گروه شاهد در مدت بی حرکتی طی آزمون معلق ماندن دم دیده شد ($p \leq 0/001$). گروه پسته کوهی با گروه کنترل اختلاف معنی دار نداشت. در بررسی اثر داروی فلووکسامین، در گروه تیمار با دارو با غلظت 120 mg/kg در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی دار ($p \leq 0/001$) و در مقایسه با گروه شاهد، اختلاف معنی دار ($p \leq 0/01$) داشت. در گروه تیمار همزمان افشره پسته کوهی با داروی فلووکسامین، مدت بی حرکتی به حد گروه کنترل نزدیک شد. گروه دریافت کننده همزمان دارو و افشره در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی دار ($p \leq 0/001$) نشان داد (شکل ۱).



شکل ۱. مدت زمان بی حرکتی در آزمون آویزان ماندن دم در گروه های تحت تیمار. *** اختلاف معنی دار در سطح $0/001$ در مقایسه با گروه کنترل ($p \leq 0/001$). #### اختلاف معنی دار در سطح $0/001$ در مقایسه با گروه شاهد ($p \leq 0/001$). # اختلاف معنی دار در سطح $0/05$ در مقایسه با گروه شاهد ($p \leq 0/05$). * اختلاف معنی دار در سطح $0/05$ در مقایسه با گروه کنترل ($p \leq 0/05$).

داروی فلووکسامین یا با افشره پسته کوهی، غلظت هورمون کورتیکوسترون در حیوانات تحت استرس بی حرکتی را به حد گروه کنترل بازگرداند. همچنین، تجویز همزمان فلووکسامین و افشره پسته کوهی میانگین غلظت هورمون کورتیکوسترون


جذب در مدت ۳۰ ثانیه در طیف جذبی 240 nm بررسی و به صورت U/mg tissue بیان شد (۲۱).

مطالعات بافت شناسی: پس از خارج کردن بافت مغزی آن را در فرمالین ۱۰٪ قرار داده و بعد از تثبیت نمونه ها، مراحل تهیه بافتی یعنی آب گیری، شفاف سازی و آغشتگی با پارافین انجام شد. سپس، بعد از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین (H&E) نواحی CA1 و CA3 هیپوکامپ با میکروسکوپ نوری بررسی شد.

آنالیز آماری: نتایج با نرم افزار SPSS (نسخه ۲۲) و روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه (One way ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی (Tukey) با ضریب اطمینان $p \leq 0/05$ انجام شد. داده ها بر حسب میانگین \pm انحراف معیار آنها گزارش و نمودارها با نرم افزار Excell ترسیم شد.

ارزیابی میزان کورتیکوسترون در حیوانات مورد مطالعه نشان داد غلظت این هورمون در حیواناتی که تنها زیر استرس بی حرکتی (گروه شاهد) بودند به طور معنی دار ($p \leq 0/001$) در مقایسه با گروه کنترل افزایش پیدا کرد. تیمار حیوانات با


در موش‌های تحت تیمار را در مقایسه با گروه شاهد کاهش داد ($p \leq 0/001$) و آن را به حد هورمون کورتیکوسترون



شکل ۲. میزان کورتیکوسترون در گروه‌های مورد مطالعه. *** اختلاف معنی‌دار در سطح ۰/۰۰۱ در مقایسه با گروه کنترل ($p \leq 0/001$). #### اختلاف معنی‌دار در سطح ۰/۰۰۱ در مقایسه با گروه شاهد ($p \leq 0/001$).

فلووکسامین قند خون را در حیوانات تحت استرس بی‌حرکتی به‌طور معنی‌دار ($p \leq 0/001$) در مقایسه با گروه شاهد کاهش داد. تجویز همزمان پسته کوهی و داروی فلووکسامین تأثیر بیشتری بر کاهش میزان قندخون گذاشت و میزان قندخون را در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنی‌دار ($p \leq 0/001$) کاهش داد (شکل ۳).

اندازه‌گیری میزان قندخون در حیوانات نشان داد این شاخص در گروه تحت استرس بی‌حرکتی (گروه شاهد) در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنی‌دار افزایش یافته است ($p \leq 0/001$). تجویز داروی فلووکسامین تأثیر معنی‌داری در کاهش میزان قندخون در مقایسه با گروه کنترل نشان نداد. در حالی که تجویز افشره پسته کوهی به تنهایی یا همراه داروی




شکل ۳. تغییر میزان قندخون در گروه‌های مورد مطالعه. *** اختلاف معنی‌دار در سطح ۰/۰۰۱ در مقایسه با گروه کنترل سالم ($P \leq 0/001$). #### اختلاف معنی‌دار در سطح ۰/۰۰۱ در مقایسه با گروه کنترل بیمار ($P \leq 0/001$).

گروه شاهد در مقایسه با گروه کنترل است. همچنین، تجویز فلووکسامین میزان پراکسیداسیون لیپیدها را در بافت مغزی

سنجش میزان مالون‌دی‌آلدهید در بافت مغزی نشان‌دهنده افزایش معنی‌دار ($p \leq 0/001$) میزان پراکسیداسیون لیپیدی در

معنی دار ($P \leq 0/001$) کاهش داد تا به حد گروه کنترل رسید (شکل ۴).


موش‌های تحت تیمار در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی دار ($p \leq 0/01$) افزایش و در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی دار ($p \leq 0/001$) کاهش داد. این در حالی است که تجویز افشره پسته کوهی یا تنهایی یا همزمان با داروی فلووکسامین میزان مالون دی‌آلدهید را در مقایسه با گروه شاهد بطور



شکل ۴. تغییرات میزان مالون دی‌آلدهید در گروه‌های تحت تیمار. *** اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰۰۱ در مقایسه با گروه کنترل ($p \leq 0/001$). ### اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰۰۱ در مقایسه با گروه شاهد ($p \leq 0/001$). ** اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰۱ در مقایسه با گروه کنترل ($p \leq 0/01$).

آنزیم را به حد گروه کنترل رساند. تجویز همزمان فلووکسامین و افشره پسته کوهی میانگین غلظت آنزیم کاتالاز را در بافت مغزی موش‌های تحت استرس بی‌حرکتی به طور معنی دار ($p \leq 0/001$) در مقایسه با سایر گروه‌ها افزایش داد.

با توجه به شکل ۵، غلظت کاتالاز در بافت مغز موش‌های تحت استرس بی‌حرکتی (گروه شاهد) بطور معنی دار ($p \leq 0/05$) در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت. همچنین، تجویز فلووکسامین یا افشره پسته کوهی در حیوانات تحت استرس منجر به بهبود غلظت آنزیم کاتالاز شد و سطح این



شکل ۵. تغییرات میزان آنزیم کاتالاز در بین گروه‌های مورد مطالعه. * اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰۵ در مقایسه با گروه کنترل ($p \leq 0/05$). # اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰۵ در مقایسه با گروه شاهد ($p \leq 0/05$). ## اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰۱ در مقایسه با گروه شاهد ($p \leq 0/01$). ### اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰۰۱ در مقایسه با گروه شاهد ($p \leq 0/001$). *** اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰۰۱ در مقایسه با گروه کنترل ($p \leq 0/001$).


آمون شامل نواحی CA1, CA2, CA3, CA4 است (شکل ۶). نتایج بررسی میکروسکوپی نشان داد القای

یافته‌های بافتی: ناحیه هیپوکمپ موش صحرایی از دو ناحیه شاخ آمون و شکنج دنداندار تشکیل شده است که ناحیه شاخ


سلول است که در طی آسیب‌های شدید به سلول ایجاد می‌شود و فرایندی غیرفعال است که در نبود ATP رخ می‌دهد. نکروز سلولی را به صورت هسته‌های هیپرکروماتین و کوچک شده و دفرمه می‌توان مشاهده کرد (نشانه پیکان‌های کوتاه) سلول‌های آسیب دیده هسته آشکار ندارند و شکل سلول از گرد به دوکی یا مثلثی بدون محدوده مشخص تغییر می‌یابد. در حالی که گروه تیمار شده با افشره پسته‌کوهی از نظر ساختار بافت‌شناسی شبیه گروه کنترل است و هسته نوروها یوکروماتین، کروی تا بیضی شکل و هستک مشخص دارد (علامت پیکان‌های بلند).

استرس بی‌حرکتی پس از ۲۱ روز همراه با نکروز سلول‌ها و کاهش تراکم سلولی در نواحی CA1, CA3 گروه شاهد همراه بود. در حالی که در گروه تحت تیمار با افشره پسته‌کوهی افزون بر افزایش میزان تراکم سلولی، نکروز سلولی در نواحی هیپوکمپ دیده نشد. در گروه تحت تیمار با داروی فلووکسامین یا همراه افشره پسته‌کوهی در ناحیه CA3 نکروز سلولی به میزان کمتر دیده شد در حالی که در ناحیه CA1 کاهش آسیب سلول‌ها و افزایش تراکم سلولی به ویژه در ناحیه CA1 دیده می‌شد. اما افزایش تراکم سلولی در ناحیه CA3 تنها در گروه تحت تیمار افشره پسته‌کوهی همراه با داروی فلووکسامین چشمگیر بود. نکروز، مرگ پاتولوژیک


شکل ۶. نمای کلی از هیپوکمپ موش صحرایی سالم ناحیه هیپوکمپ با دو بخش شاخ آمون (نواحی CA1-CA4) و شکنج دندانه‌ای (DG). (رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین؛ درشت نمایی 4x)



شکل ۷. مقاطع عرضی ناحیه CA1 در گروه‌های تحت تیمار: نمایی از سلول‌های ناحیه CA1 در گروه کنترل (A). گروه تحت استرس بی‌حرکتی (شاهد) بدون هیچ تیمار (B). گروه تحت تیمار داروی فلووکسامین (C). گروه تحت تیمار با افشره پسته‌کوهی (D). گروه تحت تیمار همزمان افشره پسته‌کوهی با داروی فلووکسامین (E). نکروز سلولی به صورت هسته‌های دفرمه شده قابل مشاهده است (پیکان کوتاه) و سلول‌های سالم کروی و دارای هستک مشخص هستند (پیکان بلند). (رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین؛ درشت نمایی 40x)



شکل ۸. مقاطع عرضی ناحیه CA3 در گروه‌های مورد مطالعه: نمایی از سلول‌های ناحیه CA3 در گروه کنترل (A). گروه شاهد (B). گروه تحت تیمار با داروی فلووکسامین (C) گروه تحت تیمار با افشره پسته‌کوهی (D). گروه تحت تیمار همزمان افشره پسته‌کوهی با داروی فلووکسامین (E). نکروز سلولی به صورت هسته‌های هیپرکروماتین، کوچک شده و دفرمه در سلول‌های نرونی قابل مشاهده است (علامت پیکان کوتاه). در گروه تیمار شده با افشره پسته‌کوهی از نظر ساختار بافت‌شناسی شبیه گروه کنترل است، هسته سلول‌های نرونی یوکروماتین، کروی تا بیضی شکل و دارای هستک مشخص هستند (علامت پیکان بلند) (رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین؛ درشت‌نمایی (40x)).



بحث و نتیجه‌گیری

زیاد شده و منجر به افزایش هورمون کورتیکوسترون و تغییر میزان این هورمون باعث آسیب بافت ناحیه هیپوکمپ و تخریب سلولی می‌شود (۲،۱۱). نتایج برخی مطالعات نشان داده‌اند القای استرس منجر به افزایش سطح هورمون کورتیکوسترون و افزایش این هورمون باعث افزایش گلیکوژنولیز و گلوکوئوژنز هم می‌شود و در نتیجه میزان قندخون نیز افزایش می‌یابد و این هورمون احتمال دارد با افزایش قندخون و تشدید شرایط پراکسیداسیونی در سلول‌های عصبی اثر ویرانگر بر بافت هیپوکمپ داشته‌باشد (۲۵). نتایج مطالعات بافت‌شناسی ناحیه هیپوکمپ نشان داد که القای استرس بی‌حرکتی منجر به نکروز سلولی در ناحیه CA3 و CA1 هیپوکمپ در گروه شاهد می‌شود. همانطور که مطالعات نشان داده‌اند القای استرس باعث آسیب بیشتر سلول‌ها در ناحیه CA3 می‌شود که با نتایج بافت‌شناسی مطالعه حاضر مطابقت دارد (۸). نتایج این مطالعه که نشان دهنده کاهش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بافت مغزی و افزایش سطح کورتیکوسترون و پراکسیداسیون لیپیدی در موش‌های گروه شاهد تحت استرس بی‌حرکتی است و افزایش میزان

در مطالعه ما آثار مقایسه‌ای افشره پسته‌کوهی و فلووکسامین و عوارض ناشی از آن بررسی شد. در این بررسی نشان داده شد القای استرس بی‌حرکتی در موش‌های صحرایی نر به افزایش هورمون کورتیکوسترون، قندخون و کاهش توان آنتی‌اکسیدانی و افزایش پراکسیداسیون سلول‌های مغزی و در پایان القای افسردگی در موش‌ها می‌انجامد. تجویز افشره پسته‌کوهی و فلووکسامین به تنهایی یا تجویز همزمان آنها در موش‌های تحت استرس بی‌حرکتی باعث کاهش برخی آسیب‌های ناشی از استرس شد.

نتایج مطالعات پژوهشگران نشان داده‌اند که استرس القای افسردگی می‌انجامد (۲) و این فرایند می‌تواند ناشی از نبودن ترازمندی در سیستم نوروترانسمیتری مغز باشد (۵). بافت مغز به دلایل بیوشیمیایی و فیزیولوژی در برابر استرس اکسیداتیو آسیب‌پذیر است و استرس باعث تغییر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدی می‌شود. نبودن ترازمندی بین این دو باعث آسیب مغز و منجر به اختلال عصبی مانند افسردگی می‌شود (۲۴). در افسردگی، فعالیت محور HPA

عصبی نسبت به ناحیه CA3 هیپوکمپ می‌شود. در مطالعه ما در ناحیه CA3 آسیب دیده شد شاید با دوز بالاتر و مدت بیشتر تیمار با فلووکسامین در این ناحیه هم بازسازی صورت گیرد. پژوهشگران در نتایج مطالعات نشان دادند افزایش سطح مونوآمین‌ها پس از چندین هفته تجویز پیاپی داروهای ضدافسردگی رخ می‌دهد و می‌تواند میزان MDA و مدت بی‌حرکتی را به حد گروه کنترل برساند (۱۲). در سال ۲۰۱۵ نتایج مطالعات Kerise Lytlea و همکاران نشان داد تجویز فلووکسامین در شرایط استرس باعث افزایش بی‌حرکتی در آزمون شنای اجباری می‌شود. بنابراین، در شرایط استرس کمترین تاثیرگذاری را داشته و رفتار شبه افسردگی در حیوانات تحت تیمار هم دیده شد (۳۰).

تیمار حیوانات تحت استرس بی‌حرکتی با افشره پسته‌کوهی اثر بهبود در کنترل افسردگی را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد. یافته‌های بیوشیمی نشان دادند افشره پسته‌کوهی باعث بهبود ظرفیت آنتی‌اکسیدانی مغز در حیوانات تحت استرس می‌شود و در نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در تاثیر بخشی افشره پسته‌کوهی به اثبات رسیده است (۱۷). در سال‌های واپسین به اثر ضدافسردگی فلاونوئیدها پرداخته شده است و فلاونوئیدها بر سیستم آنتی‌اکسیدانی و محور HPA اثرگذار بوده‌اند. در مطالعات Leelavathi و همکاران در سال ۲۰۱۴ اثر فلاونوئیدها در درمان افسردگی نیز گفته شده است (۳۱). فلاونوئیدها با اثر آنتی‌اکسیدانی و برانگیختن سیگنال‌های درون سلولی باعث افزایش تسهیل محافظت عصبی می‌شوند و به صورت ضدافسردگی عمل می‌کنند (۳۲). بنابراین، انتظار می‌رود اثر ضدافسردگی افشره پسته‌کوهی مربوط به ترکیب فلاونوئیدی موجود در آن باشد هرچند تاکنون مطالعه‌ای مبنی بر اثر ضدافسردگی افشره پسته‌کوهی در حیوانات تحت استرس بی‌حرکتی انجام نشده است. در مطالعات بافت‌شناسی نیز پیشگیری از آسیب در هر دو ناحیه CA1 و CA3 بافت هیپوکمپ دیده شد و وضعیت سلول‌ها در حد گروه کنترل دیده شد که تایید کننده اثر ضدافسردگی افشره پسته‌کوهی است. نتایج این پژوهش با یافته‌های مطالعات پیشین هم‌خوانی دارد (۳۳). در مطالعه ما تجویز همزمان افشره

بی‌حرکتی در آزمون آویزان ماندن دم که نشانگر افسردگی است با نتایج بررسی‌های پژوهشگران دیگر مطابقت دارد. در مطالعه کنونی همزمان با القای استرس بی‌حرکتی و تجویز فلووکسامین، نتایج مطالعات رفتاری نشان از افزایش مدت بی‌حرکتی در مقایسه با گروه کنترل دارد اما نسبت به گروه شاهد کاهش نشان داد. تاثیر بهبود این دارو با جلوگیری از بازجذب سروتونین، مهار آنزیم منوآمین‌اکسیداز (MAO) و افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی مغز از تخریب سلول‌های سروتونورژیک جلوگیری می‌کند و این به شیوه‌ای است که افزایش غلظت کاتالاز و باعث بهبود پراکسیداسیون لیپیدی می‌شود و کاهش مالون‌دی‌آلدید (MDA) نسبت به گروه شاهد دیده شد. در پایان، کاهش سطح MDA به کاهش تولید رادیکال‌های آزاد و محافظت عصبی می‌انجامد. بنابراین، از تخریب سلول‌های سروتونورژیک جلوگیری می‌کند و تجویز این دارو میزان آسیب سلول‌های ناحیه هیپوکمپ را نسبت به گروه شاهد کاهش می‌دهد. مطالعات پژوهشگران در این زمینه نشان داده‌اند که تجویز داروهای فلوکستین و فلووکسامین باعث کاهش MDA به واسطه‌ی افزایش محافظت سلول‌های نورونی می‌شود اما تجویز ایمی‌پرامین (داروی ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای) باعث افزایش میزان MDA شده است (۲۶). همچنین، در مطالعه دیگری بیماران تحت تیمار با داروهای ضدافسردگی، سطح MDA آنها کاهش پیدا کرده است. این داروها احتمالاً با سرکوب NADPH اکسیداز و کاهش گونه‌های فعال اکسیژن باعث کاهش سطح MDA می‌شوند (۲۷). همچنین، تجویز فلووکسامین باعث کاهش میزان هورمون کورتیکوسترون سرم نیز می‌شود. چه بسا با مهار آزادسازی CRH از هیپوتالاموس سبب مهار محور HPA و کاهش هورمون کورتیکوسترون می‌شود (۲۸). مطالعات بافت‌شناسی در گروه تحت تیمار با داروی فلووکسامین و آسیب ناحیه CA3 آسیب را به میزان کمتری نسبت به گروه شاهد نشان داد و تاثیر بهبود فلووکسامین در ناحیه CA1 دیده شد. ناحیه CA1 هیپوکمپ تراکم فراوان‌تری از گیرنده‌های سروتونرژیک نسبت به بخش‌های دیگر هیپوکمپ دارد (۲۹). احتمالاً فلووکسامین در این ناحیه به علت گیرنده‌های سروتونرژیک بیشتر سبب حفاظت سلول‌های

فلووکسامین یا افشره پسته‌کوهی به تنهایی یا گروه دریافت‌کننده فلووکسامین و افشره به طور همزمان دیده شد. از دیدگاه فیزیولوژی، طبیعی است که کاهش هر یک از هورمون‌های گلوکوکورتیکوئیدی منجر به کاهش قندخون می‌شود. در این مطالعه افت قندخون در گروه دریافت‌کننده افشره به تنهایی و همراه با فلووکسامین معنی‌دارتر بود. در مطالعات دیگر اثر کاهشی افشره پسته‌کوهی بر میزان قندخون نیز دیده شده (۳۵) که تاییدی بر نتایج مطالعات انجام شده است. به طور کلی القای استرس فیزیکی مانند بی‌حرکتی در موش‌های صحرایی نر منجر به القای افسردگی و آسیب بافت هیپوکمپ در نواحی CA1 و CA3 می‌شود. فلووکسامین باعث کاهش مدت بی‌حرکتی در گروه بیمار می‌شود ولی به اندازه گروه سالم نمی‌رسد. در مطالعات بافت‌شناسی اثر بهبود ناشی از افشره گیاهی و فلووکسامین در ناحیه CA1 و CA3 دیده شد اما در تیمار با فلووکسامین در ناحیه CA3 آسیب بوجود آمده بود که شاید مصرف دارو در مدت بیشتر و با غلظت بیشتر، از آسیب در ناحیه CA3 هم جلوگیری کرده و باعث بهبود رفتار شبه افسردگی شده‌بود. استفاده از گیاهان طبی مانند افشره پسته‌کوهی می‌تواند افزون بر کاهش شرایط آنتی‌اکسیدانی و هورمونی بدن، باعث بهبود افسردگی شود. از همین رو شاید، امروزه استفاده از فراورده‌های گیاهی به عنوان مکمل یا جانشین داروهای شیمیایی در پیشگیری یا درمان برخی اختلال‌های روانی مانند افسردگی با عوارض جانبی و هزینه درمانی کم باشد که، توصیه می‌شود.

نویسندگان اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه تضاد منافی ندارند.

پسته‌کوهی و فلووکسامین و بررسی رفتاری، مدت بی‌حرکتی نسبت به گروه بیمار (شاهد) در حد معنی‌دار کاهش یافت و به گروه کنترل نزدیک بود که این کاهش به دلیل وجود ترکیبات سودمند در پسته‌کوهی است که چه بسا کم بودن دوز مصرفی فلووکسامین را جبران کرده باشد اما در حد معنی‌دار به حد گروه کنترل نرسید. اما در مطالعات بافت‌شناسی بهبود ناحیه CA1 و افزایش تراکم سلولی با وجود آسیب نسبی در ناحیه CA3 دیده شد. برپایه یافته‌های بیوشیمی حاضر، تجویز همزمان دارو و افشره باعث افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی مغز شد. یافته‌های این مطالعه مبنی بر این که داروی گیاهی از آثار ویرانگر داروی شیمیایی پیشگیری می‌کند مطابق یافته‌های مطالعات پیشین است.

در مورد تغییر هورمون کورتیکوسترون می‌توان گفت که در شرایط استرس تراوش این هورمون افزایش می‌یابد. با توجه به نقش کورتیزول در هماهنگی بقای عصبی و برانگیختگی عصبی، افزایش آن سبب آسیب دستگاه عصبی و بروز افسردگی می‌شود. در سطح مولکولی با کاهش بیان فاکتور BDNF، القای مرگ سلولی نوروها و تغییر نوروزنر هیپوکمپ رخ می‌دهد. بنابراین، انتظار می‌رود مصرف داروهای آرام‌بخش و ضدافسردگی، ترشح کورتیکوسترون را در حیوانات زیر استرس کاهش دهد. داروهای ضدافسردگی باعث کاهش بیش‌فعالی محور HPA می‌شوند. در نتیجه میزان هورمون کورتیکوسترون کاهش می‌یابد. افزایش بیان ژن BDNF باعث محافظت و کاهش مرگ سلول‌های عصبی و افزایش نوروزنر در هیپوکمپ می‌شود (۳۴ و ۵) چنین نتیجه‌ای در مطالعه ما در هر سه گروه دریافت‌کننده

منابع

1. Shojaei M, Sahraei H, Shojaei N, Sarahian N, Attar zadeh Yazdi Gh. Effect of intermittent feeding on learning and spatial memory and metabolic symptoms of chronic stress in male mice. *Res in Med* 2016; 39(4): 189-194. [Text In Persian]
2. Naveen S, Siddalingaswamy M, Singsit D, Khanum F. Anti-depressive effect of polyphenols and omega-3 fatty acid from pomegranate peel and flax seed in mice exposed to chronic mild stress. *Psychiatry Clin Neurosci* 2013; 67(7): 501-508.
3. Rania F A, Rehab Fawzy AB, Omar A HA, Farid B, Salma A, El-Marasya, Alyaa F Hessina. Combined hepatoprotective and antidepressant effects of resveratrol in an acute model of depression. *Bulletin Faculty Pharmacy, Cairo Univer* 2014; 52(2): 191-197.
4. Gong J, Huang J, Qing GE, Chen F, Zhang Y. Advanced Research on the Antidepressant Effect of Flavonoids. *Curr Opin Complement Alternat Med* 2014; 2(1): 1-6.
5. Anacker C, Zunszain PZ, Carvalho LA, Pariante CM. The glucocorticoid receptor: Pivot of depression and of antidepressant treatment? .

- Psychoneuroendocrinology 2011; 36(3): 415 - 425.
6. Herken H, Gurel A, Selek S, Armutcu F, Ozen ME, Bulut M, Kap O, Yu mru M, Savas HA, Akyol O. Adenosine Deaminase, Nitric Oxide, Superoxide Dismutase, and Xanthine Oxidase in Patients with Major Depression: Impact of Antidepressant Treatment. Arch Med Res 2007; 38(2): 247-252.
7. Ghodake SR, Suryakar AN, Kulhalli PM, Padalkar PK, Shaikh AK. A study of oxidative stress and influence of antioxidant vitamins supplementation in patients with major depression. Current Neurobi 2012; 3(2): 107-111.
8. Nasir N, Khan AA. Effects of stress-induced acute depression and antidepressant drugs on CA3 region of hippocampus of albino rats. Current Neurobi 2011; 2(1): 31-34.
9. Miller AL. The Methylation, Neurotransmitter, and Antioxidant Connections Between Folate and Depression. Altern Med Rev 2008 Sep; 13(3): 216-226.
10. Dai Y, Li Z, Xue L, Dou C, Zhou Y, Zhang L, Qin X. Metabolomics study on the antidepressant effect of xiaoyaosan on rat model of chronic unpredictable mild stress. J Ethnopharmacol 2010; 128(2): 482-489.
11. Ronald A R. Diagnosis and management of depression in primary care: a clinical update and review. Canadian Medical Association J 2002; 167(11): 1253-1260.
12. Nakano M, Osada K, Misonoo A, Fujiwara K, Takahashi M, Ogawa Y, et al. Fluvoxamine and sigma-1 receptor agonists dehydroepiandrosterone (DHEA)-sulfate induces the Ser473-phosphorylation of Akt-1 in PC12 cells. Life Sciences 2010; 86(10): 309-314.
13. Shahbazi-gahrouei D, Shiri L, Alaei H, Naghdi N. The effect of continuous ELF-MFs on the level of 5-HIAA in the raphe nucleus of the rat. J Radiation Rese 2016; 57(2): 127-132.
14. Mahar I, Bambico FR, Mechawar N, Nobrega JN. Stress, serotonin, and hippocampal neurogenesis in relation to depression and antidepressant effects. Neurosci Biobehav Rev 2014; 38: 173-192.
15. Albertazzi P. Noradrenergic and serotonergic modulation to treat vasomotor symptoms. Menopause Int 2006; 12: 7-11.
16. Hatamnia AA, Abbaspour N, Darvishzadeh R. Antioxidant activity and phenolic profile of different parts of Bene (*Pistacia atlantica* subsp. *kurdica*) fruits. Food Chem 2013; 145 306-311.
17. Nooshinfar E, Akbarzadeh-Baghbani A, Meisami E. Effects of increasing durations of immobilization stress on plasma corticosterone level, learning and memory and hippocampal BDNF gene expression in rats. Neuroscience Letters 2011; 500(1): 63-66.
18. Hosseini M, Shemshaki A, Saghebjo M, Gharari Arefi R. Effect of Aerobic Training and *Pistacia atlantica* Extract Consumption on Plasma Levels of Lipocalin-2 and Insulin Resistance Index in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Q Horizon of Med Scien 2016; 22(1): 27-33. [Text In Persian]
19. Zavvari F, Karimzadeh F. A Methodological Review of Development and Assessment of Behavioral Models of Depression in Rats. Shefayekhatam 2016; 3(4): 151-160. [Text In Persian]
20. Esterbauer H, Cheeseman KH. Determination of aldehydic lipid peroxidation products: malonaldehyde and 4-hydroxynonenal. Methods Enzymol 1990; 186: 407-421.
21. Aebi H. Catalase in vitro. Method Enzymol 1984; 105: 121-126.
22. Umadevi P, Murugan S, Jennifer Suganthi S, Subakanmani S. Evaluation of antidepressant like activity of cucurbita pepo seed extracts in rats. Int J Curr Pharm Res 2011; 3(1): 108-113.
23. Tae WS, Kim SS, Lee KU, Nam EC, Choi JW, Park JI. Hippocampal Shape Deformation in Female Patients with Unremitting Major Depressive Disorder. AJNR Am J Neuroradiol 2011; 32(4): 671-676.
24. Şahin E, Gümüşlü S. Immobilization stress in rat tissues: Alterations in protein oxidation, lipid peroxidation and antioxidant defense system. Compara Biochem Physi 2007; 144(1) 342-347.
25. Martínez-porchas M, Martínez-córdova LR, Ramos-enriquez R. Cortisol and Glucose: Reliable indicators of fish stress?. Pan-American J Aquatic Scien 2009; 4(2): 158-178.
26. Abdel-Salam O M E, Morsy, S M Y, Sleem AA. The effect of different antidepressant drugs of oxidative stress after lipopolysaccharide administration in mice. EXCLI J 2011; 10: 290-302.
27. Khanzode SD, Dakhale GN, Khanzode SS, Saoji A, Palasodkar R. Oxidative damage and major depression: the potential antioxidant action of selective serotonin reuptake inhibitors. Redox Rep 2003; 8(6): 365-370.
28. Goshen I, Kreisel T, Ben-Menachem-Zidon O, Licht T, Weidenfeld J, Ben-hur T, Yimiya R. Brain interleukin-1 mediates chronic stress-induced depression in mice via adrenocortical activation and hippocampal neurogenesis suppression. Molecular psychiatry 2008; 13: 717-728.
29. Baskys A, Remington. Brain mechanism and psychotropic drug. chapter 4. New York; Crc Press, 1996: 56-59.
30. Lyttla K, Ohmura Yu, Konno K, Yoshida T, Izumia T, Watanabe M and et al. Repeated fluvoxamine treatment recovers juvenile stress-induced morphological changes and depressive-like behavior in rats. Brain Res 2015; 1616: 88-100.
31. Numakawa T, Richards M, Nakajima S, Adachi N, Furuta M, Odaka H, Kunugi H. The role of brain-derived neurotrophic factor in comorbid depression: possible linkage with

steroid hormones, cytokines, and nutrition. *Front Psychiatry* 2014; 5: 136.

32. Leelavathi A A, Doss V A. Evaluation of antioxidant activity of *Melia azedarach* on depression induced rat brain tissue. *Inter J Scienand Rese* 2014; 3(8): 224-229.

33. Mohammadi T, Mohammadian B, Fatemi Tabatabaee SR, Kolahi M. Cinnamon (*Cinnamomum zeylanicum*) Hydroalcoholic Extract Effects on Histological Structure of Hippocampus in Ovariectomized Mice. *Jundishapur Sci Med J* 2016; 15(1):73-83. [Text In Persian]

34. Pinder R M. Depression may be associated with hippocampal volume changes and HPA axis

dysfunction: is treatment to remission the answer?: review article. *African J Psychiatry* 2004; 7(3): 5-9.

35. Hamdan II, Afifi F U. Studies on the in vitro and in vivo hypoglycemic activities of some medicinal plants used in treatment of diabetes in Jordanian traditional medicine. *J Ethnopharmacol* 2004; 93(1): 117-121.

36. Bahrebarm, Mirzaei A, Mantegheyan E, Bahrebar A. In Vivo and vitro Antioxidant Activity of Hydro-Alcoholic Extract of *Pistacia Atlantica*. *Armaghane-Danesh, Yasuj University of Medical Sciences Journal (Yums)* 2012; 17(6): 540-551. [Text In Persian]

Comparison of the Effects of Hydro-Alcoholic Extract of Pistacia Atlantica kurdika and Fluvoxamine Drug on Depression in Male Rat Under Immobilization Stress

* Babaeifar F(MSc)¹- Mohammadzadeh M(MD)²- Babaei F (MD)³

***Corresponding Address:** MSc Student in Animal Physiology, Department of Biology, Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.

Email: Fatemehbabaei706@yahoo.com

Received: 18/Jan/2017 Revised: 12/Mat/2017 Accepted: 31/Jun/2017

Abstract

Introduction: Nowadays, herbal products often have been used as an alternative or supplement to chemical drugs in the treatment or prevention of psychiatric diseases with low side effects and cost of treatment.

Objective: Therefore, in this study we compared the effects of fluvoxamine and hydro-alcoholic extract of Pistacia atlantica kurdika on the immobilization stress-induced depression in male rats.

Materials and methods: In this experimental study, 30 adult male Wistar rats with the average weight of 175 g were randomly divided into five groups of six rats in each. Induction of immobilization stress was done using restrainer. In this experiment, the treatment of rats was assigned to 3 weeks with hydroalcoholic extract of pistachio in dose of 400 mg/kg and fluvoxamine drug in dose of 120 mg/kg using oral gavage. Tail suspension test for depression, Malondialdehyde (MDA) level and catalase activity of the homogenized hippocampus tissue, and blood glucose and corticosterone level were measured. The data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey's test.

Results: A significant increase was observed in the immobility time, malondialdehyde, corticosterone, blood sugar level, and decrease in the catalase enzyme activity and damage in tissue of hippocampus in the cas group. Whereas, there was a significant decrease in the immobility time and increase in catalase enzyme activity and decline in corticosterone, blood sugar and malondialdehyde and lack of hippocampal tissue damage in the group under pistachio extract treatment. Also, in the group under fluvoxamine treatment alone or concomitant use of drug with pistachio extract, we observed an increase the immobility time, decrease in Malondialdehyde, corticosterone and catalase enzyme activity. In addition, concomitant use of drug with pistachio extract caused a significant decrease in the blood glucose level.

Conclusion: The findings showed that the hydro-alcoholic extract of pistachio or fluvoxamine drug incidentally decrease the immobilization stress-induced depression and improve condition of antioxidant in the hippocampus tissue of the treated groups

Conflict of interest: non declared

Keywords: Depression\ Fluvoxamine\ Hippocampus\ Immobilization\ Pistacia\ Rats

Journal of Guilan University of Medical Sciences, No: 103, Pages: 1-13

Please cite this article as: Babaeifar F, Mohammadzadeh M, Babaei F. Comparison of the Effects of Hydro-Alcoholic Extract of Pistacia Atlantica kurdika and Fluvoxamine Drug on Depression in Male Rat Under Immobilization Stress. J of Guilan Univ of Med Sci 2017; 26(103):1-13. [Text in Persian]

1. MSc Student in Animal Physiology, Department of Biology, Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.

2. Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.