

مقایسه‌ی اثر ضد تشنجی عصاره‌ی آبی گیاه بادرنجبویه و فنوباربیتال در

موش سفید آزمایشگاهی

دکتر محمد طاهر بروشکی* - دکتر فرهاد ملک** - دکتر ابوالقاسم بهارلو***

* استادیار گروه فارماکولوژی-دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی مشهد

** استادیار گروه داخلی-دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی سمنان

*** داروساز

چکیده

مقدمه: به دلیل مزمن بودن بیماریهای تشنجی و مصرف دراز مدت داروهای ضد تشنج، و نیز عوارض فراوان این داروها، استفاده از گیاهان دارویی جهت کنترل حملات تشنجی مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.

هدف: بررسی اثر ضد تشنجی عصاره گیاه بادرنجبویه (*Melisa officinalis*) در کنترل تشنجات ناشی از پتیلن ترازوول در موش سفید آزمایشگاهی می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه موشهای سفید آزمایشگاهی به وزن ۲۵-۳۰ گرم به طور تصادفی در گروه‌های مختلف قرار گرفتند (هر گروه ۲۰ موش). مقادیر متفاوتی از عصاره آبی گیاه (g) (۱، ۶، ۹، ۱۲ ml/kg) را داخل صفاق گروه‌های مختلف تزریق کردیم. گروه کنترل نرمال سالین (۶ ml/kg) و گروه‌های شاهد فنوباربیتال

(۴۰ mg/kg) دریافت کردند. در آزمون پتیلن ترازوول (۸۰ mg/kg, ip) تغییرات رفتاری، زمان شروع تشنج، طول مدت تشنج و مرگ و میر (۲۴ ساعته در تمامی گروه‌ها ثبت گردید).

نتایج: تمامی مقادیر عصاره گیاه موجب تاخیر در زمان شروع تشنج شدند، اما موثرترین مقدار عصاره ۱۲ ml/kg بود، که قابل مقایسه با مقدار ۳۰ mg/kg فنوباربیتال است. در مورد طول مدت تشنج، بجز مقدار ۳ ml/kg عصاره، بقیه مقادیر نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری را نشان می‌دهند. در ارتباط با کاهش درصد مرگ و میر ۲۴ ساعته، در گروه شاهد هیچ گونه مرگ و میر مشاهده نشد، در گروه کنترل ۴۵٪ و در گروه‌های مورد آزمایش با مقادیر ۹ و ۱۲ ml/kg عصاره حدود ۱٪ مرگ و میر مشاهده شد که یا انکو تأثیر گیاه مذکور در کاهش میزان مرگ و میر است.

نتیجه گیری: یافته‌های فوق نشان می‌دهند که مقدار ۱۲ ml/kg عصاره آبی گیاه بادرنجبویه در کاهش زمان تشنج، طول مدت تشنج و درصد مرگ و میر ۲۴ ساعته اثر زیاد دارند.

کلید واژه‌ها: پتیلن ترازوول / تشنج‌ها / فنوباربیتال / گیاهان شفابخش

مقدمه

در رفع حالت مالیخولیایی، تپش قلب، ضعف حافظه، سر دردهای عصبی و خستگی‌های روحی توصیه کرده اند(۱). علاوه بر این در طب قدیم نیز برای این گیاه خواص درمانی متعددی ذکر شده که عبارت‌اند از: نیرو دهنده و ضد تشنج، مقوی معده، باد شکن، رفع دل پیچه‌های ناشی از نفخ، فشار عصبی، اختلالات هضمی، سر دردهای یک طرفه، بی‌خوابی و غیره(۱). همچنین تحقیقات متعددی در نقاط مختلف جهان بر روی اثرات درمانی این گیاه، درمان اختلالات عصبی و رفتاری (۴ و ۱۰)، اثرات ضد میکروبی

بادرنجبویه (*Melissa officinalis*) گیاهی علفی، معطر، پایا، دارای ساقه چهار گوش کم و بیش پوشیده از کرکهای غده ای یا ساده است. پرورش این گیاه از قدیم در بین ملل مختلف جهان به منظور درمان بیماریها معمول بوده است. پزشکان و دانشمندان قدیم از آن در آثار خود نام برده اند. بوعلی سینا آن را در ردیف داروهای مقوی قلب جای داده و برای آن اثر تقویت نیروی حیاتی بدن قائل بوده و گفته است که با مصرف آن بی‌حوصلگی و کنج خلقی از بین می‌رود. دانشمندان دیگر مصرف آن را

۱۰ گرم پودر گیاه کامل را در یک اrlen ریخته و با اضافه کردن ۱۰۰ml آب مقطر و مسدودنمودن دهانه آن با فرویل آلومینیوم، به مدت ۷۲ ساعت در دمای اتاق قرار دادیم. سپس عصاره به دست آمده با پارچه‌ای تمیز صاف و در یخچال نگهداری، و در زمان آزمایش با غلظت مشخص استفاده شد.

گروه های آزمایشی: تمامی حیوانات به طور تصادفی و پس از تطابق با محیط، در گروه های مختلف (هر گروه ۲۰ موش) به شرح ذیل قرار گرفتند:

۱- گروه کنترل. این گروه ابتدا سرم فیزیولوژیک (kg/ml) (۶) و بعد پنتیلن تترازول دریافت کرد.

۲- گروه های شاهد (۴ گروه). این گروه ها به ترتیب مقادیر ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ فنوباریتال و بعد پنتیلن تترازول دریافت کردند.

۳- گروه های مورد آزمایش. این گروه ها به ترتیب مقادیر ۶، ۳، ۹ و ۱۲ ml/kg عصاره آبی بادرنجبویه و متعاقب آن پنتیلن تترازول دریافت کردند.

به همه گروه ها، ۴۵ دقیقه پس از تزریق اولیه، ابتدا پنتیلن تترازول (۸۰ mg/kg) داخل صفاقی تزریق شد، سپس زمان شروع تشنج (مرحله تونیک-کلونیک)، طول مدت تشنج و تعداد مرگ و میر ۲۴ ساعته ثبت گردید(۲).

روش بررسی تشنج: در این بررسی علائم تشنج حاصله به طرق زیر تقسیم بندی گردیدند (۹) :

مرحله صفر (D0): هیچ تشنجی مشاهده نگردید ولی حالت لرزش بدن یا تکان در گوش یا صورت دیده شد.

مرحله یک (D1): انقباضات میوکلونیک، پرش (کنده شدن از زمین توسط چهار دست و پا)

مرحله دو (D2): کلونوس پای جلو، بدون از دست دادن حالت تعادل، گرفتگی عضله گردن

مرحله سه (D3): کلونیک شدید، بازدستدادن حالت تعادل

مرحله چهار (D4): تشنج تونیک-کلونیک همراه با کشیدگی شدید بدن.

آفایز آماری: تمامی نتایج به صورت میانگین ± خطای

(۸)، اثر بر تیروئید(۳)، درمان الزایمر (۹)، درمان زخمهای گوارشی (۷) و اثر آرامبخشی (۵)، انجام گرفته است.

حدود ۱٪ جمعیت جهان مبتلا به بیماریهای تشنجی اند که، پس از سکته های مغزی، دومین علت شایع بیماریهای نورولوژیک را شامل می شوند. با درمان استاندارد حدود ۰.۸٪ بیماران کنترل می شوند، ولی میلیونها نفر در سراسر جهان دچار صرع غیر قابل کنترل هستند (۶). قبل از کشف داروهای ضد تشنج، درمان بیماران صرعی شامل سوراخ کردن جمجمه (Cupping)، حجامت (Trepining)، و استفاده از داروهای گیاهی و حیوانی بوده است. در سال ۱۸۵۷ برای اولین بار Sir Charles Lockock پتاسیم را در درمان صرع به کار برد و سپس در سال ۱۹۱۲ فنوباریتال، به عنوان اولین داروی رسمی، جهت درمان حملات تشنجی وارد بازار مصرف گردید (۶).

به دلیل مزمن بودن بیماریهای تشنجی و مصرف دراز مدت داروهای ضد تشنج، و نیز عوارض فراوان این داروها، اخیراً استفاده از گیاهان دارویی جهت کنترل حملات تشنجی مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر ضد تشنجی عصاره گیاه بادرنجبویه (*Melissa officinalis*) در کنترل تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول بر موش سفید آزمایشگاهی و مقایسه آن با فنوباریتال است.

مواد و روش ها

موش های سفید آزمایشگاهی به وزن ۲۵-۳۰ گرم و سن ۶-۴ هفته (حیوان خانه دانشکده پزشکی مشهد)، در شرایط استاندارد دما ($23\pm1^{\circ}\text{C}$)، نور (۱۲ ساعت تاریکی / روشنایی) نگهداری شدند و آب و غذا (شرکت جوانه خراسان) آزادانه در اختیارشان بود.

داروهای: گیاه خشک شده بادرنجبویه (شرکت کندلوس چالوس)، آمپول فنوباریتال ۱۰۰mg/ml، پنتیلن تترازول (شرکت سیگما) و نرمال سالین ۰.۹٪.

روش تهیه عصاره گیاه بادرنجبویه: برای تهیه عصاره،

دقیقه رسیده، که از لحاظ آماری با مقادیر 12 ml/kg و 9 ml/kg عصاره معنی دار است ($p < 0.01$). زمان شروع تشنج با مقادیر 40 mg/kg و 30 mg/kg فنوباربیتال حدود $18-21$ دقیقه است.

۲- اثرات تشنج زایی پتیلن ترازوول در گروه کنترل در جدول ۲ نشان داده شده است. در این گروه میزان مرگ و میر حدود 45 درصد و میانگین طول دوره تونیک - کلونیک (D_4) $14/8 \pm 0.043$ ثانیه است.

۳- اثرات ضد تشنجی فنوباربیتال نیز در جدول ۲ نشان داده شده است. تمامی مقادیر فنوباربیتال، به جز مقدار 10 mg/kg از نظر میزان مهار تشنجات با گروه کنترل اختلاف معنی داری داشتند ($p < 0.001$). تمام مقادیر فنوباربیتال علاوه بر محافظت کامل حیوانات در برابر مرگ و میر، طول دوره تشنج را نیز در گروه های شاهد کاهش داده اند که اختلاف معنی داری با گروه کنترل نشان می دهد ($p < 0.01$). برای مقدار 10 mg/kg و 10 ml/kg برای سایر مقادیر.

۴- اثرات ضد تشنجی عصاره آبی گیاه بادرنجبویه نیز در جدول ۲ مشاهده می گردد. تمامی مقادیر عصاره از نظر درصد مهار تشنجات ($p < 0.05$) برای مقدار 3 ml/kg و 1 ml/kg برای سایر مقادیر، طول مدت تشنج ($p < 0.05$) برای مقدار 6 ml/kg و 1 ml/kg برای مقادیر 12 ml/kg و 9 ml/kg و همچنین درصد مرگ و میر با گروه کنترل اختلاف معنی داری نشان دادند.

معیار بیان شده اند. برای مقایسه آنها از آنالیز واریانس یک طرفه و t تست استفاده به عمل آمد. مقادیر $5 < p < 0.01$ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شده است.

نتایج

۱- زمان شروع در گروه های مختلف در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱: مقایسه زمان شروع تشنج ناشی از پتیلن ترازوول در حیوانات مورداً آزمایش با مقادیر مختلف فنوباربیتال و عصاره آبی گیاه بادرنجبویه

گروه	متوسط شروع زمان تشنج (دقیقه)	انحراف معیار
کنترل	۸/۱۲	۰/۰۷
فنوباربیتال 10 mg/kg	۸/۵۶	۰/۱۴
فنوباربیتال 20 mg/kg	۱۲/۱۶	۰/۱
فنوباربیتال 30 mg/kg	**۱۷/۱۵	۰/۱۳
فنوباربیتال 40 mg/kg	***۲۰/۶۹	۰/۲۲
بادرنجبویه 3 ml/kg	۱۰/۵۵	۰/۱۴
بادرنجبویه 6 ml/kg	۱۳/۷۳	۰/۱۳
بادرنجبویه 9 ml/kg	**۱۷/۶۳	۰/۱۷
بادرنجبویه 12 ml/kg	**۱۷/۵۲	۰/۱۸

در مقایسه با گروه کنترل $P < 0.01$ و $p < 0.001$

همان گونه که مشاهده می شود با عصاره آبی گیاه زمان شروع تشنج را از 9 دقیقه (گروه کنترل) به حدود 18 دقیقه کاهش داده است.

جدول ۲. اثرات ضد تشنجی فنوباربیتال و بادرنجبویه

گروه	D_0 دقیقه	D_1 دقیقه	D_2 دقیقه	D_3 دقیقه	D_4 دقیقه	تعداد مرحله D_4	میانگین طول دوره تونیک کلونیک (ثانیه)	میانگین درصد مرگ و میر در D_4	در صد مرگ و میر
سرم فیزیولوژی ml/kg 6	$\pm 0/86$	$\pm 1/24$	$\pm 1/54$	$\pm 1/79$	$\pm 9/08$	۶۱	$0/36 \pm 0/36$	-	۴۵
فنوباربیتال 10 mg/kg	$\pm 0/04$	$\pm 0/06$	$\pm 0/07$	$\pm 1/17$	$0/06 \pm 0/06$	۳۶	$0/46 \pm 0/46$	$9/54 \pm ns$	*
فنوباربیتال 20 mg/kg	$\pm 0/09$	$\pm 1/29$	$\pm 1/7$	$\pm 1/98$	$\pm 9/95$	۳۱	$0/08 \pm 0/08$	$47/28 \pm ***$	*
فنوباربیتال 30 mg/kg	$\pm 1/04$	$\pm 1/0$	$\pm 1/07$	$\pm 2/78$	$\pm 13/2$	۲۷	$0/08 \pm 0/08$	$55/78 \pm ***$	*
فنوباربیتال 40 mg/kg	$\pm 1/11$	$\pm 1/54$	$\pm 2/12$	$\pm 2/96$	$\pm 14/10 \pm 0/08$	۲۴	$0/12 \pm 0/12$	$146/83 \pm ***$	*

بقیه‌ی جدول ۲

در صد مرگ و میر	میانگین درصد مهار تشنج D ₄	میانگین طول دوره تونیک کلونیک (ثانیه)	تعداد مرحله D ₄	D ₄ دقیقه	D ₃ دقیقه	D ₂ دقیقه	D ₁ دقیقه	D ₀ دقیقه	گروه
۴۰	۱۶/۱۹ *	۰/۴۳±۱۴/۵۶ Ns	۵۹	±۱۰/۰۵ ۰/۶۲	±۱/۹ ۰/۰۶	±۱/۴۶ ۰/۰۷	±۱/۱۸ ۰/۰۷	±۰/۹۲ ۰/۰۶	بادرنجبویه ml/kg ^۳
۴۰	۵۱/۱۹ ***	۰/۳۶±۱۳/۵۲ * ***	۵۵	±۱۳/۷۳ ۰/۰۹	±۲/۰۷ ۰/۰۶	±۱/۷۳ ۰/۰۷	±۱/۳۳ ۰/۰۶	±۰/۹۵ ۰/۰۵	بادرنجبویه ml/kg ^۶
۱۰	۹۳/۹۴ ***	۰/۵±۱۱/۵۴ *** ***	۳۵	±۱۷/۶۳ ۰/۷۴	±۲/۵۸ ۰/۰۶	±۲/۲۷ ۰/۰۶	±۱/۵۷ ۰/۱۱	±۰/۹۷ ۰/۰۹	بادرنجبویه ml/kg ^۹
۱۰	۹۴/۷۲ ***	۰/۴±۹/۴۸ *** ***	۳۳	±۱۷/۶۹ ۰/۰۸۵	±۲/۷۴ ۰/۰۵	±۲/۴۱ ۰/۰۸	±۲/۲ ۰/۰۶	±۱/۲۱ ۰/۰۶	بادرنجبویه ml/kg ^{۱۲}

در تمامی گروه‌ها، ۴۵ دقیقه بعد از تزریق اول (سرم فیزیولوژیک یا فنوباریتال یا بادرنجبویه) پتیلن ترازاول (۸۰ mg/kg) داخل صفاق تزریق گردید، سپس زمان شروع تشنج (مرحله تونیک-کلونیک)، طول مدت تشنج و تعداد مرگ و میر مدت تشنج و ساعته در مورد تمامی گروه‌ها ثبت گردید.

(D0): تشنج مشاهده نشد؛ (D1): انقباضات میوکلونیک؛ (D2): کلونوس پای جلو؛ (D3): تشنجات کلونیک شدید و (D4): تشنجات تونیک-کلونیک

*** p < 0.001، ** p < 0.01، ns: no significant

بحث و نتیجه گیری

آماری اختلاف معنی داری است (P < 0.01). زمان شروع تشنج با مقادیر ۴۰ mg/kg و ۳۰ mg/kg فنوباریتال حدود ۱۸-۲۱ دقیقه است (جدول ۱). زمان شروع تشنج در گروه‌های مورد آزمایش (۱۲ ml/kg و ۹ عصاره بادرنجبویه) و شاهد فنوباریتال (۳۰ mg/kg) برابر است، ولی از نظر تعداد حملات تشنجی تونیک-کلونیک در مرحله D4، مقدار ۱۲ ml/kg، مقدار ۲۰ mg/kg و ۹ عصاره بادرنجبویه اثر بخشی معادل ۲۰ mg/kg و ۳۰ mg/kg فنوباریتال را دارد، که بیانگر قدرت اثر کمتر این مقادیر از فنوباریتال را دارد، که بیانگر قدرت اثر بخشی مقادیر از عصاره در مقایسه با مقادیر ۴۰ mg/kg و ۳۰ mg/kg فنوباریتال است. در مورد طول مدت تشنج (تونیک-کلونیک)، عصاره گیاه این زمان را از ۱۴/۸۰±۰/۴۳ ثانیه (گروه کنترل) به ۹/۴۸±۰/۴۰ ثانیه کاهش داده است. این زمان در مورد مقادیر ۳۰ mg/kg و ۲۰ mg/kg فنوباریتال به ترتیب ۸/۰۰±۰/۳۳ و ۱۰/۵۲±۰/۱۰ ثانیه است (جدول ۲) که بیانگر قابل مقایسه بودن اثرات این گیاه با فنوباریتال است. عصاره گیاه در صد مرگ و میر، را از ۴۵٪ (گروه کنترل) به ۱۰٪ (با مقادیر ۱۲ ml/kg و ۹ عصاره) تقلیل داده است (جدول ۲). هیچ مورد مرگ با مقادیر مختلف فنوباریتال مشاهده نگردید. سرانجام اینکه عصاره گیاه تعداد

امروزه استفاده از عصاره‌های مختلف گیاهی دارای سابقه کاربرد دیرینه در طب سنتی موردنوجه قرار گرفته است. بادرنجبویه یکی از همین گیاهان است که در طب سنتی به اثرهای ضدتشنجی آن اشاره شده ولی تاکنون مطالعه علمی جهت بررسی اثرهای گیاه مذکور به عمل نیامده است. هدف این تحقیق بررسی اثر ضد تشنجی عصاره آبی گیاه بادرنجبویه در کنترل تشنجات تجربی ناشی از تزریق پتیلن ترازاول در موش سفید آزمایشگاهی و مقایسه آن با فنوباریتال است.

در این مطالعه از بین روش‌های مختلف القا کننده تشنج (الکتروشوک، شیمیابی و صوت)، روش شیمیابی، به دلیل قابل دسترس بودن و اینکه تغییرات رفتاری مشهودی ایجاد می‌کند، انتخاب گردید (۶). نتایج نشان داد که عصاره آبی گیاه بادرنجبویه با مقادیر ۱۲ ml/kg و ۹ ml/kg اثر بخشی خوبی بوده و موجب تاخیر در شروع تشنج و کاهش طول دوره تشنج و همچنین کاهش میزان مرگ و میر می‌شود که با مقدار ۳۰ mg/kg فنوباریتال قابل مقایسه است. عصاره گیاه توانسته است زمان شروع تشنج را از حدود ۹ دقیقه (گروه کنترل) به حدود ۱۸ دقیقه برساند که از لحاظ

اقلیمی (آب و هوا، ارتفاع و H_p خاک) در میزان ماده موثره گیاه در مناطق مختلف است. مقدار 6 ml/kg عصاره این گیاه در فلسطین حدود $20\text{ درصد مرگ نشان داده}$ است (۲).

داروهای مهار کننده تشنج با مکانیسم‌های متعددی، از قبیل افزایش آستانه تحریک نرونها، افزایش فعالیت گیرنده‌های گابا و تغییر انتقال یونی از غشاء‌های تحریک پذیر عصبی اثر خود را اعمال می‌کنند، لذا می‌توان مکانیسم اثر عصاره گیاه بادرنجبویه را به یک یا چند مورد از مکانیسم‌های فوق نسبت داد. این ایده با نتایج حاصل از تحقیقات دیگران، مبنی بر این که تزریق داخل صفاقی عصاره آبی 10% این گیاه مقدار گابای قشر مغز را افزایش می‌دهد، تقویت می‌شود (۲)، ولی این که کدام ماده موجود در عصاره این گیاه باعث چنین عملی می‌شود، ناشناخته بوده و به بررسی بیشتر نیاز دارد.

تشنجات تونیک-کلونیک (مرحله D4) را از 61 مورد (گروه کنترل) به 33 مورد با مقدار 12 ml/kg کاهش داده است. اگرچه در این بررسی درصد مرگ و میر گروه مورداً از مایش به وسیله عصاره‌از 40 ml/kg (۳) به 10 ml/kg درصد (12 ml/kg) کاهش یافت، ولی هیچگاه اثر محافظتی حداکثر مقادیر به کار برده شده گیاه در این آزمایش، حتّی با مقادیر کم فنوباریتال، برابر نبوده است. در این بررسی نشان داده که با افزایش مقدار عصاره از 3 ml/kg به 12 ml/kg اثر محافظتی نیز بیشتر شده است. لذا این احتمال وجود دارد که با تجویز مقادیر زیادتر عصاره گیاه‌شاده‌رات محافظتی بیشتری نیز باشیم، که قابل مقایسه با فنوباریتال باشد.

تحقیقات مشابه در فلسطین نشان داده که اثر مهار تشنجات مقدار 6 ml/kg عصاره‌این گیاه با 12 ml/kg عصاره در این بررسی قابل مقایسه و برابر است، که بیانگر تاثیر شرایط

منابع

- 1- زرگری، ع؛ گیاهان دارویی. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، صص: ۷۵-۷۱
2. Abdul-ghani AS, El-Lati SG, Sacaun AI, Suleiman MS, Amin RM. Anticonvulsant Effects of Some Arab Medicinal Plants. Int J Crude Drug Res 1987; 25: 39-43.
3. Aufmkolk M, Kohrle J, Gumbinger H, Winterhoff H, Hesch RD. Antihormonal Effects of Plant Extracts: Iodothyronine Deiodinase of Rat Liver is Inhibited by Extracts and Secondary Metabolites of Plants. Horm Metab Res 1984; 16: 188-92.
4. Ballard CG, O'Brien JT, Reichert K, Perry EK. Aromatherapy as a Safe and Effective Treatment for the Management of Agitation in Severe Dementia: the Result of a Double-blind, Placebo-Controlled Trial with Melissa. J Clin Psychiatry 2002; 63: 553-8.
5. Coleta M, Campos MG, Cotrim MD, Proenca da Cunha A. Comparative Evaluation of Melissa Officinalis L, Tilia europaea L, Passiflora Edulis

A Comparative Study on the Anticonvulsive Effects of the

Aqueous Extract of the *Melissa Officinalis* Plant with

Phenobarbital in Pentylenetetrazol-Induced Seizures on Mice

Boroushaki MT, Malek F, Baharloo A

Abstract

Introduction: Convulsive disorders are among chronic diseases, which usually need a long-term drug therapy. Unfortunately, most of the drugs used clinically to treat these disorders exert many side effects. Therefore, search for finding new drugs is being carried out in many laboratories.

Objective: The object of this research was to compare the anticonvulsive effect of the aqueous extract of the plant *Melissa officinalis* with Phenobarbital in Pentylenetetrazol (P)-induced seizures on mice.

Materials and Methods: After acclimatization, animals were randomly divided in different groups. Control group received normal saline (6ml/kg), standard groups received (10, 20, 30 and 40 mg/kg) Phenobarbital and the test groups received aqueous plant extract (3, 6, 9 and 12 ml/kg). All injections were carried out as i.p. All animals were firstly exposed to P (80mg/kg, i.p). The onset of seizures, behavioral changes, duration of the seizures and number of deaths were recorded in all groups during the first 24 hours.

Results: All doses of the plant extracts delay the onset of seizures but the most effective dose was 12ml/kg, which was comparable to phenobarbital (30mg/kg). All amounts of the extract, except 3ml/kg, significantly reduced the duration of seizures compared to the control group. Number of deaths was 45 and 10 percent in control, standard and test groups, respectively.

Conclusion: Findings showed that 12ml/kg of the aqueous plant extract is able to reduce the onset of seizures, duration of seizures and number of deaths after 24 hours in Pentylenetetrazol-induced seizures.

Key words: Convulsions/ Pentylenetetrazole/ Phenobarbital/ Plant, Medicinal