

Research Paper

Effect of Sumac Nano-phytosome on Memory and Oxidative Stress in Valproic Acid-induced Rat Model of Autism Spectrum Disorder



*Akbar Hajizadeh Moghaddam¹ , Haniyeh Abbasalipour¹ , Mojtaba Ranjbar² , Sedigheh Khanjani Jelodar³

1. Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2. Faculty of Biotechnology, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran.

3. Faculty of Biology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Use your device to scan
and read the article online



Citation Hajizadeh Moghaddam A, Abbasalipour H, Ranjbar M, Khanjani Jelodar S. Effect of Sumac Nano-phytosome on Memory and Oxidative Stress in Valproic Acid-induced Rat Model of Autism Spectrum Disorder. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2021; 29(4):102-113. <https://doi.org/10.32598/JGUMS.29.4.950.1>



<https://doi.org/10.32598/JGUMS.29.4.950.1>



ABSTRACT

Background Autism Spectrum Disorder (ASD) is an advanced neurological disorder characterized by symptoms such as deficits in social interaction, communication, and cognition. Although sumac fruit contains compounds with antioxidant and anti-inflammatory properties, its effectiveness is limited due to its low bioavailability.

Objective This study aims to investigate the neuroprotective effect of sumac extract and sumac nano-phytosome on memory and oxidative stress in the hippocampal area of ASD rats.

Materials and Methods In this experimental study, pregnant female rats were first divided into healthy and patient groups. In the patient group, 500 mg/kg body weight valproic acid was injected intraperitoneally on day 12.5 of pregnancy. Male rats born in the healthy group were further divided into two healthy control and positive control groups, and those in the patient group were divided into two treatment groups of Sumac Extract (n=6) and Sumac Nano-Phytosome (n=6) 21 days after birth. The control groups received only saline, while treatment groups received SE and SNP (40 mg/kg/PO) for 4 weeks. Novel object recognition test was performed to assess recognition memory of rats on day 49 after birth. Finally, Total Antioxidant Capacity (TAC), Glutathione Peroxidase (GPx), Glutathione Reductase (GRx) and Catalase (CAT) were measured in the hippocampus of rats.

Results Valproic acid significantly decreased the discrimination index in novel object recognition test as well as GPx, GRx and CAT, and TAC levels in the hippocampus ($P<0.001$). Treatment with sumac nano-phytosome significantly improved the memory and the activity of antioxidant enzymes (GPx, GRx and CAT) and TAC ($P<0.001$).

Conclusion Sumac nano-phytosome can improve memory deficits and oxidative stress more compared to sumac extract in ASD rats due to increased bioavailability.

Keywords:

Autism, Sumac nano-phytosome, Valproic acid, Oxidative stress, Rat

*Corresponding Author:

Akbar Hajizadeh Moghaddam, PhD.

Address: Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

Tel: +98 (11) 35302453

E-Mail: a.hajizadeh@umz.ac.ir

Extended Abstract**1. Introduction**

Autism Spectrum Disorders (ASD) is an advanced neurological disorder characterized by symptoms such as impaired social interaction, communication, and cognition by the presence of repetitive patterns of behavior [1]. The main cause of this disorder is the interaction between genetic and environmental factors. Several studies have shown the increased oxidative stress in ASD patients that may contribute to the development of this disorder [2]. Although *Rhus Coriaria L.* (Sumac) contains compounds with antioxidant and anti-inflammatory properties, the therapeutic use of its extract is limited due to its low bioavailability and biological absorption [3, 4]. Various approaches including the use of natural compounds in the form of nanoparticles such as nano-phytosome have been proposed to improve its effectiveness [5]. This study aims to compare the neuroprotective effects of sumac extract and its nano-phytosome form on memory impairment and oxidative stress in the hippocampus of rats with ASD.

2. Materials and Methods

In this experimental study, pregnant female rats were divided into healthy and patient groups. In the patient group, 500 mg/kg body weight valproic acid (VPA) was injected intraperitoneally on day 12.5 of pregnancy. Male rats born in the healthy group were further divided into two healthy control and positive control groups, and those in the patient group were divided into two treatment groups of Sumac Extract (SE, n=6) and Sumac Nano-Phytosome (SNP, n=6) 21 days after birth. The control groups received only saline, while treatment groups received SE and SNP (40 mg/kg/PO) for 4 weeks. Novel Object Recognition (NOR) test was performed to assess recognition memory of rats on day 49 after birth. The NOR task was performed in the Plexiglas open box (40×40×60 cm) with sawdust covering the floor. The Discrimination Index (DI) was defined as the difference between the time spent exploring novel and familiar objects and the total exploring time [6]. Finally, total Antioxidant Capacity (TAC), Glutathione Peroxidase (GPx), Glutathione Reductase (GRx) and Catalase (CAT) levels were measured. The CAT, GPx, GRx, and TAC levels were assessed using the methods proposed by Aebi [7], Rotruck [8], Pinto [9], and Benzie [10], respectively. All statistical analyses were carried out in GraphPad Prism version 8.0.2 software. The data were expressed as Mean±Standard Deviation (SD). Comparisons were performed using one-way ANOVA followed by Tukey's test. P<0.05 was considered as the significance level.

3. Results

The induction of ASD model resulted in a significant decrease in DI in the patient group compared to the control group ($P<0.001$). Treatment with SE and SNP significantly increased the DI during NOR test. The levels of CAT, GPx, GRx, and TAC in the patient group were significantly decreased compared to the control group ($P<0.001$). Treatment with SE significantly increased the levels of CAT ($P<0.05$), GPx ($P<0.001$), and GRx ($P<0.01$), while treatment with SNP significantly increased CAT ($P<0.05$), GPx ($P<0.001$), GRx ($P<0.01$), and TAC ($P<0.01$) levels.

4. Discussion and Conclusion

Under the NOR test, a decrease in the DI was observed in ASD rats, indicating learning and memory impairment. Treatment by SE and SNP increased the DI, where SNP had a higher effect on VAP-induced learning and memory impairment. The results of this study revealed that SNP was more effective than SE. The effect of SNP was significantly higher than that of SE on cognitive function, enzymatic activities, and TAC. Natural products of sumac make treatment of neurodegenerative diseases difficult due to low bioavailability and absorption, caused by poor fat solubility and stability and rapid degradation after intestinal absorption. SNP has greater permeability into neurons in the brain than SE. In agreement with our findings, Nazari et al. reported that nano-phytosome of garlic essential oil increased bioavailability and stability [11]. Khalaj et al. [12] reported that the effect of treatment by nano-hesperetin was higher compared to hesperetin on antioxidant activities and behavioral disorders in ASD rats. Molaveisi et al. [13] reported that oral bioavailability was improved by echinacea extract phytosome developed for oral consumption. In conclusion, SNP has promising effects on neuropathological disorders such as ASD.

Ethical Considerations**Compliance with ethical guidelines**

All procedures were according to ethical guidelines for the use of animals in research of the University of Mazandaran (Code: IR.UMZ.REC.1397.021).

Funding

This study was supported by the Cognitive Science and Technologies Council of Vice Presidency for Science and Technology (Grant Number: 0786).

Authors' contributions

Conceptualization, supervision, editing & review: Akbar Hajizadeh Moghaddam; Data collection: Haniyeh Abbasalipour; Data analysis: Mojtaba Ranjbar and Sedigheh Khanjani Jelodar.

Conflicts of interest

The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgements

The authors would like to thank the Deputy for Research of the University of Mazandaran for their cooperation.

مقاله پژوهشی

اثر نانوفیتوزوم سماق بر اختلالات شناختی و استرس اکسیداتیو القاشه با والپروئیک اسید در مدل آتیسمی موش صحرایی

اکبر حاجیزاده مقدم^۱، هانیه عباسعلی پور^۱، مجتبی رنجبر^۲، صدیقه خانجانی جلودار^۳

۱. گروه زیست جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

۲. دانشکده بیوتکنولوژی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران.

۳. گروه زیست جانوری، دانشکده علوم و زیست فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چیکیده

زمینه اختلالات طیف آتیسم گستره وسیعی از اختلالات عصبی پیشرفتی را نشان می دهد که با علام گستردگی شامل نقص تعامل اجتماعی، ارتباطات و نقص های شناختی مشخص می شوند. اگرچه میوه سماق حاوی ترکیباتی با خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی است، به دلیل پایین بودن دسترسی زیستی و فراهمی زیستی کارایی آن محدود است.

هدف از این پژوهش بررسی اثر حافظت نورونی سماق و نانوفیتوزوم سماق بر اختلال حافظه و شاخص های استرس اکسیداتیو در ناحیه هیپوکامپ مغز موش های مدل آتیسمی است.

مواد و روش ها در این مطالعه تجربی، موش های ماده باردار به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. در گروه آزمایش اسید والپروئیک (VPA) با 500 میلی گرم در کیلوگرم در روز $12/5$ حاملگی به صورت درون صنایی تزریق شد. نوزادان نر هر دو گروه 21 روز بعد از تولد تقسیم پندی شدند. حیوانات سالم به دو گروه کنترل سالین و کنترل نانوفیتوزوم سماق تقسیم شدند که به ترتیب سالین و نانوفیتوزوم عصاره سماق (SNP) را با 40 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت چهار هفته به صورت گاواز دریافت کردند. همچنین نوزادان گروه آزمایش نیز به سه گروه آزمایش، آزمایش تیمارشده با نانوفیتوزوم عصاره سماق تقسیم شدند که به ترتیب سالین، عصاره سماق و نانوفیتوزوم سماق را با 40 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت چهار هفته به صورت خوراکی دریافت کردند. برای لرزیابی حافظه، آزمون شناسایی شیء جدید 49 روز پس از تولد انجام شد. در پایان سطح آنتی اکسیدان TAC و فعالیت آنزیمهای گلوتاکیون پروکسیداز (GPX)، گلوتاکیون روکتاز (GRX) و کاتالاز (CAT) در ناحیه هیپوکامپ اندازه گیری شد.

نتایجهای براساس نتایج ماده اسید والپروئیک به طور قابل توجهی ($P < 0.001$) سبب کاهش شاخص تعیین در آزمون تشخیص شی جدید، فعالیت آنزیمهای GRX و GPX و سطح CAT در هیپوکامپ شد. تیمار با نانوفیتوزوم سماق به طور معنی داری ($P < 0.001$) باعث بهبود اختلال رفتاری و افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان (GRX، GPX و CAT) و سطح آنتی اکسیدان TAC شد.

نتیجه گیری نتایج این مطالعه شان داد که نانوفیتوزوم سماق در مقایسه با عصاره میوه سماق به دلیل افزایش فراهمی زیستی باعث بهبود مؤثر نقص حافظه و استرس اکسیداتیو در موش های مدل آتیسمی می شود.

تاریخ دریافت: ۱۸ تیر ۱۳۹۹

تاریخ پذیرش: ۱۰ آذر ۱۳۹۹

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۹

کلیدواژه ها:

آتیسم، نانوفیتوزوم سماق، والپروئیک اسید، استرس اکسیداتیو، موش صحرایی نر

علاوه این بیماری به آن اختلال طیف آتیسم^۱ گفته می شود. علت عده بروز این اختلال تعامل بین فاكتورهای ژنتیکی و محیطی است.^[۱, ۲]

هیپوکامپ یکی از نواحی مغز است که عملکردش در

مقدمه

آتیسم اختلال تکوین عصبی است که با اختلال رفتارهای ارتباطی، کلامی و یادگیری همراه است. این اختلال که در سه سال اول زندگی ظاهر می شود و با شیوع بالای یک در هر 68 نفر یکی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی به شمار می آید. شیوع این اختلال در پسران بیشتر از دختران است. به علت طیف وسیع

* نویسنده مسئول:

اکبر حاجیزاده مقدم

نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست جانوری.

تلفن: +۹۸ (۰) ۳۵۳۰ ۲۴۵۳

رایانامه: a.hajizadeh@umz.ac.ir

1. Autism Spectrum Disorder (ASD)

و فرم نانوفیتوزوم آن بر اختلال یادگیری و استرس اکسیدانی VPA هیپوکامپ موش‌هایی است که در دوران بارداری در معرض قرار گرفتند.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه تجربی موش‌های صحرایی ماده باردار نژاد ویستار از پژوهشکده انتستیتو پاستور آمل خریداری شدند و در اتاق حیوانات در شرایط استاندارد ۱۲ ساعت نور و ۱۲ ساعت تاریکی در دمای ۲۳ ± 2 درجه سانتی‌گراد، در مرکز تکثیر و پروش حیوانات آزمایشگاهی گروه علوم جانوری دانشگاه مازندران نگه‌داری شدند. غذای مخصوص حیوانات به میزان کافی در دسترس بود. موش‌های نر و ماده به مدت ۲۴ ساعت برای آمیزش در کنار هم قرار گرفتند. روز اول بارداری بعد از مشاهده پلاک واژتال در نظر گرفته شد. ابتدا موش‌های ماده باردار به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. موش‌های باردار گروه آزمایش ۵۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن والپروئیک اسید (سیگما، آمریکا) را در روز $۱۲/۵$ بارداری به صورت درون‌صفاقی دریافت کردند و موش‌های باردار گروه کنترل در همان روز سالین دریافت کردند. در ادامه موش‌های نر متولد شده از مادران گروه کنترل، به دو گروه کنترل سالم و کنترل مثبت تقسیم شدند که ۲۱ روز بعد از تولد به ترتیب سالین و نانوفیتوزوم عصاره سماق با ۴ میلی‌گرم بر کیلوگرم را به مدت چهار هفته به صورت گواز دریافت کردند. همچنین موش‌های نر متولدشده از گروه آزمایش نیز ۲۱ روز بعد از تولد به سه گروه آزمایش، آزمایش تیمارشده با عصاره سماق^۴ و آزمایش تیمارشده با نانوفیتوزوم عصاره سماق^۵ تقسیم شدند. عصاره سماق و نانوفیتوزوم آن با ۴۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم به مدت چهار هفته به صورت خوراکی دریافت کردند. در تمامی گروه‌ها از ۶ سر موش صحرایی نر استفاده شده است.

روش تهیه نانوفیتوزوم سماق

میوه سماق^۶ از منطقه لاریجان آمل (مازندران) جمع‌آوری شد و در گروه علوم گیاهی دانشگاه مازندران از نظر علمی با کد هریاریومی ۱۱۵۲۶ تأیید شد. میوه‌ها به مدت ۲ روز در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد خشک و پودر شدند. سپس مقدار ۱۰۰ گرم از پودر میوه با ۲۰۰ سی‌سی اتانول (۹۶ درصد) به مدت ۳ روز در دمای اتاق بر روی شیکر قرار داده شد. در پایان از طریق کاغذ صافی فیلتر و با استفاده از دستگاه روتاری، الكل عصاره حذف شد. عصاره نهایی در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد، نگهداری شد. نانوفیتوزوم سماق به روش اثانولی تهیه شده است^[۱۲]. به طور خلاصه عصاره سماق در دمای ۵۵ درجه سانتی‌گراد در ۳ گرم فسفاتیدیل کولین و $۲/۱۶$ گرم توبین ۸۰ حل شده و سپس محلول فوق همراه با ۱۲۰ میلی‌لیتر اثانول ۹۶ درصد به بافر

4. Sumac Extract (SE)

5. Sumac Nanophytosome (SNP)

6. R.coriaria

بیماری اُتیسم دچار آسیب می‌شود. مطالعات متعددی نشان داد که اختلال یادگیری، حافظه، زبان و عملکرد شناختی از جمله مشکلات افراد اُتیسمی است که احتمالاً ناشی از نقص در عملکرد ناحیه هیپوکامپ است^[۳]. برای بررسی اختلالات طیف اُتیسم از مدل‌های حیوانی متعددی استفاده می‌شود. از متدالوگ‌های روش‌های القا مدل حیوانی اُتیسم، تزریق والپروئیک اسید^۷ در دوران بارداری است. امروزه مطالعات گسترده نشان داده‌اند که تزریق والپروئیک اسید در دوران بارداری می‌تواند سبب القا اختلال شباهت‌آییمی شود. والپروئیک اسید با نام‌های تجاری دپاکین و الپاکین از داروهای ضدصرع و ضدشنج است. والپروئیک اسید از طریق کاهش سطح گلوتاتیون احیا شده، افزایش گونه اکسیژن فعال و غیرفعال‌سازی میتوکندری سبب افزایش استرس اکسیداتیو و التهابی در سیستم عصبی می‌شود^[۴, ۵].

عدم تعادل میان گونه‌های فعال اکسیژن^۸ و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی نقش مهمی در بسیاری از بیماری‌های عصبی از جمله اُتیسم دارد. کنش رادیکال‌های آزاد با ترکیبات لیپیدی، کربوهیدرات‌های پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها منجر به تغییر ساختار آن‌ها و نهایتاً اختلال عملکرد میتوکندریابی و مرگ برنامه‌ریزی شده نورون‌ها می‌شود. در مراحل اولیه تکوین سیستم عصبی، نورون‌ها به استرس اکسیداتیو آسیب‌پذیرتر هستند، به طوری که منجر به بروز اختلالات رفتاری از جمله نقص شناختی، افسردگی، اضطراب در بیماری اسکیزوفرنی و اُتیسم می‌شود^[۶, ۷].

اگرچه درمان قطعی بیماری اُتیسم تاکنون دقیقاً مشخص نشده است اما استفاده از ترکیبات دارویی طبیعی می‌تواند تا حدودی علائم بیماری را، بدون ظهور عوارض جانبی، کاهش دهد. امروزه به دلیل اثرات سوء داروهای شیمیایی، استفاده از گیاهان دارویی با اقبال بیشتری مواجه شده است.

میوه سماق به دلیل داشتن خاصیت آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی و آنتی‌باکتریایی در طب سنتی گیاهی برای درمان بیماری دیابت، سکته، سرطان و بیماری‌های عصبی شناخته شده است. عصاره میوه این گیاه غنی از تانین، پلی‌فنول‌ها و فلاونوئیدها مانند گالیک اسید، متیل گالات، کوئرستین و آنتوسیانین و اسید چرب است^[۷-۹]. علی‌رغم اثرات دارویی فراوان، کاربرد درمانی میوه سماق به دلیل جذب و دسترسی زیستی اندک با محدودیت روبه‌رو است. در سال‌های اخیر برای افزایش کارایی و اثربخشی گیاهان دارویی رویکرد مختلفی از قبیل استفاده از ترکیبات طبیعی به فرم نانو و حامل‌های دارویی همچون لیپوزوم و فیتوزوم مدنظر محققین قرار گرفته^[۱۰]. نانوفیتوزوم از جمله نانوحامل دارویی نوین است که در سیستم انتقال دارو استفاده می‌شود^[۱۱]. هدف ما از این مطالعه بررسی اثرات عصاره میوه سماق

2. Valproic Acid (VPA)

3. Reactive Oxygen Species (ROS)

مولار، گلوتاتیون کاھیده ۴ میلیمولار، سدیم فسفات ۰/۴ مولار با $\text{pH}=7$ که ۰/۴ میلیمولار EDTA و ۰/۰ میلیمولار NADPH در آن حل شده است. سپس ۲۰۰ میکرولیتر محلول رویی بافت هموژن شده به مخلوط واکنش اضافه شد و اجازه داده شد به مدت ۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه شود و درنهایت پراکسید هیدروژن ۴ میلیمولار به مخلوط اضافه شد و جذب محلول در طول موج ۳۴۰ نانومتر و به مدت ۲ دقیقه خوانده شد [۱۶]. فعالیت آنزیم گلوتاتیوندوکتاز^{*} به روش رومرو و براساس اکسیداسیون NADPH محاسبه شد [۱۷]. مخلوط واکنش حاوی بافر پتاسیم فسفات ۰/۱ مولار با $\text{pH}=7$ ۲/۵ میلیمولار GSSG و ۰/۰ میلیمولار NADPH است. سپس ۶۰ میکرولیتر محلول رویی از بافت هموژن شده و ۷۴۰ میکرولیتر محلول واکنش اضافه شد. تغییرات جذب نوری مربوط به فعالیت این آنزیم در طول موج ۳۴۰ نانومتر و طی ۳ دقیقه اندازه گیری شد.

سنجهش سطح آنتی اکسیدان تام

برای سنجهش سطح آنتی اکسیدان تام (TAC) ۵۰ میکرولیتر از محلول رویی به ۱/۵ میلی لیتر معرف FRAP افزوده شد و بعد از ۱۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه بن ماری، در طول موج ۵۹۳ نانومتر جذب اندازه گیری شد. برای صفر کردن دستگاه از مخلوط ۲۰ میکرولیتر آب مقطر در ۱/۵ میلی لیتر محلول FRAP، به عنوان بلازنک، استفاده شد. با استفاده از منحنی استانداردها و معادله خط به دست آمده از FeSO_4 غلظت آنتی اکسیدان تام نمونه ها محاسبه شد. غلظت آنتی اکسیدان بر حسب $\mu\text{M/g Tissue}$ گزارش شد [۱۸].

آنالیز آماری

برای تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه بین گروه ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه^{۱۰} و در صورت معنی دار شدن از آزمون تعقیبی استفاده شد. تمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و نسخه Prism انجام شده و مقادیر P کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج به صورت میانگین و انحراف معیار بیان شدند. برای رسم نمودارها نیز از نرم افزار Prism استفاده شد.

نتایج

بررسی اثر عصاره سماق و نانو فیتوzوم سماق بر شاخص تبعیض در آزمون شناسایی شی جدید

نتایج آزمون شناسایی شی جدید نشان داد که شاخص تبعیض در گروه بیمار کاهش معنی دار ($P<0/001$) یافت. این شاخص در گروه آزمایش تیمارشده با غلظت ۴۰ میلی گرم بر کیلو گرم سماق نسبت به گروه آزمایش افزایش معنی داری ($P<0/001$) نشان داده است؛ همچنین شاخص تبعیض در گروه آزمایش تیمارشده با نانو فیتوzوم سماق با $d=40$ میلی گرم به کیلو گرم نیز افزایش معنی داری

9. Glutathione Reductase (GRx)

10. ANOVA

هیدراتاسیون (محلول بافر فسفات ۰/۰۱ مولار، ۱۵۰ میلی مولار NaCl ، $\text{pH}4.7$) در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد اضافه شد. برای حذف اتانول، محلول نهایی با همزن مغناطیسی به مدت ۳۰ دقیقه درون حمام آب در تبخیر کننده روتاری در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد قرار گرفت. در پایان برای تشکیل نانوفیتوzوم و تولید ذرات کوچک تراز صد نانومتر، محلول نهایی به مدت ۳۰ دقیقه در دستگاه اولتراسونیک در دمای ۴ درجه سانتی گراد قرار داده شد.

تست شناسایی شی جدید

آزمون شناسایی شی جدید برای ارزیابی میزان اختلال حافظه انجام شد. این آزمون شامل سه مرحله است. مرحله اول (عادت) در مدت ۳ تا ۵ دقیقه انجام شد. در مرحله دوم با مرحله آموزش دو شی کاملاً یکسان در کف اتاق قرار گرفت و موش به مدت ۱۰ دقیقه در اتاق به صورت آزادانه قرار داده شد. در مرحله سوم که مرحله آزمون حافظه حیوان است، شی جدیدی که از نظر مورفولوژی متفاوت با دو شی قبلی بود، جایگزین یکی از اشیا شده و موش به مدت ۵ دقیقه در اتاق قرار گرفت. در پایان با تقسیم زمان بررسی شی جدید بر مجموع مدت زمان بررسی شی آشنا و جدید، شاخص زمانی تشخیص شی جدید محاسبه شد [۱۳].

نمونه برداری

پس از ارزیابی اختلالات شناختی، حیوانات با کلروفرم بی هوش شدند و برای خارج شدن خون از بدن ریپر فیوژن قلبی انجام شد. در ادامه به کمک ماتریکس مغزی ناحیه هیپوکامپ جدا شده و بلاقلاله در نیتروژن مایع قرار گرفت. بافت هموژن شده هیپوکامپ با سرعت ۱۳۰۰ rpm به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی گراد سانتریفیوژ شد و محلول شفاف رویی آن برای سنجهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی استفاده شد.

تعیین غلظت پروتئین به روش برادرافورد


برای تعیین غلظت پروتئین نمونه ها از روش برادرافورد استفاده شد و جذب هر نمونه در طول موج ۵۹۵ نانومتر خوانده شد. هرچه غلظت پروتئین حل شده بیشتر باشد، میزان رنگ آبی حاصل و جذب نوری آن افزایش می یابد [۱۴].

سنجهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی

برای سنجهش فعالیت آنزیم کاتالاز^{۱۱} از روش ابی استفاده شد [۱۵]. محلول نهایی واکنش شامل بافر سدیم فسفات ۵۰ میلی مولار در $\text{pH}=7$ است که حاوی ۱۰ میلی مولار H_2O_2 است. ۶۰ میکرولیتر از محلول رویی بافت هیپوکامپ هموژن شده به ۷۴۰ میکرولیتر مخلوط واکنش اضافه شد. جذب محلول در طول موج ۲۴۰ نانومتر به مدت ۲ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد خوانده شد. برای سنجهش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز^{۱۲} در هر نمونه از مخلوط واکنشی که شامل سدیم آزید ۵ میلی-


7. Catalase (CAT)

8. Glutathione Peroxidase (GPx)




تصویر ۲. بررسی اثر عصاره سماق و نانوفیتوزوم سماق بر فعالیت آنزیم کاتالاز در هیپوکامپ (عصاره میوه سماق: SE و نانو فیتوزوم سماق: SNP) (n=6, Mean \pm SEM) در مقایسه با گروه کنترل، *P<0.05 و **P<0.01 در مقایسه با گروه بیمار.

بررسی اثر عصاره سماق و نانو فیتوزوم سماق بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی آنزیم کاتالاز هیپوکامپی با توجه به تصویر شماره ۲، فعالیت آنزیم کاتالاز هیپوکامپی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی‌دار




تصویر ۱. بررسی اثر عصاره سماق و نانوفیتوزوم سماق بر مدت زمان صرف شده برای شی جدید (Mean \pm SEM n=6) در مقایسه با گروه کنترل، ***P<0.001 در مقایسه با گروه میوه سماق: SE و نانو فیتوزوم سماق: SNP در مقایسه با گروه آزمایش با گروه آزمایش و #P<0.05 در مقایسه با گروه SE.


(P>0.05) نسبت به گروه آزمایش نشان داد و افزایش این شاخص در گروه تیمارشده با نانوفیتوزوم در مقایسه با گروه تیمارشده با عصاره سماق نیز چشمگیر بود (P<0.05) (تصویر شماره ۱).



تصویر ۴. بررسی اثر عصاره سماق و نانوفیتوزوم سماق بر فعالیت گلوتاپیون پراکسیداز در هیپوکامپ (n=6, Mean \pm SEM) عصاره میوه سماق: SE و نانو فیتوزوم سماق: SNP در مقایسه با گروه کنترل، ***P<0.001 در مقایسه با گروه آزمایش و ****P<0.0001 در مقایسه با گروه بیمار.



تصویر ۳. بررسی اثر عصاره سماق و نانوفیتوزوم سماق بر فعالیت گلوتاپیون ردوکتاز در هیپوکامپ (n=6, Mean \pm SEM) عصاره میوه سماق: SE و نانو فیتوزوم سماق: SNP در مقایسه با گروه کنترل، *P<0.05 در مقایسه با گروه آزمایش و #P<0.05 در مقایسه با گروه SE.



مجله دانشگاه علوم پزشکی کیلان

تصویر ۵. بررسی اثر عصاره سماق و نانوفیتوزوم سماق بر سطح آنتی اکسیدان تام در هیپوکامپ مغز موش مدل آنیسم (n=6 Mean±SEM) عصاره میوه سماق: SNP و نانوفیتوزوم سماق: SE در مقایسه با گروه کنترل، P<0.001 در مقایسه با گروه بیمار و P<0.01 در مقایسه با گروه SE40.

بحث و نتیجه‌گیری

آنیسم طیفی از اختلالات عصبی است که با اختلال در ارتباطات، حافظه و عملکرد شناختی همراه است. مطالعات قبلی نشان داده است که برهم‌کنش‌های ژنتیکی و محیطی در طی مراحل تکوین سیستم عصبی در بروز این اختلال مؤثر است [۱۹]. مصرف داروی ضدصرع والپرتوئیک اسید در اولی دوران بارداری به عنوان یکی از فاکتورهای محیطی احتمال بروز آنیسم را در فرزندان افزایش می‌دهد. مطالعات متعددی نشان داده است که قرار گرفتن در معرض VPA در طول دوران بارداری در رتهای نژاد ویستار سبب القا مدل آنیسم می‌شود [۲۰]. مطالعات نشان داده است یکی از مناطق درگیر در آنیسم ناحیه هیپوکامپ است [۲۱]. در مطالعه حاضر داده‌های آزمون رفتاری شناسایی شی جدید نشان داد که تزریق VPA در دوران بارداری موجب کاهش شاخص تعییض می‌شود و این نتایج در راستای تأیید گزارش هارا و همکاران است [۱۶]. مطالعه نیکولینی و همکاران نیز نشان داد تزریق VPA سبب القارفارهای شبه‌آنیسمی در جوندگان می‌شود [۲۱].

نتایج بیوشیمیایی پژوهش ما حاکی از آن است که تزریق VPA در دوران بارداری موجب کاهش معنی دار فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی کاتالاز، گلوتاتیون ردوکتاز و گلوتاتیون پراکسیداز و همچنین باعث کاهش تغییرات سطوح آنتی اکسیدان تام در ناحیه هیپوکامپ مغز شده است. افزایش استرس اکسیداتیو در مغز افراد مبتلا به آنیسم عامل مهمی در پاتوفیزیولوژی آنیسم است. در پژوهش قبلی القا رفتارهای شبه‌آنیسمی ناشی از تزریق VPA و کاهش فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گزارش شده است [۲۲]. پرآگنیا و همکاران نشان دادند تزریق VPA موجب کاهش فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی می‌شود [۲۳]. گائو و همکارانش نیز

(P<0.001) را نشان داده است و تنها تیمار با نانوفیتوزوم سماق سبب افزایش معنی دار (P<0.05) فعالیت این آنزیم در مقایسه با گروه آزمایش شد. بر اساس تصویر شماره ۳، فعالیت آنزیم GRX در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار (P<0.05) داشته است. این در حالی است که فعالیت این آنزیم در گروه SNP نسبت به گروه آزمایش افزایش معنی دار (P<0.001) نشان داد. همچنین سطح فعالیت این آنزیم در گروه SNP نسبت به گروه SE نیز افزایش معنی داری نشان داده است (P<0.05).

با توجه به تصویر شماره ۴، فعالیت آنزیم GPX هیپوکامپ در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری (P<0.001) نشان داده است. تیمار با عصاره میوه سماق با دُز ۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم (SE40) بر فعالیت این آنزیم تأثیری ندارد و گروه آزمایش تیمارشده با SE کاهش معنی داری (P<0.001) در مقایسه با گروه کنترل نشان می‌دهد. در حالی که فعالیت آنزیم GPX در گروه تیمارشده با SNP در مقایسه با گروه آزمایش افزایش معنی داری (P<0.001) نشان داد، به طوری که در گروه SNP40 نسبت به SE نیز افزایش معنی دار (P<0.001) مشاهده شد.

بررسی اثر عصاره سماق و نانوفیتوزوم سماق بر سطح فعالیت آنتی اکسیدان تام

تصویر شماره ۵ نشان می‌دهد که سطح آنتی اکسیدان تام هیپوکامپ بین گروه کنترل و گروه آزمایش آنتی اکسیدان معنی داری وجود ندارد اما در گروه آزمایش کاهش معنی دار (P<0.001) نسبت به گروه کنترل نشان داده است. این در حالی است که تنها تیمار با SNP سبب افزایش معنی دار (P<0.001) سطح آنتی اکسیدان تام نسبت به گروه آزمایش شده است. همچنین در گروه SNP نسبت به گروه SE نیز افزایش معنی داری (P<0.001) مشاهده شد.

همچون قابلیت زیستی و جذب پایین که ناشی از حل پذیری ضعیف در چربی و اندازه بزرگ آن هاست، درمان را تا حدودی دچار مشکل می کند [۱]. تکنولوژی نانو با افزایش قابلیت زیستی و جذب رودهای روش جدیدی برای حل این مشکل است در میان ساختارهای مختلف نانوحامل، فیتوzوم کارآمدترین شکل نانوحامل است [۲۷].

در نتایج تحقیق حاضر اثرات بهبودی نانوفیتوzوم سماق با غلظت ۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه دریافت‌کننده عصاره سماق با غلظت مشابه چشمگیرتر بود. به طوری که در شاخص تعییض نسبت گروه سماق افزایش معنی داری مشاهده شد. بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های آنژیمی و غیرآنژیمی آنتی‌اکسیدانی هیپوکامپ بیانگر اثرات بارز ساختار نانوفیتوzومی سماق با غلظت ۴۰ در مقایسه با عصاره با همین غلظت است. در همین راسته، مشاهده شد که نانوفیتوzوم سماق با خواص آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی و محافظ نورونی خود موجب افزایش معنی دار فعالیت آنژیم‌های آنتی‌اکسیدانی و سطح آنتی‌اکسیدان تام و بهبود رفتار یادگیری در رت‌های مدل اوتیستیک شده است. نانوفیتوzوم سماق احتمالاً با خاصیت آنتی‌اکسیدانی خود سبب حفاظت نورون شده و از این رو توانسته است اثر مخرب VPA را در هیپوکامپ موش‌های اوتیسمی مهار کند.

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

در این مطالعه تمامی مراحل کار با حیوان از مایشگاهی مطابق با منشور اخلاق زیستی دانشگاه مازندران با کد اخلاقی IR.UMZ.REC.1397.021 انجام شد.

حامی مالی

این مطالعه با حمایت مالی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام گرفته است (طرح شماره: ۰۷۸۶).

مشارکت نویسنده‌گان

مفهوم‌سازی، نظارت، ویراستاری و نهایی‌سازی نوشه: اکبر حاجی‌زاده مقدم؛ جمع‌آوری داده‌ها: هانیه عباسعلی‌پور، آنالیز و بررسی داده‌ها: صدیقه خانجانی جلودار و مجتبی رنجبر.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسنده‌گان این مقاله تعارض منافع ندارد.

گزارش کردند که تزریق VPA به موش‌های ماده باردار سبب کاهش فعالیت آنژیم‌های آنتی‌اکسیدانی در زاده‌ها می‌شود [۲۴]. از آنجایی که مطالعات متعدد نشان می‌دهد سطوح ترکیبات آنتی‌اکسیدانی در افراد مبتلا به اوتیسم تغییر می‌کند، بنابراین اختلال در مکانیسم‌های دفاعی آنتی‌اکسیدانی نقش مهمی در بروز اختلال اوتیسمی ایفا می‌کنند [۲۵]. علاوه بر این آنژیم‌های آنتی‌اکسیدانی از جمله X-GP اسیب رساندن سوپر اکسیدها به DNA می‌شوند. GSH آنتی‌اکسیدان اندوزنی است که توسط سلول‌ها تولید می‌شود و نقش مهمی در خنثی کردن ROS، سمزدایی و حذف سوم زیست محیطی ایفا می‌کند. افزایش استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ افراد مبتلا به اوتیسم نشان می‌دهد که استرس اکسیداتیو ممکن است عامل مهمی در پاتوفیزیولوژی اوتیسم باشد [۲۶].

در این مطالعه اثر حفاظتی سماق و نانوفیتوzوم آن بر شاخص رفتار شناختی و همچنین بر میزان سطح آنتی‌اکسیدان تام و فعالیت آنژیم‌های آنتی‌اکسیدانی بافت هیپوکامپ در فرزندان اوتیسمی که مادران آن‌ها در دوره بارداری در معرض قرار گرفتند، بررسی شد. نتایج داده‌های رفتاری این پژوهش نشان داد که مصرف سماق و نانوفیتوzوم سماق سبب بهبود رفتارهای شناختی در فرزندان اوتیسمی می‌شود. بررسی شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی هیپوکامپ نشان داد که نانوفیتوzوم سماق موجب افزایش فعالیت آنژیم‌های کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز و سطح آنتی‌اکسیدان تام می‌شود. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نانوفیتوzوم سماق احتمالاً به واسطه قابلیت زیستی بالاتر و جذب بهتر در لوله گوارش نسبت به عصاره خام سماق سبب بهبود اختلال شناختی و استرس اکسیداتیو هیپوکامپی القا شده با VPA در مدل اوتیسم می‌شود.

آنتی‌اکسیدان‌ها نقش مهمی در کنترل یا درمان اختلالات تحلیل عصبی مانند آزمایم‌پارکینسون، سکته و اوتیسم ایفا می‌کنند. سماق نیز با روش‌های مختلفی به فعالیت آنتی‌اکسیدانی کمک می‌کند. مطالعات اخیر حضور آنتی‌اکسیدان‌های گوناگون شامل اسید‌گالیک، فنول‌ها و اسیدهای چرب را در سماق ثابت کرده‌اند [۱۵]. آنتوسیانین و تانن‌های هیدرولیز شده در سماق از پراکسیداتسیون لیپید جلوگیری می‌کند. علاوه بر این گالیک اسید موجود در سماق از آسیب DNA در برابر ROS محافظت می‌کند و نیز رادیکال هیدروکسیل را مهار می‌کند [۷].

استرس اکسیداتیو منجر به افزایش H_2O_2 و ROS می‌شود که ROS سبب پراکسیداتسیون لیپید و آسیب سلولی و آسیب به DNA می‌شود. بنابراین درمان با سماق موجب کاهش H_2O_2 می‌شود و در نتیجه می‌تواند از پراکسیداتسیون لیپید و آسیب به DNA جلوگیری کند و نیز گالیک اسید موجود در سماق از DNA در برابر ROS محافظت می‌کند [۱۵]. هرچند سماق در درمان بیماری‌های مختلف استفاده می‌شود اما به دلیل داشتن مشکلاتی

References

- [1] Meguid NA, Dardir AA, Abdel-Raouf ER, Hashish A. Evaluation of oxidative stress in autism: Defective antioxidant enzymes and increased lipid peroxidation. *Biological Trace Element Research*. 2011; 143(1):58-65. [DOI:10.1007/s12011-010-8840-9] [PMID]
- [2] Mousavinejad E, Ghaffari MA, Riahi F, Hajmohammadi M, Tiznobeyk Z, Mousavinejad M. Coenzyme Q10 supplementation reduces oxidative stress and decreases antioxidant enzyme activity in children with Autism Spectrum Disorders. *Psychiatry Research*. 2018; 265:62-9. [DOI:10.1016/j.psychres.2018.03.061] [PMID]
- [3] Cheaha D, Burmrungsi S, Chatpun S, Kumarnsit E. Characterization of in utero valproic acid mouse model of autism by local field potential in the hippocampus and the olfactory bulb. *Neuroscience Research*. 2015; 98:28-34. [DOI:10.1016/j.neures.2015.04.006] [PMID]
- [4] Silvestrin RB, Bambini-Junior V, Galland F, Bobermim LD, Quincozes-Santos A, Abib RT, et al. Animal model of autism induced by prenatal exposure to valproate: Altered glutamate metabolism in the hippocampus. *Brain Research*. 2013; 1495:52-60. [DOI:10.1016/j.brainres.2012.11.048] [PMID]
- [5] Kumaravel P, Melchias G, Vasanth N, Manivasagam T. Epigallocatechin gallate attenuates behavioral defects in sodium valproate induced autism rat model. *Research Journal of Pharmacy and Technology*. 2017; 10:1477-80. [DOI:10.5958/0974-360X.2017.00260.8]
- [6] Fontella FU, Siqueira IR, Vasconcellos AP, Tabajara AS, Netto CA, Dalmaz C. Repeated restraint stress induces oxidative damage in rat hippocampus. *Neurochemical Research*. 2005; 30(1):105-11. [DOI:10.1007/s11064-004-9691-6] [PMID]
- [7] Sağlam M, Köseoğlu S, Hatipoğlu M, Esen HH, Köksal E. Effect of sumac extract on serum oxidative status, RANKL/OPG system and alveolar bone loss in experimental periodontitis in rats. *Journal of Applied Oral Science*. 2015; 23(1):33-41. [DOI:10.1590/1678-775720140288] [PMID] [PMCID]
- [8] Rajan VK, Muraleedharan K. A computational investigation on the structure, global parameters and antioxidant capacity of a polyphenol, Gallic acid. *Food Chemistry*. 2017; 220:93-9. [DOI:10.1016/j.foodchem.2016.09.178] [PMID]
- [9] Peng Y, Zhang H, Liu R, Mine Y, McCallum J, Kirby C, et al. Antioxidant and anti-inflammatory activities of pyranoanthocyanins and other polyphenols from staghorn sumac (*Rhus hirta* L.) in Caco-2 cell models. *Journal of Functional Foods*. 2016; 20:139-47. [DOI:10.1016/j.jff.2015.10.026]
- [10] Riaz H, Raza SA, Aslam MS, Ahmad MS, Ahmad MA, Maria P. An updated review of pharmacological, standardization methods and formulation development of rutin. *Journal of Pure and Applied Microbiology*. 2018; 12:127-32. [DOI:10.22207/JPAM.12.1.16]
- [11] Karimi N, Ghanbarzadeh B, Hamishehkar H, Keyvani F, Pezeshki A, Gholian MM. [Phytosome and liposome: The beneficial encapsulation systems in drug delivery and food application (Persian)]. *Applied Food Biotechnology*. 2015; 2(3), 17-27. <https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=466705>
- [12] Shin GH, Chung SK, Kim JT, Joung HJ, Park HJ. Preparation of chitosan-coated nanoliposomes for improving the mucoadhesive property of curcumin using the ethanol injection method. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 2013; 61(46):11119-26. [DOI:10.1021/jf4035404] [PMID]
- [13] Zavvari F, Karimzadeh F. A review on the behavioral tests for learning and memory assessments in rat. *The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam*. 2017; 5(4):110-24. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.5.4.110]
- [14] Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry*. 1976; 72(1-2):248-54. [DOI:10.1016/0003-2697(76)90527-3]
- [15] Aebi H. [13] Catalase in vitro. *Methods in enzymology*. 1984; 105:121-6. [DOI:10.1016/S0076-6879(84)05016-3]
- [16] Hara Y, Ago Y, Higuchi M, Hasebe S, Nakazawa T, Hashimoto H, et al. Oxytocin attenuates deficits in social interaction but not recognition memory in a prenatal valproic acid-induced mouse model of autism. *Hormones and Behavior*. 2017; 96:130-6. [DOI:10.1016/j.yhbeh.2017.09.013] [PMID]
- [17] Pinto RE, Bartley W. The effect of age and sex on glutathione reductase and glutathione peroxidase activities and on aerobic glutathione oxidation in rat liver homogenates. *Biochemical Journal*. 1969; 112(1):109-15. [DOI:10.1042/bj1120109] [PMID] [PMCID]
- [18] Benzie IF, Strain JJ. The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) as a measure of "antioxidant power": The FRAP assay. *Analytical Biochemistry*. 1996; 239(1):70-6. [DOI:10.1006/abio.1996.0292] [PMID]
- [19] Wei H, Alberts I, Li X. The apoptotic perspective of autism. *International Journal of Developmental Neuroscience*. 2014; 36:13-8. [DOI:10.1016/j.ijdevneu.2014.04.004] [PMID]
- [20] Cezar LC, Kirsten TB, da Fonseca CC, de Lima AP, Bernardi MM, Felicio LF. Zinc as a therapy in a rat model of autism prenatally induced by valproic acid. *Progress in Neuro-psychopharmacology and Biological Psychiatry*. 2018; 84:173-80. [DOI:10.1016/j.pnpbp.2018.02.008] [PMID]
- [21] Nicolini C, Fahnestock M. The valproic acid-induced rodent model of autism. *Experimental Neurology*. 2018; 299:217-27. [DOI:10.1016/j.expneurol.2017.04.017] [PMID]
- [22] Khalaj R, Moghaddam AH, Zare M. Hesperetin and its nanocrystals ameliorate social behavior deficits and oxido-inflammatory stress in rat model of autism. *International Journal of Developmental Neuroscience*. 2018; 69:80-7. [DOI:10.1016/j.ijdevneu.2018.06.009] [PMID]
- [23] Pragnya B, Kameshwari JS, Veeresh B. Ameliorating effect of piperine on behavioral abnormalities and oxidative markers in sodium valproate induced autism in BALB/C mice. *Behavioural Brain Research*. 2014; 270:86-94. [DOI:10.1016/j.bbr.2014.04.045] [PMID]
- [24] Gao J, Wang X, Sun H, Cao Y, Liang S, Wang H, et al. Neuroprotective effects of docosahexaenoic acid on hippocampal cell death and learning and memory impairments in a valproic acid-induced rat autism model. *International Journal of Developmental Neuroscience*. 2016; 49:67-78. [DOI:10.1016/j.ijdevneu.2015.11.006] [PMID]

- [25] Chakraborty A, Ferk F, Simić T, Brantner A, Dušinská M, Kundt M, et al. DNA-protective effects of sumach (*Rhus coriaria L.*), a common spice: Results of human and animal studies. *Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis*. 2009; 661(1-2):10-7. [DOI:10.1016/j.mrfmm.2008.10.009] [PMID]
- [26] Al-Amin MM, Rahman MM, Khan FR, Zaman F, Reza HM. Astaxanthin improves behavioral disorder and oxidative stress in prenatal valproic acid-induced mice model of autism. *Behavioural Brain Research*. 2015; 286:112-21. [DOI:10.1016/j.bbr.2015.02.041] [PMID]
- [27] Shivanand P, Kinjal P. Phytosomes: Technical revolution in phytomedicine. *International Journal of PharmTech Research*. 2010; 2(1):627-31. https://www.researchgate.net/publication/266065880_Phytosomes_Technical_Revolution_in_Phytomedicine
- [28] Nazari M, Ghanbarzadeh B, Kafil HS, Zeinali M, Hamishehkar H. Garlic essential oil nanophytosomes as a natural food preservative: Its application in yogurt as food model. *Colloid and Interface Science Communications*. 2019; 30:100176. [DOI:10.1016/j.colcom.2019.100176]

This Page Intentionally Left Blank
