

شیوع عوامل خطرزای قلبی- عروقی در بیماران دیابتی کرمان و ارتباط آن با مصرف اپیوم

*دکتر نجمه رحیمی (MD)^۱- دکتر محمدحسین گذشتی (MD)^۲- دکتر حمید معرفتی (PhD)^۳- دکتر کاظم رهمنا (MD)^۴- دکتر ایرج آقابی (PhD)^۵- دکتر محمود موسیزاده (PhD)^۶

^{*}نویسنده مسئول: گروه داخلی بیمارستان افضلی پور کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

پست الکترونیک: h.marefati@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله: ۹۱/۰۸/۱۵ تاریخ پذیرش: ۹۲/۰۴/۱۲

چکیده

مقدمه: دیابت عامل خطر مهم ابتلای قلبی- عروقی معرفی شده و از طرفی باور عمومی جامعه در مورد تأثیر درمانی اپیوم بوجه بر بیماری‌های متابولیک زمینه شیوع مصرف آن را در جامعه فراهم کرده که نیاز به شناخت مشکلات پهدادشتی شایع در این مناطق را می‌طلبند.

هدف: تعیین میزان شیوع عوامل خطرزای قلبی- عروقی در بیماران دیابتی کرمان و نیز تأثیر اپیوم بر این عوامل به عنوان یک عادت اجتماعی در برخی افراد جامعه مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بر ۲۴۸ بیمار دیابتی کرمان (۲۰۳ زن (%۸۱) و ۴۵ مرد (%۱۹)) با سن ۴۷ ± ۹ سال) انجام شد. اطلاعات با مصاحبه، معاینه فیزیکی، آزمایش‌ها و اطلاعات موجود در پرونده بیماران در پرسشنامه مخصوص طرح ثبت شد و داده‌ها به کمک نرم‌افزار آماری SPSS آنالیز شد.

نتایج: متوسط بیماری ۴۸ ± ۸ سال بود. ۷/۲% بیماران به فشارخون مبتلا بودند و $۷/۵\%$ بیماران کنترل نامطلوب قند خون به صورت هموگلوبین گلیکوزیله بیش از ۷٪ داشتند. ۴/۷٪ بیماران کلسترول بالای ۲۰۰ ، $۶۹/۳\%$ تری‌گلیسرید بالای ۱۵۰ ، $۵/۷\%$ بیماران LDL-C بالای ۱۰۰ ، $۴/۳\%$ HDL پایین داشتند. شیوع مصرف اپیوم در بیماران $۴/۲۰\%$ بود. شیوع پایین تر هیبری کلسترولمی ($<۰/۰۵$) و در مقابل شیوع بالاتر فشارخون سیستولی ($>۰/۰۵$) در معتادان چشمگیر بود. در سایر لبیدها و کنترل قند خون اختلاف معنی‌داری بین دو گروه دیده نشد.

نتیجه گیری: عوامل خطرزای قلبی- عروقی در بیماران دیابتی شهر کرمان شیوع بالایی دارد و تدایر پیشگیرانه و بنیادین برای رویارویی با آن بایسته بنتظر می‌رسد. از سوی دیگر مصرف اپیوم اثر چشمگیری بر کنترل عوامل خطرزای قلبی- عروقی نشان نداد.

کلید واژه‌ها: اپیوم/ بیماری‌های قلب و عروق/ دیابت شیرین/ عوامل خطر

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیست و دوم شماره ۸۸، صفحات: ۵۷-۶۹

مقدمه

دیابت یک بیماری جدی، شایع و پرهزینه است که در حال حاضر شیوعی برابر $۷/۵\%$ در ایران دارد (۱). این بیماران در معرض ابتلای به عوارض دیابت از جمله نایباتی، نارسائی کلیه، زخم پا و نیز بیماری‌های رگ‌های بزرگ از دست کم می‌توان با این روش‌ها بروز آنها را به تعویق انداخت (۲).

پژوهش‌های پیشین بر بایستگی گردآوری یک راهنمای عملی کنترل مؤثر دیابت در ارائه خدمات هماهنگ به تمام بیماران اشاره داشته‌اند (۳) به طوری که در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰

دیابت یک بیماری جدی، شایع و پرهزینه است که در حال حاضر شیوعی برابر $۷/۵\%$ در ایران دارد (۱). این بیماران در معرض ابتلای به عوارض دیابت از جمله نایباتی، نارسائی کلیه، زخم پا و نیز بیماری‌های رگ‌های بزرگ از جمله درگیری قلبی، سکته‌معزی، عروق اندامها و پیامد آن ایسکمی و درد لنگشی اندام هستند. شواهد انبوه نشان می‌دهد که بسیاری از عوارض دیابت با افزایش میزان مراقبت، اصلاح

۱. گروه داخلی بیمارستان افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
۲. گروه داخلی بیمارستان افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
۳. مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
۴. پژوهش عمومی، پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
۵. مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان ایران- مرکز تحقیقات ترومای جاده‌ای گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
۶. مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

شده است (۱۸) بنابراین، هدف این مطالعه پاسخ به این پرسش است که شیوع عوامل خطرزای قلبی - عروقی در بیماران دیابتی منطقه کرمان با آب و هوای نیمه معتدل و خشک و مردمی از نژاد فارس با عادات‌های اجتماعی ویژه خود، چگونه است و آیا تفاوت محسوسی در نرخ‌های شیوع بین مصرف کنندگان اوپیوم و غیرمصرف‌کنندگان وجود دارد یا خیر؟

مواد و روش‌ها

این مطالعه به صورت مقطعی بر ۲۴۸ بیمار دیابت نوع ۲ مراجعه‌کننده به مرکز کنترل دیابت ثامن شهر کرمان در سال ۱۳۸۹-۹۰ انجام شد. این بیماران که طبق معیارهای سازمان بهداشت جهانی تشخیص دیابت (قندخون ناشتا ای بالای ۱۲۶ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر mg/dl) و قندخون بالای ۲۰۰ mg/dl دو ساعت بعد از دریافت ۷۵ گرم گلوكز و Hg A1C بالای ۶/۷٪ برای آنها مطرح شده بود در این مرکز پرونده فعال درمانی داشت و داده‌های حاصل از پرونده بیماران، مصاحبه حضوری، معاینه فیزیکی و نتایج آزمایشگاهی در پرسشنامه ویژه طرح وارد شد. در این پرسشنامه اطلاعات شخصی مثل سن، جنس، مدت ابتلای به دیابت و استعمال دخانیات، سابقه اعتیاد و اطلاعات آنتروپومتریکی قد، وزن و شاخص توده بدنی (BMI) ثبت شد. دامنه BMI بیش از ۲۵ به عنوان اضافه وزن و بیش از ۳۰ به عنوان چاقی در نظر گرفته شد. فشارخون بیماران پس از ۱۵ دقیقه استراحت در وضعیت نشسته اندازه‌گیری و پس از ۵ دقیقه تکرار شد. میانه دو سنجش به عنوان فشارخون سیستولی و دیاستولی ثبت شد. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای فشارخون در دیابت، فشارخون سیستولی بیش از ۱۳۰ و فشارخون دیاستولی بیش از ۸۰ یا پیشینه مصرف داروهای ضدفسارخون به عنوان بیماری فشارخون بالا در نظر گرفته شد.

افرادی که دست‌کم روزانه یک نخ سیگار در حداقل یک سال گذشته به‌شکل منظم می‌کشیدند به عنوان سیگاری در نظر گرفته شدند و مصرف روزانه بیش از یک گرم اوپیوم به‌طور مستمر در حداقل یک سال گذشته به‌طوری که بر اساس بازگوئی خودشان با مصرف نکردن دچار تظاهر وابستگی می‌شدند، به

راهنمای عملی در سراسر دنیا تدوین شده است (۴)، اما برای ارتقای سطح کاربردی و عملی بودن در جامعه نیاز به بومی‌سازی آن مناسب با کاستی‌های بهداشتی و عادت‌های اجتماعی رایج آن جامعه است (۶) که خود مستلزم شناخت این چالش‌ها برای برنامه‌ریزی در جهت رفع آنهاست.

در مطالعات انجام شده نرخ شیوع این بیماری، عوارض آن و حتی عوامل خطرزای ابتلای به این عوارض، پخش جغرافیایی و نژادی متفاوتی دارند (۵-۸) که در برخی مطالعات ریشه این تفاوت‌ها را در اختلاف اقلیمی، فرهنگی (نوع رژیم غذیه‌ای، میزان تحرک و عادات رایج در جامعه از جمله استعمال دخانیات) و اقتصادی دانسته‌اند (۷). لذا مطالعات جمعیت‌شناسی و بررسی شیوع عوامل خطرزای ابتلا در هر جامعه با تمرکز و توجه سیستم بهداشتی به مشکلات شایع، به بهبود کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض زودرس کمک می‌کند (۸). مطالعات متعددی در مناطق مختلف ایران و جهان به بررسی شیوع منطقه‌ای عوامل خطرزای قلبی - عروقی پرداخته‌اند. از جمله مطالعه بنکداران در مشهد (۱۳۸۹)، صفائی در اصفهان (۱۳۸۵) و المشکری در امارات متحده عربی (۲۰۱۰). در این مطالعات، نرخ شیوع متفاوتی در عوامل خطرزای قلبی - عروقی از جمله شیوع فشارخون بالا از ۳۴٪ تا ۷۰٪ و همچنین هیرکلسترولمی از ۲۶٪ تا ۸۳٪ در مناطق مختلف گزارش شده است (۹-۱۱). تا پیش از این مطالعه‌ای در کرمان با هدف بررسی شیوع عوامل خطرزای قلبی - عروقی در بیماران دیابتی انجام نشده بود. از یک سو بر پایه مطالعات پیشین مصرف اوپیوم یکی از مشکلات شایع اجتماعی خطه کرمان است. طبق گزارش ضیاء‌الدینی در سال ۸۴ شیوع کلی مصرف اوپیوم در این استان ۵/۳٪ و در جمعیت روستائی ۲۲/۵٪ بوده است (۱۲) که این شیوع بالا بویژه در بیماران تا حدودی ناشی از انگاشت نادرست آنها درباره اثر درمانی اوپیوم است (۱۳-۱۵).

عارض میکرو و ماکروواسکولار دیابت مانند نفوropاتی می‌تواند بر عملکرد قلب تأثیر بگذارد (۱۶-۱۷) و ارتباط بین افزایش هموگلوبین گلیکوزیله با بیماری‌های قلبی که با افزایش ۱٪ در هموگلوبین گلیکوزیله، ۱۱٪ افزایش در شاخص خطر بیماری‌های قلبی - عروقی دارد، گزارش

علائم غیراختصاصی تست EMG / NCV در خواست شد. در پایان محاسبه آماری با نرم افزار SPSS و برای نمایش متغیرهای توصیفی از درصد و برای آنالیز متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. مقایسه داده های آماری با آزمون رگرسیون لجستیک یک و چند متغیره و مقایسه میانگین ها با آزمون استاندارد t انجام و میزان p کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج

میانگین و انحراف معیار ویژگی های تن سنجی و آزمایشگاهی بیماران در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱- میانگین و انحراف معیار ویژگی های تن سنجی و آزمایشگاهی در بیماران دیابتی نوع دو

متغیر	میانگین(± انحراف استاندارد)
سن (سال)	۵۴/۱۳±۹/۹۴
جنس (زن به مرد)	۴۵ به ۲۰۳
طول مدت ابتلا به دیابت(سال)	۸/۱۷±۷/۰۹
شخص توده بدنی(kg/m2)	۲۷/۴۷±۴/۳۵
قدن خون ناشتا(mg/dl)	۱۸۰/۶۸±۶۹/۹۶
هموگلوبین گلیکوزیله(درصد)	۸/۵۴±۲/۰۵
کلسترول تام(mg/dl)	۱۹۶/۷۴±۳۹/۳۵
تری گلیسرید(mg/dl)	۲۰۰/۰۷±۱۱۱/۸۲
کلسترول(mg/dl) HDL	۴۹/۶۰±۱۱/۹۶
کلسترول(mg/dl) LDL	۱۰۸/۳۴±۳۳/۰۹
کراتینین	۰/۹۷±۰/۰۹
میزان فیلتراسیون گلومرولی(ml/min)	۸۰/۰۹±۲۴/۲۰

بر پایه نتایج، میانگین سن ۵۴/۱۳±۹/۹۴ سال، میانگین معادل ۲۷/۴۷±۴/۳۵ و متوسط طول دوره ابتلا به دیابت در بیماران ۸/۱۷±۷/۰۹ بوده است. میانگین هموگلوبین گلیکوزیله که به عنوان معیار کنترل درازمدت قندخون در نظر گرفته شده ۸/۵۴±۲/۰۵ بوده و ۰/۷۵/۶٪ بیماران هموگلوبین گلیکوزیله بیش از ۷٪ داشتند.

در جدول ۲ به بررسی شیوع عوامل خطرزای قلبی-عروقی پرداخته شده است و عوامل خطرزای قلبی خارج از کنترل به صورت درصد شیوع نشان داده شده است. طبق نتایج شیوع فشارخون در بیماران ۳۸/۷٪ است. از لحاظ عادات اجتماعی کشیدن سیگار شیوع بالایی در این بیماران نداشت (۰/۵/۳٪) در مقابل ۲۰/۴٪ بیماران معتاد به اوپیوم بودند که در این میان ۹۸٪

عنوان معتاد به اوپیوم در نظر گرفته شد. بررسی آزمایشگاهی بیماران شامل قندخون ناشتا (FBS)، قندخون دو ساعت بعد از غذا (2HPP)، لیپیدهای سرم شامل کلسترول تام (CHOL)، لیپوپروتئین با دانسیته پائین (LDL-C)، لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL-C)، تری گلیسرید (TG) و کراتین سرم (Cr) پس از ده تا دوازده ساعت ناشتا بیان انجام شد. هموگلوبین گلیکوزیله (Hg A1C) بیماران به روش DSS کراماتوگرافی جایگزینی یون با استفاده از دستگاه BS 2HPP بالای FBS (۱۳۰ mg/dl) و ۱۸۰ mg/dl به عنوان خارج از محدوده کنترل قند در نظر گرفته شد. LDL کلسترول با فرمول فریدوالد (در صورت TG زیر ۴۰۰) محاسبه شد. کلسترول تام بیش از ۱۵۰ mg/dl، تری گلیسرید بیش از ۲۰۰ mg/dl و HDL-C کمتر از ۱۰۰ mg/dl در مردان و کمتر از ۵۰ mg/dl در زنان به عنوان دیس لیپیدمی در نظر گرفته شد. میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) بر اساس محاسبه کلیرانس کراتین نین با فرمول کاکرافت-گالت سنجیده شد.

اندازه GFR بیش از ۹۰ میلی لیتر در دقیقه به ازای ۱/۷۳ متر مربع سطح بدن به عنوان کلیرانس کلیوی طبیعی، GFR زیر ۶۰ بر پایه راهنمای K/DOQI به عنوان نارسایی کلیه و GFR کمتر از ۱۵ به عنوان مرحله نهائی نارسایی کلیه (ESRD) در نظر گرفته شد.

بررسی از نظر عوارض ماکروواسکولر دیابت بر اساس پرسش در مورد سابقه مثبت بیماری قلبی به صورت بیماری کرونری ثابت شده با آنژیوگرافی، تست ورزش، اکوکاردیوگرافی، تغییر قدیمی در ECG یا سابقه حوادث عروق مغزی صورت گرفت. همچنین، در مورد لنگش اندام از بیمار پرسیده و نبض های دیستال بیمار چک شد. برای بررسی رتینوپاتی بیمار به چشم پزشک ارجاع و مورد معاینه ته چشم قرار گرفت و اختلال به صورت رتینوپاتی پرولیفراتیو یا غیرپرولیفراتیو یا طبیعی گزارش شد.

نوروپاتی با پرسش از نشانه ها و شدت در گیری پس از معاینه حسی و نمره بندی بررسی و برای تأیید تشخیص در بیماران با

در بررسی BMI گرچه میانگین $27/47 \pm 4/35$ بود، اما شیوع چاقی در آنها $28/7\%$ بود و $43/45\%$ اضافه وزن داشتند. در جدول ۳ اثر اوپیوم بر عوامل سرمی و فشارخون بیماران معتمد به اوپیوم و غیرمعتمد ارائه شده است.

طبق نتایج پس از حذف اثر مخدوش‌کننده سن، دوره ابتلاء به دیابت، فشارخون، سیگار و نمایه توده بدنی، اوپیوم به طور معنی‌داری باعث کاهش کلسترول تام شد ($p < 0.025$). هم‌چنین، شیوع اختلال LDL-C نیز در این گروه پایین‌تر بود، اگرچه این میزان معنی‌دار نبود. در این مطالعه Odd ratio در اختلال تری‌گلیسرید، HDL-C و اندکس‌های قندخون ((FBS))، قندخون دو ساعت بعد از غذا (2HPP)، (Hg A1C) با مصرف اوپیوم افزایش می‌یافتد اگرچه معنی‌دار نبود. هم‌چنین، ارتباط معنی‌داری بین مصرف اوپیوم و افزایش فشارخون سیستولی وجود داشت ($p < 0.048$) ولی ارتباط آن با فشارخون دیاستولی معنی‌دار نبود.

آنها مصرف استنشاقی و 2% مصرف خوارکی داشتند.

جدول ۲. میزان شیوع عوامل خطرزای قلبی-عروقی در بیماران مورد مطالعه

متغیر	تعداد (درصد)
جنس مرد	(۱۸/۱) ۴۵
زن	(۸۱/۹) ۲۰۳
فشارخون	(۳۸/۷) ۹۶
چاقی*	(۲۸/۷) ۷۱
صرف سیگار	(۵/۳۴) ۱۳
صرف اوپیوم	(۲۰/۴) ۵۱
سن بیشتر از ۶۰	(۲۹/۶) ۷۳
طول دوره بیماری بیش از ۱۰ سال	(۲۸/۳) ۷۰
کلسترول بیش از ۲۰۰	(۴۷/۶) ۱۱۸
تری‌گلیسرید بیش از ۱۵۰	(۱۹/۳) ۱۷۲
HDL*پایین	(۴۳/۷) ۱۰۸
LDLبیش از ۱۰۰	(۵۷/۸) ۱۴۳
سابقه فامیلی مشت دیابت	(۷۲/۸) ۱۶۸
هموگلوبین گلیکوزیله بیش از $\frac{1}{2}$	(۷۵/۶) ۱۸۷
GFRکمتر از ۶۰	(۲۱/۸) ۵۱
چاقی: BMI بیش از ۳۰	
HDL-C کمتر از ۴۰ در مردان و کمتر از ۵۰ در زنان	

جدول ۳. آنالیز چند متغیره ارتباط برخی عوامل سرمی و ویژگی‌های تن سنجی با مصرف اوپیوم در بیماران دیابت تیپ ۲

متغیر	آنالیز چند متغیره					
آنالیز یک متغیره	OR	CI 95%	P value	OR	CI 95%	P value
FBS>130	۰/۷۴۲	۰/۳۱۲-۱/۷۶۱	۰/۴۷۹	۴/۰۱	۰/۷۷۰-۲/۱۹۰	۰/۰۹۰
BS 2hpp >180	۱/۵۰	۰/۶۴۸-۳/۴۷۰	۰/۳۴۳	۱/۰۲	۰/۴۶۴-۵/۰۲۰	۰/۴۸۷
Hb A1C >7%	۱/۲۲	۰/۵۴۳-۲/۷۴۹	۰/۶۲۸	۲/۰۳	۰/۵۶۳-۷/۱۳۶	۰/۲۷۹
TG >150	۱/۰۲	۰/۷۲۳-۳/۲۱۷	۰/۲۶۸	۱/۹۰	۰/۶۱۴-۵/۸۹۰	۰/۰۶۵
total Cholesterol >200	۰/۷۳۶	۰/۳۸۲-۱/۴۱۹	۰/۳۶۰	۰/۱۶۶	۰/۰۳۰-۰/۸۰۱	۰/۰۲۵
LDL >100	۱/۰۴	۰/۵۲۰-۲/۰۹۳	۰/۹۰۵	۰/۰۴۲	۰/۱۷۵-۱/۶۷۹	۰/۲۸۸
Low HDL*	۱/۱۸۸	۰/۶۱۱-۲/۳۱۲	۰/۶۱۲	۱/۷۸	۰/۷۳۳-۴/۳۲۷	۰/۰۲۰
systolic BP >130	۱/۰۵	۰/۴۸۲-۲/۳۰۰	۰/۸۹۶	۲/۹۴	۱/۰۱۱-۸/۵۰۰	۰/۰۴۸
diastolic BP >80	۱/۶۷۹	۰/۵۶۱-۵/۰۰۷	۰/۳۵۰	۲/۰۹	۰/۷۲۱-۶/۰۹۰	۰/۱۷۴

HDL* کمتر از ۴۰ در مردان و کمتر از ۵۰ در زنان

بدون اختلاف معنی‌داری در مصرف‌کنندگان اوپیوم پائین‌تر بود و آنها میانگین فشارخون سیستولی بالاتری نیز داشتند.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه شیوع بالای عوامل خطرزای قلبی-عروقی را در مقایسه با دیگر مطالعات نشان داد ولی از نظر کنترل قندخون شرایط مطلوبی بدست نیامد. تنها $24/4\%$ بیماران در وضعیت دلخواه کنترل قند خون بودند که در مقایسه با مطالعات مشابه

در مقایسه متوسط عوامل سرمی مربوط به میزان قند و لیپید و نیز میزان GFR، میانگین سطح FBS، قندخون دو ساعت بعد از غذا (2HPP) و Hg A1C (2HPP) در مصرف‌کنندگان اوپیوم بالاتر بود اگرچه اختلاف آن معنی‌دار نبود. در ارتباط با پروفایل لیپید و مصرف اوپیوم، میانگین سطوح LDL-C و HDL-C و کلسترول تام در مصرف‌کنندگان اوپیوم پائین‌تر ولی در مورد تری‌گلیسرید بالاتر اما این اختلاف در حد معنی‌دار نبود. متوسط میزان GFR در مصرف‌کنندگان اوپیوم

توسط بنکداران و همکاران شیوع دیس لیپیدمی به صورت هیپرکلسترولمی ۹۵/۲٪، هیپرتری گلیسریدمی ۶۳/۱٪، HDL-C پایین ۸۶/۹٪ و LDL-C بالا را در ۸۳٪ بیماران گزارش کرده است (۹) که در هر دو مطالعه شیوعی بالاتر از مقادیر مطالعه ما بدست آمده است. در تفسیر این موضوع پس از حذف تاثیر عواملی همچون حجم کم نمونه در مطالعه آرگاوال نسبت به مطالعات داخلی می‌توان کنترل بهتر قند و لیپید در بیماران مطالعات خارجی را دخیل دانست. مثلاً در مطالعه امارات متحده عربی ۳۷/۶٪ بیماران در وضعیت مطلوب کنترل قندخون بودند که این میزان در مطالعه ما تنها ۲۴/۴٪ بود (۱۱). مطالعات متعددی در زمینه اثر اوپیوم بر عوامل خطرزای قلبی-عروقی انجام شده که نتایج متناقضی در پی داشت. در برخی مطالعات برای اوپیوم اثری حفاظتی در برابر حوادث قلبی-عروقی فرض شده است (۲۶) ولی در سایر مطالعات بر بیمارانی که مورد آنتیوگرافی قرار گرفته‌اند رد شده (۲۷) و حتی در مطالعاتی بر حیوانات به افزایش خطر تشکیل پلاک‌های آترومی در حضور اوپیوم اشاره شده است (۲۹). در بررسی اثر اوپیوم بر عوامل خطرزای قلبی-عروقی، برخی مطالعات نشان داده‌اند که اوپیوم می‌تواند باعث افزایش شانس دیس لیپیدمی در معتادان شود (۲۹ و ۳۰). حتی عسگری و همکاران به این نتیجه رسیدند که میزان سایر عوامل خطرزای قلبی-عروقی مثل Lpa، آپوB، عامل VII، فیرینوژن و CRP نیز در آنها بالاتر است (۳۰). اما در سایر مطالعات مثل مطالعه شیرانی و همکاران (۲۰۱۰) و همچنین فاطمی و همکاران (۲۰۰۸) این ارتباط رد شد (۲۸، ۳۱). حتی در برخی مطالعات به کاهش کلسترول تام در مصرف کنندگان اوپیوم اشاره شده است (۳۱).

در مورد اثر اوپیوم بر کنترل قندخون عسگری و همکاران در مطالعه‌ای بر ۳۶۰ بیمار دیابتی به این نتیجه رسیدند که بیماران دیابتی معتاد به اوپیوم Hg A1C بالاتری نسبت به سایرین دارند (۳۰) اما در مطالعه شیرانی به طور متناقضی سطح دیابت و فشارخون داشتند (۲۸). در مطالعه ما بین شیوع HgA1C پایین‌تر بوده است و شانس کمتری برای ابتلای به هیپرتری گلیسریدمی و سطوح غیرایده آل HDL-C و مصرف اوپیوم رابطه وجود داشت گرچه این ارتباط معنی‌دار نبود. از

بویژه گزارش‌های خارج از کشور رقم پائینی است (۱۱ و ۱۹). براساس آمار هفتمین گزارش کمیته کنترل فشارخون، ۵۰٪ بیماران دیابتی دچار پرفشاری خون هستند (۲۰) این میزان و همچنین برخی آمارهای گزارش شده در مطالعات داخلی بیش از شیوع در کرمان است. در شهر مشهد این شیوع ۵۱/۶٪ بدست آمده است (۲۱) و در مطالعه صفائی و همکاران این شیوع ۵۶/۲٪ در بیماران دیابتی شهر اصفهان بوده است (۲۱). در مطالعات خارجی مطالعه المثکری و همکاران در سال ۲۰۰۴ در امارات متحده عربی شیوع فشارخون ۳۴/۹٪ گزارش شده (۱۱) در حالی که این میزان در دیابتی‌های اردن ۷۰/۶٪ بوده اس (۲۲). می‌توان ریشه این تفاوت‌ها را در اختلاف نژاد، آداب و عادات‌های تغذیه‌ای، چگونگی فعالیت و عوامل فرهنگی و اقتصادی جست. با این حال کاهش فشارخون جهت جلوگیری از عوارض قلبی-عروقی در این بیماران ضروری است. در مطالعه UKPPS ۳۶ با کاهش ده میلی‌متر جیوه در فشارخون سیستولی ۱۹٪ از مرگ‌ومیر بیماران دیابتی ناشی از عوارض قلبی-عروقی کاسته شد (۲۳).

با توجه به دیس لیپیدمی آتروژنی همراه با وضعیت‌های مقاومت به انسولین (۲۴)، شیوع دیس لیپیدمی در این مطالعه فراتر از گزارش‌های مطالعات انجام شده در خارج از کشور بود، به عنوان مثال در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۴ در امارات متحده عربی شیوع هیپر کلسترولمی ۳۴/۴٪ و شیوع هیپر تری گلیسریدمی ۲۳/۹٪ گزارش شد (۱۱). همچنین، در مطالعه آرگاوال بر ۷۷ بیمار دیابتی شیوع هیپرکلسترولمی تنها ۲۹/۶٪ بود و ۳۸/۸۹٪ بیماران HDL-C پایین داشتند (۲۵) که در مقایسه با مقادیر بدست آمده در این مطالعه (شیوع هیپرکلسترولمی در کرمان ۴۷/۶٪، هیپرتری گلیسریدمی ۶۹/۳٪، HDL-C معادل ۵۷/۸٪ و LDL-C معادل ۴۳/۷٪) اختلال LDL-C به طور چشمگیر پایین‌تر است. در مقابل نرخ شیوع دیس لیپیدمی در کرمان از برخی مطالعات داخلی پایین‌تر است. به عنوان مثال در مطالعه‌ای در سال ۸۴ توسط صفائی و همکاران در اصفهان شیوع هیپرکلسترولمی در بیماران دیابتی این شهر ۷۷/۲٪، LDL-C بالا ۷۸/۶٪ و هیپرتری گلیسریدمی ۷۱/۶٪ بوده است (۱۰). همچنین مطالعه‌ای در سال ۸۸ در مشهد

توجه به تأثیر نامبرده برای اوپیوم بر میزان گلیسمی، لیپید پروفایل سرم و نیز فشارخون و تأثیر آن بر عملکرد کلیه، این نکته نیز قابل بررسی است، گرچه مطالعه مرتبطی یافت نشد. محدودیت‌هایی از قبیل دوزهای اوپیوم مورد استفاده، رژیم غذایی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی و میزان تحصیلات افراد نیز ممکن بود تا حدودی در نتایج مطالعه مداخله کند که با توجه به تعداد آزمودنی‌ها اثر همه این عوامل با دقت مهار شدنی نبوده می‌شد از آنها چشم‌پوشی کرد.

در مجموع می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که مشکلات بهداشتی هر منطقه متناسب با عادات، فرهنگ، نژاد و شرایط اقلیمی آن منطقه متفاوت است. بنابراین، مطالعات مقتضی برای شناخت چالش‌های بهداشتی هر منطقه به برنامه‌ریزی جامع‌تر و ارائه راهکارهای مناسب‌تر در جهت مقابله با آن کمک شایانی می‌کند. به نظر می‌رسد در شهر کرمان نفوropاتی دیابتی علاوه بر اختلال کنترل قند و لیپید از مشکلات شایع بیماران دیابتی باشد و توجه خاص پزشکان مرکز کنترل دیابت را در کشف و شروع درمان به هنگام می‌طلبد. از سویی با توجه به شیوع بالای مصرف اوپیوم در کرمان و ناشناخته بودن آثار آن بر عوامل خطرزای قلبی- عروقی، مطالعه فراگیرتر در این زمینه بایسته به نظر می‌رسد تا شاید با ارائه انگیزه کافی برای بیماران و آگاه ساختن آنها از تأثیر این ماده بر کنترل بیماری‌شان بتوان تصور بیشتر مردم در زمینه مفید بودن مصرف این ماده در کنترل دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی را اصلاح کرد (۱۵-۱۳).

نویسنده‌گان اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه تضاد منافعی ندارند.

سوی دیگر در مصرف کنندگان اوپیوم اختلال در میزان‌های کلسترول تام و LDL-C شیوع پائین‌تری داشت که بویژه در ارتباط با سطح کلسترول تام معنی‌دار بود. از سوی دیگر تمام اندکس‌های آن در مصرف کنندگان اوپیوم بالاتر بود که حاکی از نقش مختلط کننده اوپیوم بر کنترل قندخون است. هم‌چنان، شیوع فشارخون سیستولی و دیاستولی بالا در این افراد بیشتر بود که در مورد فشارخون سیستولی این ارتباط معنی‌دار بود. با این تفسیرها برپایه یافته‌های این مطالعه نمی‌توان اثر نگهدارنده در برابر حوادث قلبی- عروقی برای اوپیوم قائل شد. البته این نتیجه‌گیری خارج از توان این مطالعه مقطوعی است و مستلزم بررسی فراگیرتری است.

درجه‌های مختلف ابتلای کلیه در دیابت از میکروآلبومنوری تا نارسائی کلیه عوارض قلبی- عروقی را افزایش می‌دهد (۳۲). در این مطالعه ۲۱.۸٪ بیماران GFR کمتر از ۶۰ میلی‌لیتر در دقیقه داشتند. در سایر مطالعات داخلی شیوع بسیار پایین‌تری بدست آمده است به عنوان مثال در مطالعه بنکداران در مشهد ۸.۸٪ بیماران GFR کمتر از ۶۰ داشتند با اینکه حجم نمونه‌ها در آن مطالعه سه برابر حجم نمونه در این مطالعه بوده است (۹). از سوی دیگر میانگین مدت ابتلا و سن در نمونه‌های مطالعه ما بالاتر بوده که تا حدی توجیه‌کننده است. بنگاستاد (۲۰۰۲) نیز در مطالعه‌ای ارتباط معنی‌داری بین طول دوره ابتلای به دیابت با شدت نفوropاتی بدست آورد (۳۳)، اما باز هم این درصد بالای شیوع نکته‌ای درنگ کردنی است. در این مطالعه متوسط GFR در مصرف کنندگان اوپیوم پایین‌تر بود گرچه این اختلاف معنی‌دار نیست اما با

منابع

1. Larijani B, Zahedi F, Epidemiology of Diabet Mellitus in Iran. Iranian Journal of Diabet and Lipid Disorders 2002, 1:1-8.
- 2 Wisconsin Diabetes Advisory Group: Wisconsin Essential Diabetes Mellitus Care Guidelines, 2004:9-10
3. Eccles M, Mason J. How to Develop Cost Conscious Guidelines? Health Technol Assess 2001; 5(16):1-69.
4. Grol R. Development of Guidelines for General Practice Care. Br J Gen Pract. 1993; 43: 146-151.
5. Barnett E, Casper ML, Halverson JA, Elmes GA, Braham VE, Majed ZA, Bloom AS, Stanley S. Men and Heart Disease: An Atlas of Racial and Ethnic Disparities in Mortality. 1st Edition. Morgantown;WV, Office for Social Environment and Health Research, West Virginia University; 2001.
6. BRFSS: Behavioral Risk Factor Surveillance System. Centers for Disease Control, 2009, prevalence and trends data (<http://apps.nccd.cdc.gov/brfss/>)
7. Matthews KA, Sowers MF, Derby C, Stein E, Miracle-McMahill H, Crawford S. Ethnic Differences in Cardiovascular Risk Factor Burden Among Middle-Aged Women: Study of Women's Health Across the Nation Am Heart J 2005, 149:1066-2005.
8. Arthur L Klatsky, Mary Anne AmnstroCardiovascular Risk Factors among Asian

- Americans Living in Northern California. American Journal of Public Health 1991;81(1): 1423-8.
9. Bonackdaran SH, Taghavy M. Cardiovascular risk Factors in Patients with Type 2 Diabetes in Mashhad. Iranian Journal Of Endocrinology & Metabolism 2010; 12(1): 1-6. [Text in persion]
 10. Safaei H, Amini M, Behrooz J, Teimori A. Cardiovascular risk Factors in Patients with Newly Diagnosed type 2 Diabetes. Iranian Journal Of Endocrinology & Metabolism 2006; 29: 348 . [Text in persion]
 11. Fatma Al-Maskari, Mohammed El-Sadig and John N Norman. The Prevalence of Macrovascular Complications Among Diabetic Patients in the United Arab Emirates. Cardiovascular Diabetology 2007; 6:24.
 12. Ziaaddini H, Ziaadini MR. The household survey of Drug Abuse in Kerman. Iran. J Applied Sci 2005; 5(2):380-2.
 13. Zargham M, Khalilian AR, Tajic Jalayeri H, Khadivi Sohrabi S. Study of Frequency, Situation and Beliefs on Opium Consumtion in the Elderly. Proceedings of the Congress on Addiction; Challenges, Treatments; 2002; Zanjan, Iran. [Text in persion]
 14. Ghazvininejad H. Incorrect beliefs on drugs. Proceedings of the Congress on Addiction; challenges, Treatments; 2002; Zanjan, Iran. [Text in persion]
 15. Sadr S, Mahmoudinia SAR, Bakhtiari M. Friquency of Opium Use Among Diabetic Patients and Their Attitude. Iranian J of Psychiatry and Behavioral Sciences 2009; 3(2).
 16. Yokoyama H, Oishi M, Kawai K, Sone H. Reduced GFR and Microalbuminuria are Independently Associated with Prevalent Cardiovascular Disease in Type diabetes: JDDM study 16. Diabet Med 2008; 25: 1426-32.
 17. Klausen KP, Parving HH, Scharling H, Jensen JS. Microalbuminuria and Obesity: Impact on Cardiovascular Disease and Mortality. Clin Endocrinol (Oxf) 2009; 71: 405.
 18. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS). XI: Biochemical Risk Factors in type 2 Diabetic Patients at Diagnosis Compared with age- Matched Normal Subjects. Diabet Med 1994;11(6):434- 44.
 19. Esmaeelinab N, Afkhamzade A, Ebrahimi A. Study of Effective Factors in type 2 Diabets Control. J of Epidemiology 2010; 6(1):39 45.
 20. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr, et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003; 289: 2560-72.
 21. Safaei H, Amini M. Quality of Control of High Blood Pressure in type 2 Diabetic Patients. Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism 2007; 9(3): 235-41. [Text in persion]
 22. Al-Amer RM, Khader Y, Malas S, Abu-Yghi N, Ajlouni K. Prevalence of Risk Factors of Diabetic Retinopathy Among Jordanian Patients with Type 2 Diabet. Digital journal of Ophthalmology 2009; 11: 757-69.
 23. Adler AI, Stratton IM, Neil HA, Yudkin JS, Matthews DR, Cull CA, TurnerRC, Wright AD, Holman RR. Association of Systolic Blood Pressure with Macrovascular and Microvascular Complications of Type 2 Diabetes (UKPDS 36) prospective Observational Study. B M J 2000: 321; 412-9.
 24. Grundy SM, Mok HY, Zech L, Steinberg D, Berman M. Transport of Very lowD ensity Lipoprotein and Triiglycerides in Varing Degrees of Obesity and Hypertriglyceridema. J of clinical investigation 1979; 63: 1596-83.
 25. Agarwal AK, Singla S, Singla S, Singla R, Lal A, Wardhan H, et al. Prevalence of Coronary Risk Factors in Type 2 Diabetics Without Manifestations of Overtcoronary Heart Disease. J Assoc Physicians India 2009; 57: 135-42.
 26. Shults JE, Gross GJ. Opioids and Cardioprotection. Pharmacol Ther, 2001; 89:123-137.
 27. Masoumi M, Shahesmaeli A, Mirzazade A, Tavacoli M, Zia ali A. Opium Addiction and Severity of Coronary Artery Disease. JRMS 2010;15 (1).
 28. Shirani SH, Shakiba M, Soleimanzadeh M, Esfandbod M. Can Opium Abuse be a Risk Factor for Carotid Stenosis in Patient who are Candidates for Coronary Artery Bypass Grafting? Cardiology Journal 2010; 17(3): 254-258.
 29. Mohammady A, Darabi M, Nasery M, Saabet-Jahromi MJ, MalekpourAfshar R, Sheibani H. Effect of Opium Addiction on Lipid Profile and Athroschelerosis Formation in Hypecholesterolemic Rabbits. Exprimental and Toxicologic Pathology 2009; 61(2): 145-9.
 30. Asgary S, Sarrafzadegan N, Naderi GH, Rozbehani R. Effect of Opium Addiction on New and Traditional Cardiovascular risk Factors: do Duration of Addiction and Rout of Administration Matter? Lipids in health and disease 2008; 7(42).
 31. Fatemi SS, Hasanzadeh M, Arghami A, Sargolzaee MR. Lipid Profile Comparison Between Opium Addicts and Non-addicts. J of Tehran Heart Center Ctr 2008; 169-172.
 32. Robles NR, Mena C, Velasco J, Angulo E, Garrote T, Garcia Gallego F. [Microalbuminuria-related Cardiovascular Risk in Diabetic Patients and Hypertensive (non diabetic) population]. Med Clin (Barc) 2008; 130: 206-9. [Text in persion]
 33. Bangstad HJ, Østerby R, Rudberg S, Hartmann A, Brabrand K, Hanssen KF. Kidney Function and

Glomerulopathy Over 8 years in young Patients with
Type I (insulin-dependent) Diabetes Mellitus and

Microalbuminuria. Diabetologia 2002; 45(2):253-61.

Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in Diabetic Patients and its Relationship with Opium Consumption

*Rahimi N.(MD)¹- Gozashti M.H.(MD)²-Marefati H.(PhD)[†]- Rahnama K.(MD)[†]- Aghaei I.(PhD)³- Moosazadeh M.(PhD)[†]

***Corresponding Address:** Group of Internal Medicine, Afzalipour Hospital, Kerman, Iran.

Email Address: h.marefati@yahoo.com

Received: 05 Nov/2012 Accepted: 03 Jul/2013

Abstract

Introduction: Diabetes is known as a common risk factor for cardiovascular diseases. Another issue is people's belief about therapeutic effects of opium on the metabolic ill conditions. This conception has led to the rising prevalence of opium consumption, which demands further studies in different regions.

Objective: The aim of this study was determination of the prevalence of cardiovascular risk factors between diabetic patients in Kerman and study of opium's impression on these factors as a common social habit in this region.

Materials and Methods: In this cross-sectional study we enrolled 248 diabetic patients (203(81%) female and 45 (19%) male, age 54.37 ± 9.75 years old) in Kerman. A questionnaire completed after direct interview, physical examination and laboratory assessment. The data were analyzed by SPSS soft word.

Results: Mean duration of disease was 8.78 ± 7.48 years. Overall, 38.7% of the patients had arterial hypertension and 75.6% were in uncontrolled DM state, as glycosilated hemoglobin more than 7%. As revealed, 47.6% of the patients had cholesterol greater than 200, 69.3% triglyceride higher than 150, 57.8% with LDL-C greater than 100 and 43.7% were with low level of HDL-C. The prevalence of opium consumption in patients was 20.4%. The hypercholesterolemia was significantly less frequent in opium users; in contrast, high systolic blood pressure was more frequent among them. No significant difference was observed in the other type of serum lipids or statement of diabetes control.

Conclusion: Cardiovascular risk factors were frequent among patients in Kerman. Thus, preventive policies should be adopted to control it. On the other hand, opium consumption did not show any considerable effect on cardiovascular risk factors.

Conflict of interest: non declared

Key words: Cardio Vascular Diseases/ Diabetes Mellitus/ Opium/ Risk Factors

Journal of Guilani University of Medical Sciences, No: 88, Pages:49-57

Please cite this article as: Rahimi N, Gozashti MH, Marefati H, Rahnama K, Aghaei I, Moosazadeh M. Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in Diabetic Patients and its Relationship with Opium Consumption. J of Guilani University of Med Sci 2013; 2(88):49-57 [Text in Persian]

-
1. Internal Medicine Group, Kerman University of medical Sciences, Kerman, Iran
 2. Internal Medicine Group, Kerman University of medical Sciences, Kerman, Iran
 3. Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University. And; Physiology Research Center, Kerman University of medical Sciences, Kerman, Iran
 4. Guilani University of medical Sciences, Rasht, Iran
 5. Kerman neuroscience research center, Neuropharmacology Institute, Kerman University of medical Sciences, Kerman, Iran, Guilani road trauma research center, Guilani University of medical Sciences, Rasht, Iran
 6. Candidate in epidemiology, research center for modeling in Health, Institute of future studies in Health, Kerman University of medical Sciences, Kerman, Iran