

بررسی اپیدمیولوژیک صدمات ستون فقرات و نخاع در کاشان

دکتر اسماعیل فخاریان* - دکتر همایون تابش* - دکتر سیدعلی مسعود**

*استادیار جراحی مغز و اعصاب- گروه جراحی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

**استادیار بیماریهای مغز و اعصاب- گروه داخلی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

مقدمه: آسیب‌های حاد ستون فقرات و نخاع از علل شایع ناتوانی و مرگ در مصدومین به شمار می‌رود.

هدف: با توجه به هزینه‌های بسیار زیاد درمان و مراقبت آنان و کمود اطلاعات در کشور این مطالعه به منظور تعیین عوامل اپیدمیولوژیک آسیب‌های ستون فقرات و نخاع انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی بر روی کلیه مصدومین بسته شده در بیمارستان نقوی کاشان از آذر ماه سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ انجام شده و سن، جنس، عامل تروما، محل شکستگی، نوع شکستگی، وضعیت عصبی بیمار ثبت شده و بیماران تحت بررسی رادیولوژی و سی‌تن اسکن قرار گرفته و یافه‌ها مورد تحلیل آماری قرار گرفته است.

نتایج: دویست و بیست و پنج مورد تحت بررسی قرار گرفتند. سن بیماران 18 ± 6 تا ۸۲ سال و دامنه سن از ۶ تا ۳۹ سال بوده است. یکصد و هفتاد و هفت بیمار (۷۸/۵٪) مورد و ۴۸ بیمار (۲۱/۳٪) زن بودند (نسبت مرد به زن ۳/۷ به ۱). شایعترین سن آسیب طیف سنی ۵۰ تا ۶۰ سال بود (۶۰/۴٪). شکستگی نوع Burst شایعترین نوع ضایعه بوده و در ۱۰۲ مورد (۴۳٪) دیده شد و مهمترین عامل ایجاد آسیب سقوط از ارتفاع در ۱۲۸ نفر (۵۶/۹٪) بود. ۵۹ مورد (۱۷/۳٪) موارد ضایعه نخاعی دیده شد.

نتیجه گیری: میزان فراوانی شکستگی ستون فقرات و نیز آسیب‌های نخاعی مشابه با سایر منابع می‌باشد اما مکانیزم تروما و نیز نوع شکستگی که به ترتیب سقوط از ارتفاع و شکستگی Burst هستند، با اغلب منابع متفاوت است که بررسی اتیولوژیک آن را توصیه می‌نماییم.

کلید واژه‌ها: آسیب‌های ستون مهره‌ها / آسیب‌های طناب نخاعی / شکستگی‌های ستون مهره‌ها

مقدمه

منابع با آسیب‌های نخاعی مخلوط شده است (۱،۲،۳) و در کشور ما اطلاعات کمی در این زمینه وجود دارد. از آنجا که شکستگی ستون فقرات در مصدومین سوانح مختلف شایع است آگاهی از این میزان در بروز آن، در درمان آنان به خصوص وقتی که دچار اختلال هوشیاری هستند بسیار مؤثر است. این مطالعه به منظور تعیین اپیدمیولوژی شکستگی‌های ستون فقرات و آسیب‌های نخاعی از آذرماه ۱۳۷۴ لغایت آذرماه ۱۳۷۸ در مراجعین بیمارستان نقوی کاشان انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع توصیفی بوده و بر روی کلیه مصدومین

آسیب‌های حاد ستون فقرات و نخاع جزو شایعترین علل ارجاع مصدومین به بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها است. انتیتوی ملی تحقیقات ناتوانی و بازتوانی آمریکا برآورد کرده که هر سال ۱۴۰۰۰ آمریکایی دچار ضایعات نخاعی می‌شوند (۱). هزینه‌های مالی این آسیب‌های موحش به طور دقیق محاسبه نشده است اما گفته می‌شود که سالانه بالغ بر چهار میلیارد دلار برای مراقبت و جبران ناتوانی این بیماران صرف می‌شود (۲) به علاوه حدود ۳٪ موارد مرگ به دنبال تروما مستقیماً به علت آسیب نخاع گزارش شده است (۳).

اطلاعات درباره اپیدمیولوژی شکستگی ستون فقرات به همراه آسیب نخاعی ویا بدون آن متفاوت و حتی در برخی

مصدومین از این گروه سنی هستند. و آزمون‌های مربوط نشان داد که این اختلاف آماری معنی‌دار نیست.

جدول ۲: توزیع محل شکستگی بر حسب عامل ترومما

(بیمارستان نقوی کاشان - ۱۳۷۸ - ۱۳۷۴)


جمع	کمر(%)	پشت(%)	ناحیه گردن(%)	محل شکستگی
				عامل ترومما
۵۳	۱۶(۲۹/۶)	۲۳(۴۲/۵)	۱۴(۲۵/۹)	تصادفاتومبیل
۲۴	۱۴(۵۸/۳)	۶(۲۵)	۴(۱۶/۷)	تصادف موتور سیکلت
۱۲۷	۸۴(۶۶/۱)	۲۸(۲۲)	۱۵(۱۱/۷)	سقوط از ارتفاع
۱۹	۱۰(۵۲/۶)	۴(۲۱)	۵(۲۶/۳)	سایر موارد
*۲۲۵	۱۲۴	۶۱	۳۸(۱۶/۹)	جمع

* شکستگی ناحیه خاجی در دومورد دیده شد که یک مورد به علت تصادفاتومبیل و یک مورد نیز به علت سقوط از ارتفاع بوده است.

جدول ۳: توزیع شکستگی ستون فقرات بر حسب سطح ضایعه و به تفکیک ضایعه عصبی (بیمارستان نقوی کاشان - ۱۳۷۸ - ۱۳۷۴)

جمع	دارد		ندارد(%)	ضایعه نخاعی	محل شکستگی
	کامل(%)	ناقص(%)			
۳۸	۱۰(۲۶/۳)	۵(۱۳/۲)	۲۳(۶۰/۵)	گردن	
۶۱	۹(۱۴/۷)	---	۵۲(۸۵/۲)	پشت	
۱۲۴	۱۲(۹/۶)	۳(۲/۴)	۱۰۹(۸۷/۹)	کمر	
*۲۲۳	۳۱	۸	۱۸۴	جمع	

* دو مورد شکستگی ناحیه خاجی عالم عصبی نداشتند.



نمودار ۱: توزیع مبتلایان به شکستگی ستون فقرات بر حسب درصد ضایعه به تفکیک ضایعه عصبی (بیمارستان نقوی کاشان - ۷۸ - ۱۳۷۴)

بستری شده در بخش جراحی اعصاب انجام شده است. خصوصیات سن، جنس، عامل ترومما، محل ترومما و نوع ضایعه و وضعیت بالینی بیمار در زمان بستری ثبت و برای تشخیص همه مصدومین بستری توسط رادیولوژی ساده و نیز سی‌تی اسکن از ناحیه مشکوک به شکستگی تحت بررسی قرار گرفته‌اند. داده‌های فوق در فرم اطلاعات ثبت گردیده و با آمار توصیفی و تحلیلی مورد قضاوت قرار گرفت.

نتایج

طی مدت بررسی ۲۲۵ بیمار بستری شدند. سن اغلب بیماران 39 ± 18 سال و از حداقل ۶ تا حداقل ۸۲ سال بوده است. توزیع سنی بیماران بر حسب جنس در جدول ۵۰ یک آورده شده و نشان می‌دهد که در گروه سنی بالای ۵۰ سال شیوع در مردان $27/7\% / ۲۷/۷\%$ درصد و در زنان $41/7\% / ۴۱/۷\%$ بود و آزمون Chi Squire نشان داد که این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار نیست.

جدول ۱: توزیع شکستگی ستون فقرات بر حسب گروه‌های سنی به تفکیک جنس (بیمارستان نقوی کاشان - ۱۳۷۸ - ۱۳۷۴)

جنس	گروه‌های سنی	۵۰ سال (٪)	۲۰-۵۰ سال (٪)	۲۰ سال (٪)	کمتر از ۵۰ سال (٪)
مرد	مرد	۴۹(۲۷/۷)	۱۱۲(۶۳/۳)	۱۶(۹)	
زن	زن	۲۰(۴۱/۷)	۲۴(۵۰)	۴(۳/۸)	
جمع	جمع	۶۹(۳۰/۷)	۱۳۶(۶۰/۴)	۲۰(۸/۹)	

اغلب شکستگی‌ها در طیف سنی ۲۰ تا ۵۰ سال دیده می‌شود.

جدول ۲ توزیع محل شکستگی بر حسب عامل ترومما را نشان می‌دهد. آزمون Chi Squire نشان داد که این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار است ($P < 0.005$).

توزیع بیماران بر حسب گروه‌های سنی به تفکیک جنس در جدول شماره ۴ ارائه گردید که نشان می‌دهد در مردان بالای ۵۰ سال $25/8\% / ۲۵/۸\%$ و در زنان بالای ۵۰، $۱۲/۵\% / ۱۲/۵\%$ آسیب نخاعی دیده شد و $۶۴/۶\% / ۶۴/۶\%$ از مردان و $۸۷/۵\% / ۸۷/۵\%$ از زنان در گروه سنی $20-50$ سال و در مجموع حدود $70\% / ۷۰\%$ از زنان در گروه سنی $20-50$ سال دیده شدند.

در ۶۶ مورد ضایعات دیگری به همراه شکستگی ستون فقرات دیده شده (جدول ۶). این جدول نشان می‌دهد که وقتی عامل تروما تصادف با اتومبیل است آسیب به صورت در ۴۸/۷٪ موارد دیده می‌شود در سقوط از ارتفاع آسیب به صورت و جمجمه و انداخته طور مساوی ۴۲/۹٪ است و آزمون Chi Square نشان داد این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار است ($P<0.01$).

جدول ۶: توزیع شکستگی ستون فقرات بر حسب ضایعه همراه به تفکیک عامل ایجاد تروما (بیمارستان نقوی کاشان ۱۳۷۴-۷۸)

جمع	تنه (%)	اندامها (%)	صورت و جمجمه (%)	ضایعات همراه شکستگی ستون فقرات	
				عامل ایجاد تروما	تصادف با اتومبیل
۳۷	۱۰(۲۷)	۹(۲۴/۳)	۱۸(۴۸/۷)		
۲۱	۳(۱۴/۲)	۹(۴۲/۹)	۹(۴۲/۹)		سقوط از ارتفاع
*۵۸	۱۲	۱۸	۲۷		جمع

* مورد در تصادف با موتور سیکلت به تفکیک ۳ مورد آسیب به صورت و جمجمه و یک مورد به اندامها و نیز ۴ مصدوم با سایر موارد به تفکیک ۲ مورد آسیب صورت و جمجمه ۱۰ مورد اندامها و ۱ مورد تنه بوده است.

بحث و نتیجه‌گیری

در طی ۴ سال مطالعه ۲۲۵ مورد شکستگی ستون فقرات ثبت شده که با توجه به جمعیت ۳۵۰۰۰۰ نفری منطقه کاشان میزان بروز شکستگی ستون فقرات ۱۶ مورد به ازای یکصد هزار نفر در سال و نسبت مرد به زن ۳/۷ به ۱ است میزان بروز آسیب نخاعی نیز که ۳۹ مورد بود ۳ در یکصد هزار نفر و نسبت مرد به زن ۳/۹ به ۱ خواهد بود بنابراین ۱۷/۴٪ موارد شکستگی ستون فقرات با آسیب‌های نخاعی همراه هستند.

میزان بروز شکستگی ستون فقرات در منابع موجود به دقت مشخص نشده و در برخی موارد با آسیب‌های نخاعی مشتبه شده و ۵ تا ۲ در یکصد هزار نفر در سال گزارش شده است و نسبت مرد به زن ۳ تا ۵ به ۱ دارد (۴، ۵، ۶، ۷ و ۸) در مطالعه‌ای بر روی ۱۵۰۰ مصدوم دچار سانحه ۲۶۲ مورد (۱۷/۵٪) دچار ضایعه ستون فقرات

جدول ۴: توزیع آسیب نخاعی بر حسب جنس به تفکیک سن،

بیمارستان نقوی کاشان ۱۳۷۴-۷۸


سن	جنس	سن	کمتر از سال (%)	۲۰-۵۰ سال (%)	۵۰ سال (%)	جمع
مرد		۳۱	۸(۲۵/۸)	۲۰(۶۴/۶)	۳(۹/۶)	
زن		۸	۱(۱۲/۵)	۷(۸۷/۵)	---	
جمع		۳۹	۹	۲۷	۳	

۴/۲٪ بیماران شکستگی Burst داشتند و در ۵/۶٪ موارد سقوط از ارتفاع عامل ایجاد آسیب بود. در سقوط از ارتفاع ۴۲/۲٪ شکستگی Wedge و در سایر موارد ۱۲/۵٪ این شکستگی را داشتند و بررسی Chi Square نشان داد که ارتباط بین مکانیزم تروما و نوع شکستگی به لحاظ آماری معنی دار است ($P<0.05$).

جدول ۵: توزیع نوع شکستگی ستون فقرات به تفکیک عامل ایجاد تروما (بیمارستان نقوی کاشان ۱۳۷۴-۷۸)

نوع شکستگی	Burst(%)	Shkestegi	Saiyir Mowared (%)	جمع
Burst	۲۸(۴۳/۸)	۱۸(۲۸/۱)	۱۸(۲۸/۱)	۶۴
Wedge	۱۳(۵۴/۲)	۸(۳۳/۳)	۳(۱۲/۵)	۲۴
跌倒	۵۳(۳۹/۰۸)	۵۶(۴۲/۲)	۲۴(۱۸)	۱۲۳
跌倒	۸(۵۰)	۲(۱۲/۰)	۶(۳۷/۵)	۱۶
跌倒	۱۰۲	۸۴	۵۱	*۲۳۷
جمع				

* برخی بیماران در بیش از یک سطح شکستگی داشتند.



نمودار ۲: توزیع مبتلایان شکستگی ستون فقرات بر حسب درصد ضایعه به تفکیک عامل ایجاد تروما (بیمارستان نقوی کاشان ۱۳۷۴-۷۸)

(۱۴۹). این موضوع در مطالعات دیگری نیز نشان داده شده است (۱۱۰ و ۱۱۲).

این تفاوت را می‌توان به عوامل اقتصادی به اجتماعی نسبت داد و افزایش تعداد وسائل نقلیه و نیز صنعتی شدن جامعه ممکن است سبب کاهش این اختلاف شود.

در این بررسی شایعترین محل‌های شکستگی به ترتیب ناحیه کمر ۱۲۴ مورد (۵۵٪)، پشت ۶۱ مورد (۲۷٪) و گردن ۳۸ مورد (۱۶٪) بوده است.

در یک مطالعه در مورد موتور سواران ستون فقرات پشتی شایعترین محل با ۵۴٪، گردن با ۲۷٪ و کمر با ۲۹٪ بوده (۱۶). در مطالعه‌ای دیگر نیز شایعترین محل آسیب در موتور سواران ناحیه پشت (۵۴٪) و در مسافرین اتومبیل ناحیه گردن (۵۰٪) بود.

اگر چه درنگاه اول این تفاوت چشمگیر به نظر می‌رسد اما همانگونه که در بالا اشاره شد شکستگی‌های گردن و پشت در این بررسی نیز بیشتر در حوادث ترافیکی دیده می‌شود و علت زیاد بودن موارد شکستگی ناحیه کمر فراوانی عامل ایجاد آن است که به آن خواهیم پرداخت.

ضایعه نخاعی در ناحیه گردن، پشت و کمر به ترتیب ۳۹٪، ۱۵٪ و ۱۲٪ شیوع دارد که گرچه با سایر منابع متفاوت است اما ترتیب شیوع مانند آنهاست (۱۵، ۱۴، ۵ و ۲).

از بیماران این مطالعه ۱۰۲ مورد (۴۳٪) شکستگی Burst و ۸۴ مورد (۴۳٪) شکستگی wedge و ۵۱ مورد (۲۱٪) fracture dislocation، tear drop داشتند در سایر منابع شکستگی wedge شایعترین نوع بوده است (۹ و ۱۸). این تفاوت را می‌توان به چند عامل مرتبط دانست:

برخی مصدومین با شدت آسیب کمتر که ممکن است دچار شکستگی wedge باشند به بیمارستان مراجعه نکرده بلکه به مراکز درمان سربیایی مراجعه و درمان شده باشند و حتی ممکن است تشخیص داده نشده باشند.

سقوط از ارتفاع که مهمترین مکانیزم شکستگی Burst است فراوانترین عامل ایجاد شکستگی در این مطالعه بوده

بودند (۱۰) در مطالعه‌ای دیگر از ۷۸۴ مصدوم دچار ضایعه نخاعی بیش از نیمی از موارد دارای شکستگی یا در رفتگی ستون فقرات بودند (۱۱). در مطالعه‌ای دیگر بر روی ۴۹۹ مصدوم دچار ضایعه نخاع؛ ۷۷٪ موارد دارای شکستگی و یا در رفتگی ستون مهره‌ها بودند (۱۲).

در یک بررسی چهار ساله در تایوان از ۶۴۱۰ مورد شکستگی ستون فقرات ۱۵۸۰ مورد دارای ضایعه نخاعی بودند. در این مطالعه بروز ضایعه نخاعی ۱۸٪ در یک میلیون جمعیت گزارش شده است (۸).

بررسی دیگری بروز ضایعه نخاعی همراه شکستگی ستون فقرات را ۱۴٪ ذکر کرده است (۱۳).

در مورد ضایعات نخاعی یافته‌های این مطالعه با سایر مطالعات شباهت دارد. اختلاف مشاهده شده در مورد شکستگی ستون فقرات احتمالاً ناشی از طراحی مطالعه و توجه بیشتر به ضایعات نخاعی در مطالعات مختلف است. بیش از ۶۰٪ بیماران شکستگی ستون فقرات و ضایعات نخاعی تا ۲۰ تا ۵۰ سال دارند. در ایالات متحده ۸۰٪ آسیبها در سنین ۱۶ تا ۴۵ سال گزارش شده است (۱۴). در دو مطالعه دیگر سن شایع بین ۱۳ تا ۳۴ سال (۱۱ و ۱۲) و در مطالعه‌ای متوسط سن ۴۷۱ سال بوده است. (۸).

نکته قابل توجه در تمامی موارد آن است که این آسیب‌ها در سنین فعال و جوانی شیوع بیشتری دارد و تفاوت‌های دامنه سنی ممکن است ناشی از تفاوت در شیوه مطالعه، عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و منطقه‌ایی باشد.

در این مطالعه ۵۲٪ (۱۲۸ نفر) از موارد به علت سقوط از ارتفاع و ۳۵٪ (۷۸ نفر) در اثر حوادث ترافیکی دچار آسیب شده‌اند. شکستگی‌های گردن و پشت بیشتر در سوانح ترافیکی و شکستگی‌های کمر توسط سقوط ایجاد شده‌اند در یک مطالعه در سنگاپور شایعترین علت آسیب‌های ستون فقرات، سقوط (۵۰٪) و حوادث ترافیکی (۳۷٪) ذکر شده است (۱۵). در ایالت متحده سوانح ترافیکی شایعترین عامل آسیب ستون فقرات است

یافته ها در تصادفات اتومبیل مشابه هستند، اما در مورد موتور سواران از چهار مصدوم این بررسی ۳ مورد آسیب به جمجمه و صورت داشتند که این تفاوت ممکن است به علت عدم رواج استفاده از کلاه ایمنی در این گروه باشد.

در نهایت اگر چه برخی یافته های این مطالعه با سایر مطالعات مطابقت دارند اما برخی دیگر از تفاوت ها از جمله عامل ایجاد ترومما و نیز نوع شکستگی به همراه جوان بودن جمعیت جامعه ما بر مخاطرات و هزینه های آسیب های ستون فقرات و نخاع می افزاید. به همین علت پیشنهاد می کنیم :

- مطالعه ای ملی و با مشارکت مراکز متعدد در این زمینه صورت گیرد
- مطالعه ای مقایسه ای به منظور تبیین دقیق تر برای میزان و شدت شکستگی مهره در مقایسه با سی تی اسکن صورت گیرد و نیاز به انجام سی تی اسکن در کلیه موارد شکستگی مورد بررسی قرار گیرد.
- ضرورت طراحی قوانین و مقررات دقیق تر برای محیط های کار و اماکن مسکونی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از وقوع این حوادث پیشگیری کرد.

است؛ اگر چه در مصدومین سقوط از ارتفاع شکستگی wedge قدری بیشتر دیده می شود.

این موضوع می تواند بیانگر وجود عوامل پرخطر در جامعه ما باشد. به عبارت دیگر ممکن است مصدومین ما صدمات شدیدتری را تجربه کرده باشند.

کلیه بیماران این مطالعه پس از رادیوگرافی ساده تحت بررسی سی تی اسکن قرار گرفته اند که دقت بیشتری در نشان دادن میزان شکستگی دارد و بنابراین علی رغم نوع یافته در رادیوگرافی ساده به عنوان شکستگی Burst طبقه بندی شده اند.

در این مطالعه بیشترین آسیب همراه آسیب به صورت و جمجمه $48/7\%$ است و بیشترین عامل این آسیب تصادف با اتومبیل ($56/11\%$) است. در سقوط از ارتفاع آسیب به صورت و جمجمه و نیز اندام ها به یک نسبت ($42/9\%$) دیده شد. در یکی از منابع آسیب به سر و اختلال هوشیاری به عنوان شایعترین ضایعه همراه در 61% تصادفات و 34% موارد سقوط دیده شده و شکستگی های اندام ها رتبه بعدی را داشتند (14%). در مطالعه ای دیگر در موتورسواران شکستگی اندام های فوقانی و تحتانی مهمترین آسیب های همراه بودند (16%).

منابع

1. Leventhal MR, Fractures, Dislocations, and Fractures - Dislocations of Spine In: Terry Canale S (ed). Campbell 's Operative Orthopedics. 10th ed. New York: Mosby, 2003:1594 – 1690.
2. Wogner FC. In Juries to the Cervical Spine and Spin Cord. In: Youmans JR (ed). Neurological Surgery. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1990: 2348 – 91.
3. Eichler ME, Vollmer DG. Cervical Spine Trauma. In Youmans JR (ed). Neurological Surgery. 3 rd ed. Philadelphia: WB Saunders 1990: 2378-91.
4. Kondakov EN, Simonova IA , Poliakov IV. The Epidemiology of Injuries to the Spine and Spinal Cord in Saint Petersbur. Furnal Voprosy Neirkhirurgii Imeni N-N Burdenko, Discussion 2002: 1(2): 52-3.
5. Dunn ME, Seljeskog DL. Management of Thoracic Spine Fractures. In: Youmans JR (ed). Neurological Surgery. 3 rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1990: 2403 – 10.
6. Bergman TA, Seljeskog DL. Management of Thoracolumbar and Lumbar Spine Injuries. In: Youmans JR (ed). Neurological Surgery. 3 rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1990: 2411-23.
7. Shaffrey CI , Shaffrey ME , Whitehill R , Nochels RP. Surgical Treatment of Thoracolumbar Fractures . Neurosurgery Clinics of North America 1997: 8(4): 519 -540.
8. Chen HY, Chiu WT, Chen SS, et al .A Nationwide Epidemiological Study of Spinal Cord Injuries in Taiwan from July 1992 to June 1996 . Neurol Res 1997: 19(6): 617 – 22.
9. Nockels RP, Mac Cormack B. Diagnosis and Management of Thoracolumbar and Lumbar Spine

- Injuries. In: Youmans J R (ed). Neurological Surgery, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1996: 2079-96.
10. Akmol M, Trivedi R, Sutcliffe J. Functional Outcome in Trauma patients with Spinal Injury. *Spine* 2003; 28(2): 105 – 6.
11. Bracken MB, Shepard Mt Collins WF, et al. A Randomized, Controlled Trial of Methylprednisolone or Naloxone in the Treatment of Acute Spinal Cord Injury. *N Engl J Med* 1990; 322: 1405 – 11.
12. Bracken MB, Shepard MT , Holford TR, et al . Treatment of Acute Spinal Cord Injury. *JAMA* 1997; 277 : 1597-1604.
13. Riggins RS , Kraus JF . The Risk of Neurologic Damage With Fractures of the Vertebrae . *J Trauma* 1977; 17(2): 126 - 33 .
14. Tsementzis SA . Epidemiological characteristics of Neurological Diseases. In: Tsementzis (ed). Differential Diagnosis in Neurology and Neurosurgery. New York: Thieme, 2000: 1-6.
15. Yen NL, Chua K, Chan W. Spinal Injury Rehabilitation in Singapore. *Int J Rehabilit Res* 1998; 21(14) : 375 – 87.
16. Robertson A, Giannoudis PV, Branfoot T, et al. Spinal Injuries in Motorcycle Crashes: Patterns and Outcome. *J Trauma* 2002; 53(1): 5 - 8.
17. Robertson A, Branfoot T, Barlow IF , Giannoudis P. Spinal Injury Patterns Resulting from Car and Motorcycle Accidents. *Spine* 2002; 27(24): 25 –30.
18. Vollmer DG, Gegg C. Classification and Acute Management of Thoracolumbar Fractures. *Neurosurgery Clinics of North America* 1997; 8(4): 499-507.

An Epidemiologic Study on Spinal Injuries in Kashan

Fakharian E., Tabesh H., Masoud SA.

Abstract

Introduction: Spinal canal and spinal cord injuries are one of the most common causes of death and disabilities in trauma victims. Since treatment and long term care for these patients causes a major economic burden on the society and there isn't adequate data in this regard in our country.

Objective: This study was carried out in Naghavi University Hospital, Kashan, from December 1995 to December 1999 to determine the incidence of these injuries.

Materials and Methods: This descriptive study included all admitted trauma victims. Age, sex, cause of trauma, site of fracture, kind of fracture, and neurological status of the patients were recorded. All of patients were studied by x-ray and CT scan. Findings were statistically analyzed.

Results: During the study period, 225 cases were included. Age of the patients was 39 ± 18 and the age range was from 6 to 82. 177(78.5%) were males and 48 (21.5 %) females (male to female ratio was 3.7 to 1). The most common age range in terms of injuries was in age group of 20-50(60.4%). Burst fracture was the most common type of injury and was seen in 102 cases (43 %). The most common cause of injury was falling down which was seen in 128 cases (56.9 %) In 39 cases (17.3 %), spinal cord injury was seen.

Conclusion: Incidences of spinal fractures and spinal cord injury are similar to those reported in the literature, but the mechanism of trauma and kind of fracture, falling down and burst fracture respectively, are different from most of references and this needs further etiologic study.

Key words: Spinal Cord Injuries/ Spinal Fractures/ spinal Injuries