

بررسی نظرات پرسنل اتاق عمل در مورد اقدامات پیشگیری کننده از

واریس عروق اندام تحتانی

شاپیله نصیری مقدم* - سکینه سبزواری*

*مریم پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی رازی- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

مقدمه: وادیس وریدی از جمله مشکلاتی است که در بعضی افراد که به مقتضای شغلشان مجبورند مدت طولانی سرفا با بایستندیده می‌شود. با توجه به اینکه پرسنل پرستاری شاغل در اتاق‌های عمل مجبورند ساعتها بمدت طولانی بصورت ایستاده و قابت کار کنند، قرار گرفتن در وضعیت ایستاده و طولانی آنها را در معرض ابتلا به واریس عروق اندام تحتانی قرار خواهدداد.

هدف: این پژوهش یک بررسی توصیفی است که به منظور تعیین نظرات پرسنل پرستاری شاغل در اتاق عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد اقدامات پیشگیری کننده از واریس عروق اندام تحتانی صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه حاوی ۲۳ سؤال بود که در دو بخش تنظیم گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های مرکزی، پراکنده‌گی و آزمونهای آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و T استفاده شد.

نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثر پاسخ‌ها در مورد اقدامات فردی پیشگیری کننده از واریس وریدی اندامهای تحتانی و همچنین در زمینه اقدامات سازمانی پیشگیری کننده در این زمینه به گزینه به ترتیب $48/3\%$ و 59% بوده است. در بررسی ارتباط بین نظرات پرسنل پرستاری در مورد اقدامات پیشگیری کننده و ویژگی‌های فردی آزمون T بین نمره ۵ و جنس مذکور ($16/8 \pm 5/6$) و مؤنث ($12/6 \pm 5/5$) تفاوت معنی‌داری را نشان داد ($P < 0.008$). در سایر ویژگی‌های فردی تفاوت‌آماری مشاهده نشد. در مقایسه میانگین نمرات نظرات پرسنل پرستاری در مورد اقدامات سازمانی پیشگیری کننده و ویژگی‌های فردی بر حسب آزمون ANOVA بین مدارک تحصیلی و سمت بترتیب ($P < 0.001$) و ($P < 0.005$) تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده شد. یعنی افراد با سمت بالاتر، با تحصیلات بیشتر نمره پیشتری کسب نمودند و در مورد سایر ویژگی‌های فردی تفاوت آماری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله لزوم افزایش سطح آگاهی پرسنل در مورد پیشگیری از واریس وریدی و همچنین فراهم کردن امکانات کافی در این زمینه احساس می‌شود.

کلید واژه‌ها: پرستاری اتاق عمل / پرستاران بالینی / پرستاری بیمارستان / سیاهه‌گهای واریسی

مقدمه

شدن وریدها و جاذبه زمین تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بیماریهای وریدی اندامهای تحتانی از شیع نسبتاً بالایی برخوردار بوده و وریدهای واریسی در حدود ۱۵٪ از بزرگسالان دیده می‌شود (۹). بعلاوه ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز ممکن است واریس‌های کوچک و بدون علامت در اندام

عملکرد اولیه وریدهای سیستمیک فراهم کردن بازگشت خون به قلب راست می‌باشد. هر چند این وریدها صرفاً به عنوان یک مجرای غیرفعال در برابر جریان خون عمل نمی‌کنند اما حرکت خون توسط عواملی نظیر فشار دینامیکی پایین درون سیستم در مقایسه با شریان‌ها، قابلیت کلaps

پیشگیری کننده از واریس استفاده می کردند. همچنین نتایج نشان داد که ۲/۳ درصد واحدهای مورد پژوهش به واریس عروق اندام تحتانی مبتلا بودند (۳). با توجه به مطالب ذکر شده از آنجا که پرسنل اتاق عمل به مدت طولانی سریا هستند و در معرض خطر ابتلاء به واریس قرار دارند، لذا این پژوهش جهت بررسی نظرات آنها در مورد اقدامات پیشگیری کننده از واریس عروق اندام تحتانی انجام شد.

مواد و روش ها

این پژوهش یک تحقیق توصیفی تحلیلی است که بمنظور تعیین نظرات پرسنل پرستاری شاغل در اتاق عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد اقدامات پیشگیری کننده از واریس عروق اندام تحتانی انجام شد. حجم نمونه در این تحقیق کلیه پرسنل پرستاری شاغل در اتفاقهای عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان بودند که تعداد آنها جمعاً ۱۲۰ نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که در دو بخش تنظیم گردید. بخش اول شامل ویژگیهای فردی [سن، جنس، سمت، مدرک تحصیلی، سابقه کار در محیط‌های بهداشتی درمانی، سابقه کار در اتاق عمل، نوع شیفت کاری، وضعیت‌های قرار گرفتن بدن (ایستاده، نشسته، در حال راه رفتن) سابقه تعداد حاملگی در جنس مؤنث، سابقه بیماری (قلی، واریس عروق اندام تحتانی، بیماری دیابت، فشار خون) استفاده از قرص‌های ضد بارداری در صورت مؤنث بودن، استفاده از کلاسهای آموزشی] و بخش دوم حاوی ۲۳ سؤال بود که ۱۴ سؤال آن مربوط به نظرات پرسنل پرستاری اتفاقهای عمل در مورد اقدامات پیشگیری کننده از واریس عروق اندام تحتانی بود و بقیه سؤالات به نظرات

تحتانی داشته باشند (۱۰). واریس وریدی اغلب به علت ایجاد فشار بیش از حد بر روی وریدها بروز کرده و همچنین ممکن است بدنبال بالا رفتن مداوم فشار وریدی به علت بیماری‌های مزمن همچون اختلالات قلبی و سیروز روی دهد (۱۲). در تحقیقات وریدی ادینبرگ توسط راکلی (Ruckley) و گری (Gerry)، نتایج مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده که ۱۵ درصد مردان و ۲۵ درصد زنان واریس قابل رؤیت دارند (۱۴). همچنین برونر (Brunner) می‌نویسد: واریس اغلب در قسمت‌های تحتانی بدن رخ می‌دهدو از هر پنج نفر یک نفر در سطح جهان به واریس مبتلاست (۷). افراد شاغل در بیمارستانها همواره در تماس با عوامل بیماری‌زای گوناگون می‌باشند و با در نظر گرفتن خدمات ارزندهای که برای بیماران انجام می‌دهند و با توجه به سرمایه‌گذاری‌های زیادی که جهت تعلیم و تربیت اینگونه افراد به عمل می‌آید انجام مراقبت‌های بهداشتی به منظور حفظ سلامت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است (۵). روش کار و موقعیت شغلی و محیط ممکن است باعث بیماری و صدمات ناشی از کار گردد (۱۱). افرادی که به مقتضای شغلشان مجبورند مدت طولانی سریا باشند مانند پرستاران، در معرض ابتلاء به واریس وریدی اندام تحتانی می‌باشند (۱۰). در این رابطه نتایج پژوهش سراجی (۱۳۷۲) تحت عنوان بررسی نظرات پرسنل پرستاری شاغل اتاق عمل در مورد اقدامات پیشگیری کننده از واریس ۴/۵۲ درصد پرستاران از اقدامات پیشگیری کننده بصورت همیشه و ۱۵/۲۵ درصد بصورت اغلب و ۱۸/۵ درصد بندرت استفاده می‌کردند. در مورد سرپرستاران ۶/۰۸ درصد بصورت همیشه، ۹/۳۷ درصد اغلب و ۱۴/۵۵ درصد بندرت از اقدامات

از واریس عروق اندام تحتانی از آزمونهای T و آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد.

نتایج

بر اساس نتایج حاصله بیشترین فراوانی واحدهای پژوهش مربوط به گروه سنی ۳۴-۴۲ سال (٪۲۶/۶)، مؤنث (٪۴۲/۲)، دارای مدرک دیپلم (٪۴۲/۵) و بهیار (٪۴۴/۲) بود. پرسنل پرستاری بین ۸-۱۴ سال سابقه کار در محیطهای بهداشتی درمانی داشتند و ٪۳۸/۲ نیز دارای سابقه کار بین ۱-۷ سال در اتاق عمل بودند. اکثر پرسنل (٪۶۵/۸) بصورت شیفت در گردش کار می‌کردند و وضعیت قرار گرفتن بدن هیچ یک از آنها در طول شیفت کاری درست نبود. اکثر پرسنل مؤنث (٪۴۶/۱)، سابقه بین ۲-۱ بار حاملگی داشتند و قرص ضد بارداری نیز مصرف نمی‌کردند (٪۸۰/۹). هیچ کدام نیز دوره آموزشی جهت پیشگیری از واریس نگذرانده‌اند. طبق نتایج بدست آمده اکثر واحدهای پژوهش سابقه‌بیماری قلبی، دیابت، فشار خون بالای شریانی و واریس نداشتند.

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در رابطه با نظرات پرسنل در مورد اقدامات فردی پیشگیری کننده از واریس عروق اندامهای تحتانی بیشترین میانگین نمرات را عبارات «آیا از روی هم انداختن پاها بمدت طولانی بیشتر از ۲ ساعت در طول یک شیفت کاری خودداری می‌کنید» (X=۲/۲۶) و «آیا در هنگام کار پاها را تغییر پوزیشن می‌دهید» (X=۱/۷۶)، بخود اختصاص دادند. اکثر پاسخهای پرسنل در این بخش از پرسشنامه بصورت هرگز (٪۴۸/۳) بود. در مورد نظرات پرسنل در زمینه اقدامات سازمانی پیشگیری کننده از واریس عروق اندامهای تحتانی، بیشترین میانگین نمرات مربوط

پرستاران در مورد اقدامات پیشگیری کننده که توسط سرپرستاران اتاق عمل بیمارستانه‌اعمال می‌شود مربوط می‌گردد که با استفاده از منابع علمی معتبر بر اساس مقیاس چهار درجه‌ای لیکرت تنظیم گردید. جهت تعیین روایی از شاخص روایی محتوا استفاده شد. بدین صورت که پرسشنامه در اختیار ده نفر از صاحب‌نظران قرارداده شد که مناسب هر یک از عبارات آن را با اهداف مورد نظر تحقیق بر روی یک مقیاس ۴ درجه‌ای شامل مناسب کاملاً مناسب - نامناسب - کاملاً نامناسب مشخص نمایند که بر این اساس برای هریک از عبارات پرسشنامه ضریب ۰/۸ تا ۰/۹ تا ۰/۸۶ بود و جهت تعیین پایایی ابزار، از ضریب آلفا کرونباخ‌بمنظور تعیین ثبات درونی استفاده شد که پس از توزیع پرسشنامه بین ۲۰ تن از پرسنل پرستاری شاغل در اتفاقهای عمل و جمع‌آوری پاسخ‌ها ضریب ۰/۷۳ بدست آمد. پس از کسب پایایی و روایی، پرسشنامه مذکور بین واحدهای پژوهش توزیع شد و پس از تکمیل پرسشنامه توسط کلیه افراد جامعه پژوهش پرسشنامه بمدت زمان تعیین شده در طرح (۲ ماه) جمع‌آوری شد. جهت استخراج داده‌ها از ابزار با در نظر گرفتن نمرات هر یک از سؤالات (همیشه=۳، گاهی=۲، بندرت=۱، هرگز=۰) نمرات مربوط به نظرات پرسنل پرستاری از اقدامات پیشگیری کننده (سؤال ۱ تا ۱۴) و نمرات مربوط به نظرات پرسنل پرستاری از اقدامات پیشگیری کننده توسط سرپرستار اتاق عمل (از سؤال ۱۵ تا ۲۳) با استفاده از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی محاسبه گردید و در مورد ارتباط بین ویژگیهای فردی و نظرات پرسنل اتاق عمل در مورد اقدامات پیشگیری کننده

محیط مناسب و مجهر به کانپه استراحت بین ساعات کار برای شما فراهم است ($X=0/91$) بود. بیشترین پاسخ در این بخش از پرسشنامه نیز مربوط به گرینه هرگز ($%.59$) بود (جدول ۱).

به عبارات، آیا امکان تهیه پرونده پزشکی و سابقه بیماری برای شما مهیا است ($X=1/37$)، آیا در اعمال جراحی بزرگ و طولانی امکان جابجایی و تعویض اسکراب وجود دارد ($X=1/04$)، آیا

جدول ۱. توزیع فراوانی مطلق و نسبی نظرات پرستل پرستاری اتاق عمل در مورد اقدامات پیشگیری کننده از واریس عروق در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تفاوت معنی‌دار آماری را نشان داد ($P<0.008$) در سایر ویژگیهای فردی تفاوت آماری مشاهده نشد (جدول ۲).

در بررسی ارتباط بین نظرات پرسنل پرستاری در مورد اقدامات فردی پیشگیری کننده و ویژگیهای فردی، آزمون T -بین دو جنس مذکور و مؤنث

جدول ۲: میانگین و انحراف معیار نمرات نظرات پرسنل پرستاری در مورد اقدام شخصی پیشگیری از واریس بر حسب ویژگیهای فردی

مدارک تحصیلی و سمت و نظرات پرسنل پرستاری در مقایسه میانگین نمرات نظرات پرسنل پرستاری در مورد اقدامات سازمانی پیشگیری کننده و به ترتیب تفاوت معنی دار آماری، ($P < 0.01$) و ($P < 0.005$) مشاهده شد (جدول ۳).

ویژگیهای فردی بر حسب آزمون ANOVA بین جدول ۳: میانگین و انحراف معیار نمرات نظرات پرسنل پرستاری در مورد اقدامات مدیران سازمان برای پیشگیری از واریس بر حسب ویژگیهای فردی

بحث و نتیجه‌گیری

به کانابه استراحت بین ساعت کار برای شما فراهم است» ($X=۹۱/۰$) بود که خود بیانگر این است که مدیران سازمان به اقدامات پیشگیری کننده از واریس عروق اندامهای تحتانی پرسنل خود توجه نداشته و اگر تا حدی به این موارد توجه شده است بعلت این است که در زمان ارزشیابی عملکرد مدیران این موارد مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند. در حالیکه نتیجه این بخش از سوالات نیز مربوط به گزینه هرگز با میانگین $۵۹/۰$ بوده و میان این مطلب است که مدیران به سلامتی پرسنل تحت نظرات خود توجهی نداشته و در پی فراهم آوردن اقدامات پیشگیری کننده از واریس عروق اندام تحتانی نیستند که این خودشاید به دو علت زیر باشد، یکی اینکه مدیران رده‌های بالا از نظر مالی این امکانات را برای مدیران رده‌های میانی و پائینی فراهم نمی‌آورند و یا اینکه خود مدیران رده‌های میانی و پائینی بعلت عدم آگاهی این امکانات را فراهم نمی‌آورند که این خود باعثی مورد بررسی قرار گیرد. سراجی (۱۳۷۲) در همین رابطه می‌نویسد: $۸۰/۶$ درصد سرپرستاران اطاق عمل بصورت همیشه و $۳۷/۹$ درصد آنها بصورت اغلب و بالاخره $۵۵/۱۴$ درصد آنان بندرت از اقدامات پیشگیری کننده از واریس عروق اندام تحتانی برای پرسنل پرستاری واحد خود استفاده می‌کنند و ۷۰ درصد آنها به جواب هرگز سوالات پاسخ داده‌اند (۳). همچنین نتایج نشان داد که توسط مدیران سازمان هیچگونه کلاس آموزشی در مورد اقدامات پیشگیری کننده از واریس عروق اندامهای تحتانی برای پرسنل فراهم نشده است که این خود نشان می‌دهد که مدیران در این زمینه باعثی بیشتر تلاش کرده و دقت بیشتری را به این مورد معطوف دارند. لوندیان و همکارانش

واریس در واقع بهایی است که ما برای اتخاذ موقعیت ایستاده می‌پردازیم (۱). در زمینه رابطه نظرات پرسنل در مورد اقدامات فردی پیشگیری کننده از واریس عروق اندامهای تحتانی بیشترین میانگین نمرات را عبارات «آیا از روی همانداختن پاها بمدت طولانی بیشتر از ۲ ساعت در طول یک شیفت خودداری می‌کنید» ($X=۲/۲۶$) «آیا از پوشیدن لباس تنگ از جمله جوراب کشی، کمربند و غیره خودداری می‌کنید» ($X=۰/۲۰$) و «آیا در هنگام کار پاها را تغییر پوزیشن می‌دهید» ($X=۱/۷۶$) بخود اختصاص دادند که خود بیانگر این مطلب است که پرسنل اتاق عمل به اقداماتی که وقت گیرنده و همچنین هزینه مالی نداشته توجه کرده و آنها را بکار می‌بندد و از طرفی حجم کار در اتفاقهای عمل زیاد است و تعداد پرسنل هم به اندازه کافی نیست کادر پرستاری کمتر وقت دارند از نظر سلامتی پیگیر مسئله شخصی خود باشند. بانگاهی به نتایج پژوهش در می‌باشیم که اکثر پاسخهای پرسنل به سوالات این بخش به گزینه هرگز بوده است (۳/۴۸). جدول (۱) سراجی (۱۳۷۲) در تحقیقی که در همین رابطه انجام داده است اظهار می‌دارد: که اکثر پاسخهای پرسنل به سوالات در این بخش ($۸/۵۱$ درصد) به گزینه هرگز بوده است (۳) که با نتایج تحقیق حاضر مشابهت دارد.

در مورد نظرات پرسنل در زمینه اقدامات سازمانی پیشگیری کننده از واریس عروق اندام تحتانی بیشترین میانگین نمرات به عبارت «آیا امکان تهیه پرونده پزشکی و سابقه بیماری برای شما مهیا است» ($X=۳/۱$)، «آیا در اعمال جراحی بزرگ و طولانی امکان جابجایی و تعویض اسکراب وجود دارد» ($X=۰/۱۰$) و «آیا محیط مناسب و مجهز

این گروه انجام شده و از اقدامات پیشگیری کننده نظیر تغییر وضعیت پاها بطور مرتب در حین کار، فراهم کردن زمان استراحت بین عمل های جراحی طولانی، خودداری از نشستن و ایستادن بمدت بیشتر از دو ساعت، استفاده از جوراب مخصوص یاباند کشی، استفاده شود. لازم به ذکر است در زمینه ارتباط نظرات پرسنل پرستاری در مورد پیشگیری از واریس باویژگی های فردی در تحقیقات مختلف در این زمینه اشاره نشده است. سراجی (۱۳۷۲) در همین رابطه در مورد بعضی ازویژگیها می نویسد: در رابطه با واریس عروق اندام تحتانی و سن سن بیشترین درصد ابتلاء به واریس (۱۰ درصد) در گروه سنی ۴۰ سال به بالا قرار دارد و کمترین درصد (صفدرصد) به گروه سنی ۲۰-۲۴ سال مربوط می شود. در رابطه با سابقه کار در محیط اتاق عمل با واریس بیشترین درصد ابتلاء (۶/۱ درصد) در گروه سابقه کار واریس عروق اندام تحتانی بیشترین درصد ابتلاء واریس در پرسنل شیفت در گردش بوده است و کمترین درصد ابتلاء به واریس در شیفت شب کار و عصر کار دیده شده است (۳). در زمینه معاینات دوره پزشکی حلم سرشت و دل پیشه می نویسد: برای اینکه از تندرستی خود بخوبی نگهداری نمایید، بایستی بطور مرتب و کامل تحت معاینات پزشکی قرار بگیرید. در این عصر که زندگی شهرنشینی باعث افزایش گرفتاریها و ناراحتی های شخصی است اطمینان براینکه شخص در صورت لزوم در تحت مراقبت پزشکی قرار دارد بسیار مهم و باعث اطمینان خاطر می باشد (۲).

در زمینه نظرات پرسنل پرستاری در مورد اقدامات مدیران سازمان برای پیشگیری از واریس، بر حسب ویژگی های فردی در مورد مدرک تحصیلی

می نویسد: آموزش سطح اطلاعات پرسنل را بالا می برد و به آنها امکان می دهد تا با بکار گرفتن اصول یاد گرفته شده در آسایش بیشتری زندگی کنند (۱). اگر بتوانیم در تمام زمینه ها آگاهی ها را بالا ببریم می توانیم از سلامتی بیشتری برخوردار شویم و محیط های امن با کارآیی بالا بوجود آوریم که این خود به اقتصاد و سلامت جامعه کمک می کنند و به قول مدیران بهداشتی پیشگیری بهتر از درمان است. در زمینه ارتباط بین نظرات پرسنل پرستاری در مورد اقدامات پیشگیری کننده و ویژگی های فردی نتایج نشان داد که نمرات میانگین مردان کمتر بوده است یعنی به موارد اقدامات پیشگیری کننده کمتر توجه داشته اند و آزمون T بین دو جنس مذکور و مؤنث تفاوت معنی دار آماری را نشان می دهد ($P<0.008$) (جدول ۲). راکلی (Ruckley) و گری (Gerry) در تحقیقات ادینبرگ به این نتیجه رسیدند که زنان بیشتر از مردان علائم اندام تحتانی مثل احساس سنگینی یا سفتی، ورم و درد، بیقراری پاها و کرامپها را گزارش کرده اند و همچنین بروز علائم در هر دو جنس با افزایش سن شدت می یابد (۱۴). در همین رابطه پاتریک می نویسد: وقوع واریس در زنان نسبت به مردان شایع تر است (۱۳). در مورد سایر ویژگی های فردی تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد. بنظر می رسد واحدهای پژوهش علیرغم متفاوت بودن در سمت سابقه کار و نوع شیفت کاری نظرات یکسانی داشته و نسبت به پیشگیری از واریس عروق اندام تحتانی توجه کافی ندارند. احتمالاً بدلا لیلی از قبیل نداشتن آگاهی های لازم در این زمینه و کمبود پرسنل، عمل های جراحی طولانی، کمبود امکانات به این مشکل کمتر توجه شده است. در این زمینه توصیه می شود که معاینات دوره ای پزشکی جهت بررسی وضعیت سلامت

نظرات خود فراهم آورند. پرستارانی که در مراحل اولیه واریس قرار دارند (خصوصاً اگر سابقه مثبت فامیلی واریس وریدی دارند)، باید در موقع ایستادن و یا نشستن‌های طولانی مدت و زمان حاملگی از جوراب الاستیکی استفاده کنند. تمرینات مناسب ورزشی و نیز بلند کردن پاهای در پیشگیری از احتقان وریدی مفید بوده و توصیه می‌شود از ایجاد فشارهای طولانی مدت بر روی وریدها خودداری نمایند (۱۲). با توجه به موارد مذکور اهمیت پیشگیری در این زمینه مشخص می‌شود. بدیهی است ارتقاء سلامتی در این زمینه در گرو بالا بردن آگاهی و استفاده بهینه از امکانات موجود، امکان‌پذیر خواهد بود.

سپاسگزاری

بدینویسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که هزینه طرح تحقیقاتی را تأمین نموده‌اند، تشکر و سپاسگزاری می‌گردد.

و سمت تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده شد. بدین صورت افرادی که دارای مدرک کارشناسی و در سمت پرستار نسبت به سایر گروهها از میانگین نمرات بالاتر برخوردار بودند. احتمالاً بدلاً ایلی نظیر استفاده از افراد دارای مدرک کارشناسی در رده‌های دارای مسئولیت و فراهم بودن امکاناتی از قبیل جابجایی با پرسنل سایر بخش‌ها و داشتن آگاهی بیشتر در این زمینه و استفاده از امکانات موجود در بخش، میانگین نمره بالاتری را بخود اختصاص دادند و این نتیجه دور از انتظار نیست. در سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه به این موضوع اشاره نشده است. در مورد سایر ویژگی‌های فردی نیز تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده نشد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود که ضمن آگاه نمودن مدیران به وظایف خود در این زمینه پیشگیری از واریس عروق اندام‌های تحتانی در پرسنل پرستاری حداقل استفاده از امکانات موجود در بخش و بیمارستان را برای پرسنل تحت

منابع

- ۱- الوندیان، لیدیا: همکاران بهداشت در پرستاری محیط و فرد. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۶، صص: ۹۵.
 - ۲- حلم سرشت، پریوش؛ دل پیشه، اسماعیل: اصول بهداشت فردی. تهران: انتشارات شرکت سهامی چهر، ۱۳۶۶، صص: ۲۱۴.
 - ۳- سراجی، ابوالفضل: بررسی نظرات پرسنل پرستاری شاغل در اتفاقهای عمل در مورد اقدامات پیشگیری کننده از واریس عروق اندام تحتانی خود در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده.
- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۷۴، صص: ۲۴.
- ۴- مویر، گری؛ گادفری، فولر: مبانی پزشکی پیشگیری. ترجمه علی صارمی، اکبر خمسه. تهران: جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۶۶، صص: ۳.
- ۵- میرلوحی، مسیح؛ محمدزاده، زهرا: روش تحقیق در علوم اجتماعی. مجله علمی دانشکده پزشکی اصفهان، بهار ۱۳۶۲، شماره ۶، صص: ۴۲۳.
- ۶- هاریسون ت ر: بیماریهای قلب و عروق. ترجمه نادر قطبی و آریان فرج‌الله‌ی. تهران: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، ۱۳۷۸، صص: ۶.

-
7. Brunner SL, Suddarth SD. Text book of Medical Surgical Nursing. Philadelphia: J B Lippincott, 1996: 658.
 8. Dugas, B W. Introduction to Patient Care Comprehensive Approach to Nursing. Philadelphia: WB Saunders, 1983: 13.
 9. Fahey VA. Vascular Nursing. Philadelphia: WB Saunders, 1988: 21.
 10. Luckman, J. Medical Surgical Nursing a Psychologic Approach. Philadelphia: WB Saunders, 1987: 1122.
 11. Manos F, Encyclopedia of Occupation Health and Safety. St Louis: Mosby, 1998: 110.
 12. Phipps W, et al. Medical Surgical Nursing. Philadelphia: J B Lippincott, 1991:789.
 13. Patric M, et al. Medical Surgical Nursing. Philadelphia: J B Lippincott, 1987: 95.
 14. Rukley R, Gerry F. To Difine the Relations Between Age Sex, Lower Limb Symptoms and the Presence of Trunk Varicose Veins on Clinical Examination. BMJ 1991:353-356.

A Survey of Views of Operating Rooms Personnel about Preventive Criteria for Lower limb Varicose Veins

Nasiri Moghadam SH, Sabzevari S.

Abstract

Introduction: Varicose veins is a common complication people who are forced to stay on their feet for a long time because of the kind of their jobs. The nurses who work on operating rooms have to stay on their feet for a long time and without movement so as a result, this situation makes them face the lower limbs varicose veins.

Objective: This research is a descriptive study determining the views of the nurses working in operating rooms of the hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences about preventive actions for lower limb varicose veins.

Materials and Methods: The questionnaire contained 23 questions which drew up in two sections and in order to analyze the data, central tendency, dispersion, ANOVA and the T test were used.

Results: The results of this research indicate that most of the answers of personnel about their views of the individual steps for preventing lower limb varicose veins and also about the steps of some organizations for preventing the lower limb varicose veins were 48.3% and 59% respectively. Examination of the connection between nurses' views about the individual steps and the demographic characteristics of the "T" test between females and males indicated a significant difference ($P<0.008$). Other demographic characteristics didn't show any statistically significant difference. In a comparison between the average of scores of nurses' views about the organizational preventive steps and demographic characteristics according to ANOVA test between educational documents and the position showed significant difference ($P<0.01$) respectively ($P<0.005$). Demographic characteristics no statistically significant difference were seen.

Conclusion: Considering these results, the necessity for increasing the personnel's knowledge of how to prevent the varicose veins and also the necessity for provision enough possibilities in this field are quite felt.

Key words: Nurse Clinicians/ Nursing Staff, Hospital/ Operating Room Nursing/ Varicose Veins