

دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبتها ویژه قلبی

دکتر محمد جعفر مدبر نیا* - دکتر کامبیز فرقان پرست** - دکتر سید محمد رسول خلخالی* - دکتر کیومرث نجفی*

* استادیار گروه روان پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

** دانشیار گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

در این مطالعه فراوانی سندروم دلیریوم در ۲۴۵ بیمار بستری در بخش مراقبتها ویژه قلبی بیمارستان دکتر حشمت رشت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور همه بیماران ازاویل روز تا آخرین روز بستری شدن خود در بخش مراقبتها ویژه قلبی، از شروع طرح تا تمام آن، توسط پرستاران آموزش دیده در دو نوبت کاری صحیح و صریح و توسط یکی از روان پزشکان مجری طرح در نوبت کاری حصر از نظر بروز سندروم دلیریوم مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش از گزارشات سازمان یافته پرستاران و معاینات بالینی روان پزشکان که در برگه های ویژه ای درج می گردید، بدست آمد. نحوه تشخیص فراهم شدن ملاک های تشخیص DSM IV در مورد سندروم دلیریوم ناشی از یک اختلال طبی عمومی براساس مجموعه گزارشات پرستاری و معاینات بالینی انجام شده توسط هر دو روان پزشک در تمام طول مدت بستری شدن بیمار در بخش بود. در نهایت ۳۳ نفر (۱۲/۴ درصد) بیمار مبتلا به دلیریوم شناخته شدند. ۲۲ نفر از بیماران مبتلا به دلیریوم (۶۷٪ کل مبتلایان) متعلق به گروه سنی ۶۵ سال و بالاتر بودند. ارتباط معنی دار آماری بین سن و بروز دلیریوم وجود داشت ($P=0.0001$). ولی این ارتباط بین جنس و دفاتر بستری شدن بیمار در بخش مراقبتها ویژه قلبی و بروز دلیریوم وجود نداشت. این مطالعه نشان می دهد که سندروم دلیریوم با فراوانی قابل توجهی در بخش مراقبتها ویژه قلبی دیده می شود و سالماندان در معرض خطر بالاتری از ابتلاء به این سندروم قرار دارند.

کلید واژه ها: بخش مراقبت از بیماران عروق کرونر / دلیریوم

مقدمه

عوارض ناتوان کننده ذهنی بعدی، احتمال بالاتر صدمات جسمی در دوره های حاد اختلال هشیاری و مشکلات مراقبتی بیشتر از این بیماران توسط پرستاران؛ دیگر عوارض از بروز سندروم دلیریوم می باشد (۵و۷)، معهذا علی رغم لزوم شناخت این سندروم و توجه کافی برای کنترل علت زمینه ای آن، در تشخیص این سندروم غفلت شده یا به درستی تشخیص داده نمی شود (۴ و ۹). بیماریهای قلبی مثل انواع آریتمی ها، انفاکتوس میوکارد، نارسایی قلبی و اقدامات تشخیصی یا درمانی قلبی مثل آنتی بیوگرافی و جراحی های عروق کرونری نیز از عوامل بروز این سندروم هستند (۱، ۵، ۶ و ۷) پژوهش های گوناگون که در کشورهای دیگر جهان انجام شده است شیوع این سندروم را در بخش های مراقبتها ویژه قلبی بین ۱۰ تا ۴۰ درصد گزارش کرده اند (۱۱، ۱۳ و ۱۵)، ولی آماری از شیوع سندروم در بخش مراقبتها ویژه قلبی در کشور ایران

دلیریوم، اختلالی حاد و گذرا در عملکرد مغز است (۲). گرچه هسته اصلی این سندروم اختلال هشیاری و نقائص توجه و تمرکز است ولی نقص کلی در تمام عرصه های روانی تفکر، خلق، ادراک، زبان، تکلم، خواب، روانی حرکتی و دیگر حوزه های شناختی دیده می شود (۱). سیر علائم در این سندروم کیفیت موج داشته و عصرها و ساعتات او لیه شب از شدت بیشتری برخوردار است (۱و۲). این کیفیت تشخیص دلیریوم را با دشواری روبرومی سازد (۲و۳) دلیریوم از مهم ترین عوارض بیماریهای داخل و خارج سیستم اعصاب مرکزی است ولی عوامل خارج سیستم اعصاب مرکزی از شیوع بیشتری برخوردارند (۱، ۵، ۶ و ۷) بروز این سندروم با پیش آگهی بدی همراه است (۵). مرگ و میر بعد از گذشت ۳ ماه از یکدوره دلیریوم ۳۰٪ و بعد از یکسال در حدود ۵۰٪ است (۱). طولانی تر شدن مدت بستری در بیمارستان،

دلیریوم حداکثر بود انجام می شد هر روان پزشک یک شب در میان بیماران را معاینه می کرد و بدین ترتیب امکان معاینه در طول بسترهای برای هر دو روان پزشک فراهم می شد. این انتخاب زمانی، امکان ملاقات با هر دو نوبت کاری پرستاران رانیز فراهم می کرد. تشخیص نهایی دلیریوم، با استفاده از مجموعه مشاهدات و گزارشات پرستاران و معاینات بالینی روان پزشکان مجری طرح براساس ملاکهای تشخیص DSMIV در مورد دلیریوم ناشی از یک اختلال طبی عمومی داده می شد. برای تشخیص، نظر مثبت هر دو روان پزشک الزامی بود. در مواردی که تردیدی از نظر بروز سندروم دلیریوم وجود داشت یا نظر یکی از روان پزشکان موافق بروز سندروم دلیریوم نبود بیمار در نقاط بیشتری از روز مورد بررسی قرار می گرفت تا به تکمیل شدن اطلاعات مورد لزوم برای تشخیص نهایی کمک کند. این کار در مورد ۱۰ بیمار صورت گرفت و در نهایت اطلاعات کافی برای تشخیص یا عدم تشخیص در موارد مشکوک بطوریکه نظر هر دو روان پزشک را تأمین کنبدست آمد. در طول مطالعه ۴ بیمار به علت اینکه به مدت کوتاهی در بخش بسترهای شدند و اطلاعات کافی برای تشخیص بدست نیامد از مطالعه حذف شدند. در بیمارانی که احیاء قلبی ریوی شده بودند، گزارش مشاهدات رفتاری و معاینات بالینی حداقل به ۵ ساعت بعداز عملیات احیاء قلبی ریوی موکول گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تست آماری Chi-Square استفاده شد. موافقت بیماران در مورد استفاده پژوهشی از نتایج مطالعه اخذ گردید.

نتایج

از ۲۴۵ بیمار بسترهای در بخش مراقبت های ویژه

وجود ندارد، لذا پژوهش حاضر را با هدف تعیین فراوانی سندروم دلیریوم و بررسی ارتباط آن با سن و جنس و دفعات بسترهای در بیماران بسترهای در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان دکتر حشمت رشت انجام دادیم.

مواد و روش ها

در این پژوهش که از نوع پژوهش های مقطعی و در محیط بیمارستانی بوده تعداد ۲۴۵ بیمار از اولین روز بسترهای تا آخرین روز بسترهای خود در بخش مراقبت های ویژه قلبی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به ماهیت بسیار موج این سندروم و در نظر داشتن اینکه بررسی بیمار فقط در یک زمان خاص از شبانه روز بدون بذل توجه به رفتار و وضعیت شناختی وی در سایر اوقات شبانه روز از اعتبار تشخیصی این سندروم می کاهد(۸) تصمیم گرفتیم علاوه بر معاینات بالینی توسط روان پزشکان از اطلاعات و مشاهدات کسانی که در تمام شبانه روز بر بالین بیمار هستند و شاهد تغییرات رفتاری وی می باشند بهره مند شویم. بدین منظور پرستاران همکار طرح را به شکل نظری و عملی در مورد اینکه چگونه رفتار یک بیمار را در طی نوبت کاری خود ارزیابی و با استفاده از فرم های سازمان یافته گزارش کنند، آموزش دادیم. گزارش مشاهدات پرستاران از رفتار بیماران در دو نوبت کاری صحیح و عصر انجام می شد. پرستاران نوبت کاری شب با توجه به اینکه این نوبت کاری با خواب بیماران توأم بود مشاهدات شب را نه برای همه بیماران، بلکه فقط برای بیمارانی که در طی شب دچار اختلال رفتاری می شدند، گزارش می کردند. چون این بررسی در فصل زمستان انجام می شد معاینات روان پزشکان در ساعات اولیه شب (ساعت ۲۱-۲۱) و در زمانی که احتمال بروز

جدول ۳- توزیع فراوانی دلیریوم در بیماران بستری شده در بخش مراقبتهای ویژه قلبی به تفکیک دفعات بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی

جمع		ندراد	دارد	دلیریوم	دفعات بستری
تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)		
(۱۰۰)(۱۷۱)	(۸۷/۷)(۱۵۰)	(۱۲/۳)(۲۱)	(۱)	یک بار	
(۱۰۰)(۴۸)	(۸۳/۳)(۴۰)	(۱۶/۷)(۸)	(۱)	دو بار	
(۱۰۰)(۲۶)	(۸۴/۶)(۲۲)	(۱۵/۴)(۴)	(۱)	سه بار و بیشتر	
(۱۰۰)(۲۴۵)	(۸۶/۵)(۲۱۲)	(۱۳/۵)(۳۳)	(۱)	جمع	

اختلاف غیر معنی دار $P>0.05$

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش‌های متعددی با استفاده از ملاک‌های تشخیصی DSMIII-R, DSMIV, ICD-10 به روی بیماران بستری شده در بخش‌های مراقبت‌های ویژه انجام شده و آمار متفاوتی بین ۴۰-۴۰ درصد، از ابتلا به دلیریوم گزارش شده است (۱۳). تنوع ارقام بدست آمده در این مطالعات تاحدی می‌تواند ناشی از استفاده از ملاک‌های تشخیصی متفاوت باشد. گرچه ملاک‌های تشخیصی DSMIV از سال ۱۹۹۴ منتشر گردیده ولی ما فقط به یک مطالعه برخوردهیم که با استفاده از این معیارهای تشخیصی انجام شده است. در این مطالعه ۲۹/۴ درصد افراد بالای ۷۰ سال مبتلا به دلیریوم شناخته شدند (۱۵). در مطالعه ما ۲۶/۲ درصد از افراد بالای ۶۵ سال مبتلا به دلیریوم شدند که دارای بیشترین فراوانی ابتلا به دلیریوم در بین ۳ گروه‌سنی بود. گرچه در محدوده سنی انتخاب شده بین دو مطالعه ۵ سال تفاوت وجود داشت ولی در صورتی که در مطالعه ما نیز محدوده سنی ۷۰ و بیشتر انتخاب می‌شد، نزدیکی در فراوانی دلیریوم، باز هم قابل مشاهده بود. در مطالعات دیگری که در ایسلند و آمریکا انجام شده است فراوانی دلیریوم به ترتیب ۱۲ درصد و ۱۴ درصد گزارش شده است (۱۱ و ۱۳).

در مطالعات فوق و در مطالعه ما رابطه معنی دار

قلبی مردان و زنان بیمارستان دکتر حشمت در طول طول زمان پژوهش ۱۴۳ نفر مرد (۴۰٪) و ۱۰۲ نفر زن (۶٪) بودند افراد فوق از نظر سنی در ۳ گروه کمتر از ۴۵ سال ۲۷ نفر (۱۱٪) و بین ۴۵ تا ۸۶ سال ۱۳۴ نفر (۵۴٪) قرار داشتند. بیماران از نظر دفعات بستری نیز در ۳ گروه یک بار بستری ۱۷۱ نفر (۶۹٪)، دو بار بستری ۴۸ نفر (۱۹٪) و سه بار و بیشتر بستری ۲۶ نفر (۱۰٪) قرار داشتند در این پژوهش ۳۳ نفر (۱۳٪) از بیماران مبتلا به دلیریوم شناخته شدند. توزیع فراوانی و دلیریوم به تفکیک سن، جنس و دفعات بستری در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده است. رابطه معنی دار آماری بین سن و بروز دلیریوم یافت شد ($P=0.0001$) و $\chi^2=18.02$ و $df=2$ (جدول ۱). این ارتباط معنی دار آماری بین جنس و دلیریوم و نیز دفعات بستری و دلیریوم وجود نداشت (جدول ۲).

جدول ۱- توزیع فراوانی دلیریوم در بیماران بستری شده در بخش مراقبتهای ویژه قلبی به تفکیک گروههای سنی

جمع		ندراد	دارد	دلیریوم	گروههای سنی
تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)		
(۱۰۰)(۲۷)	(۹۶/۳)(۲۶)	(۳/۷)(۱)	(۱)	کمتر از ۴۵ سال	
(۱۰۰)(۱۳۴)	(۹۲/۵)(۱۲۴)	(۷/۵)(۱۰)	(۱)	۴۵ تا ۶۴ سال	
(۱۰۰)(۸۴)	(۷۳/۸)(۶۲)	(۲۶/۲)(۲۲)	(۱)	۶۵ سال و بیشتر	
(۱۰۰)(۲۴۵)	(۸۶/۵)(۲۱۲)	(۱۳/۵)(۳۳)	(۱)	جمع	

($P=0.001$, $\chi^2=2.18$, $df=2$)

جدول ۲- توزیع فراوانی دلیریوم در بیماران بستری شده در بخش مراقبتهای ویژه قلبی به تفکیک جنس

جمع		ندراد	دارد	دلیریوم	جنس
تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)		
(۱۰۰)(۱۴۳)	(۸۷/۷)(۱۲۴)	(۱۳/۳)(۱۹)	(۱)	مرد	
(۱۰۰)(۱۰۲)	(۸۶/۳)(۸۸)	(۱۳/۷)(۱۴)	(۱)	زن	
(۱۰۰)(۲۴۵)	(۸۶/۵)(۲۱۲)	(۱۳/۵)(۳۳)	(۱)	جمع	

اختلاف غیر معنی دار $P>0.05$

در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستان دکتر حشمت رشت به سندرم دلیریوم مبتلا می‌شوند که رابطه معنی‌دار آماری با سن آنها دارد و در افراد بالای ۶۵ سال با فراوانی بیشتری مشاهده می‌شود که مطرح‌کننده افزایش سن، به عنوان عامل خطرساز ابتلا به دلیریوم می‌باشد و با توجه به فراوانی سندرم دلیریوم در بخش مراقبتهای ویژه قلبی، اشتراک مساعی روان پزشکان و متخصصین قلب و عروق در جهت تشخیص زودرس و کنترل دلیریوم پیشنهاد می‌شود.

تشکر و قدردانی

مؤلفین مقاله از دکتر بیژن شاد استادیار بیماریهای قلب و عروق و دکتر هما ضرایبی استادیار روان پزشکی بخاطر مشاوره ارزنده ایشان و نیز مسئولین پرستاری بیمارستان دکتر حشمت رشت خانم‌ها غلامزاده، راستاد، کریمی و پیشخانی و سایر همکاران محترم پرستاری بخاطر همکاری در اجرای طرح تشکر و قدردانی می‌کنند.

آماری بین سن و بروز دلیریوم وجود داشت گرچه اعداد ارائه شده در مطالعات فوق و در مطالعه ما ظاهراً نزدیک به هم می‌باشند ولی این فراوانی‌ها مربوط به کشورهایی است که در شرایط بهداشتی بهتری قرار دارند و طول عمر قابل انتظار در این کشورها بالاتر است (۱۶) و افراد سالم‌مند بیشتری در بخش‌های مراقبت ویژه بستری می‌شوند و میانگین سنی افراد سالم‌مند بستری شده در این بخش‌ها از میانگین سنی افراد سالم‌مند بستری شده در بیمارستانهای ما بالاتر است (۱۴ و ۱۶). با پذیرفتن این واقعیت که افزایش سن با بروز دلیریوم رابطه دارد شاید بتوان گفت که افراد مورد بررسی در مطالعات یاد شده بدلیل داشتن سن بالاتر در معرض خطر بیشتری از نظر ابتلا به دلیریوم قرار داشتند. ثانیاً سرعت امداد رسانی در فوریت‌های قلبی در این کشورهای بالاتر بوده (۱۷) و این امکان را ایجاد می‌کند که بیماران بدحال بیشتری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بستری شده و تحت مراقبت قرار بگیرند. ثالثاً اکثر بیمارانی که باید در بخش مراقبتهای ویژه بستری شوند سریعاً به آنجا منتقل می‌شوند ولی در مطالعه ما تعدادی از بیماران یا مدتی را در بخش فوریت‌ها گذرانده و بعداً به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شدند یا بعد از گذراندن شرائط حاد و مستقیماً به بخش منتقل شدند و یا مستقیماً از بخش فوریت‌ها مرخص گردیدند و یا در بخش فوریت‌ها فوت کردند. در هر صورت به علت محدودیت‌های موجود تعدادی از بیمارانی که می‌توانستند در جمعیت مورد مطالعه ما وارد شوند به دلایل یاد شده در این مطالعه وارد نشدند. بنابراین تشابه ظاهری ارقام بدست آمده نمی‌تواند گویای تشابه واقعی در نتایج مطالعه ما و مطالعات یاد شده باشد. در نهایت می‌توان گفت که تعدادی از بیماران بستری شده

منابع

1. Liptzin B,Levkoff SE,Gtlibe GL. Delirium. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1993; 5:154-55.
2. Marcantonio ER. A Clinical Prediction Rule for Delirium. JAMA 1994; 271(2):130-35.
3. Marcantonio ER. The Association of Intraoperative Factors with Development of Postoperative Delirium. JAMA 1998; 280:380-4.
4. Eden BM, Foreman MD. Problems Associated with Underrecognition of Delirium in Criticalcare. Heart Lung 1996; 25(5): 388-400.
5. Blumental JA, Madden DJ. A Preliminary Study of the Effects of Cardiac Procedure On cognitive Performance. Int J psychosom 1991; 38(1-4): 13-16.
6. Rode Wald G,Dahme B. Central Nervous System Risk Factors in Heart Surgery. Nz Kardiol 1990;79 supple4: 13-21.
7. Crippen DW. Neurologic Monitoring in the Intensive Care Unit. New Horiz 1994; 2(1): 107-20.
8. Zou Y, Cole M. Detection and Diagnosis of Delirium in the Eldery: Psychiatric Diagnosis, Confusion Assessment Method, or Consensus Diagnosis?. Int Psychogeriate 1995; 10(3):303-8.
9. Inouye SK. Delirium in Hospitalized Older Patients: Recognition and Risk Factor. J Geriatr Psychiatry Neural 1998; 11(3):118-25.
10. Flacker JM, Marcantonio ER. Delirium in the Eldery, Optimal Managment. Drug Aging 1993; 13(2):119-30.
11. Kolbeinsson H, Jonsson A. Delirium and Dementia in Acute Medical Admissions of Elderypatients in Iceland. Acta Psychiatr Scand 1993; 87(2):123-7.
12. Liptzin B, Levkoff SE. An Empirical Study of Diagnostic Criteria for Delirium. Am J Psychiatry 1991; 148(4):454-7
13. Inouye Su, Rushing JT. Does Delirium Contribute to Poor Hospital Outcome?: A Three- Epidemiologic Study J Gen Inter Med 1988; 134(4):234-42.
14. Francis J, Martin D A. Prospective Study of Delirium in Hospitalized Eldery. JAMA 1990; 263(8):1097-101.
15. Kagosima J, Mashima Y. Acute Myocardial Infarction in Eldery Patients. J Cardiol 2000; 35(4):267-75.
16. Jarvik LF, Small GW. Geriatric psychiatry. In: Sadoek BJ, Sadock VA, (eds). Comprehensive Textbook of Psychiatry. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams Willkins, 2000: 2980-90.
17. Witzel K, Hoppe M, Raschka C. The Influence of Mode of Ambulance Transportation on the Emergency Patients Outcome. Eur J Emerg 1999; 6(2):115-8.

Delirium in CCU

Modabernia MJ, Forghan parast K, Khalkhali SMR, Najafi K.

Abstract

In this study, the frequency of delirium syndrome was surveyed in 245 patients who admitted in CCU of Dr. Heshmat hospital in Rasht. For this reason trained nurses visited all patients in every morning and evening and one psychiatrist visited them on every evening, from the first day of admission till the end of their staying in CCU.

Data were obtained by structured Nursing report and clinical examination. The diagnosis was based on DSM IV criteria for delirium due to general medical condition. According to nursing reports, 33 patients (13.4%) suffered from delirium and 22 patients (67%) belonged to the above 65 years age group. There was a significant relationship between age and the occurrence of delirium with sex ($p=0.0001$) but not with history of admission in any CCU ward.

This study confirms that delirium with a significant frequency was seen in CCU, and elders appear to be more prone to this syndrome.

Key words: Coronary care unit / Delirium

جدول ۱- توزیع فراوانی دلیریوم در بیماران بستری شده در بخش مراقبتها و بیوژه قلبی به تفکیک گروههای سنی

ندارد	دارد	دلیریوم	جمع			
			تعداد درصد	تعداد درصد	تعداد درصد	تعداد
	۱۰۰ ۲۷	۹۶/۳	۲۶	۳/۷	۱	کمتر از ۴۵ سال
	۱۰۰ ۱۳۴	۹۲/۵	۱۲۴	۷/۵	۱۰	۴۵ تا ۶۴ سال
	۱۰۰ ۸۴	۷۳/۸	۶۲	۲۶/۲	۲۲	۶۴ سال و بیشتر
۱۰۰ ۲۴۵	۸۶/۵	۲۱۲	۱۳/۵	۳۳		جمع

 $P=0.001, df=2, X^2=$

df=2,X)

جدول ۲- توزیع فراوانی دلیریوم در بیماران بستری شده در بخش مراقبتها و بیوژه قلبی به تفکیک جنس

ندارد	دارد	دلیریوم	جمع	
			تعداد درصد	جنس
تعداد درصد	تعداد درصد	تعداد درصد		
۱۰۰ ۱۴۳	۸۶/۷ ۱۲۴	۱۳/۳ ۱۹		مرد
۱۰۰ ۱۰۲	۸۶/۳ ۸۸	۱۳/۷ ۱۴		زن
۱۰۰ ۲۴۵	۸۶/۵ ۲۱۲	۱۳/۵ ۳۳		جمع

اختلاف

 $P>0.05$ غیر معنی دار

جدول ۳- توزیع فراوانی دلیریوم در بخش مراقبهای ویژه قلبی به تفکیک دفعات بستری در بخش مراقبهای ویژه قلبی

ندراد	دارد	دلیریوم	جمع	
			دفعات بستری	تعداد درصد
۱۰۰ ۱۷۱	تعداد درصد ۸۷/۷ ۱۵۰	تعداد درصد ۱۲/۳ ۲۱	یکبار	
۱۰۰ ۴۸	۸۳/۳ ۴۰	۱۶/۷ ۸	دوبار	
	۱۰۰ ۲۶	۸۴/۶ ۲۲	سه بار و بیشتر	
۱۰۰ ۲۴۵	۸۶/۵ ۲۱۲	۱۳/۵ ۳۳	جمع	

اختلاف

 $P > 0.05$ غیر معنی دار