

بیوکی وین: نرم افزاری برای مطالعات هم ارزی زیستی

*دکتراحسان ابوطالب (PhD) - دکترسعید منوچهری (PhD)

نویسنده مسئول: گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

پست الکترونیک: e_aboutaleb@gums.ac.ir

تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۱۲/۱۶ تاریخ ارسال جهت اصلاح: ۹۷/۰۳/۲۷ تاریخ پذیرش: ۹۷/۰۷/۱۷

چکیده

مقدمه: هم ارزی زیستی مهم‌ترین راه ارزیابی چگونگی و کارایی فرمولاسیون‌های دارویی است. در این آزمون سرعت و میزان ورود دارو به گردش عمومی خون در مورد فراورده‌های آزمون و مرجع مورد مقایسه آماری قرار می‌گیرد. سنجه تعیین سرعت و میزان ورود دارو به جریان خون، متغیرهای فارماکوکیتیک مانند بیشینه غلظت پلاسمایی، زمان رسیدن به بیشینه غلظت، سطح زیر نمودار غلظت خونی در برابر زمان ایستای سرعت زداش سراسری دارو است که با برآوردهای پیچیده از غلظت‌های خونی بدست می‌آید. محاسبات پیچیده متغیرهای فارماکوکیتیک و آماری از هم‌ترین چالش‌های این مطالعات بوده و اشتباه محاسباتی به تفسیرنتایج اشتباه می‌انجامد. برای کمک به زدودن این مشکل در مطالعه حاضر نرم افزاری برای این نوع محاسبات، طراحی و نمایانده شده است. این نرم افزار با رابط کاربری آسان برای پژوهشگران این رشته می‌تواند امکان محاسبات مربوطه را بدون درگیری شدن کاربر با فرمول‌های فارماکوکیتیک و آماری فراهم سازد.

هدف: طراحی نرم افزاری بومی، آسان و کاربرپسند برای کمک به اجرای مطالعات هم ارزی زیستی.

مواد و روش‌ها: این نرم افزار با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Microsoft Visual Basic نسخه ۱۴ تهیه شد مرجع علمی اصلی آن راهنمای سازمان دارو و غذاي آمريكا (FDA) در اجرای مطالعات هم ارزی زیستی و محاسبات مربوطه بود.

نتیجه گیری: نرم افزار حاضر می‌تواند بعنوان یک بسته کامل جهت مطالعات هم ارزی زیستی بکار بروde شود.

کلید واژه‌ها: بیوکی وین/ هم ارزی زیستی / نرم افزار

_____ مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیست و هفت، شماره ۱۰۸، صفحات: ۴۴-۳۵

مقدمه

به طور کلی، دو فراورده بیوکی والانت باید در کارآزمایی‌های بالینی نیز اثربخشی برابری داشته باشند. زیرا این فراورده‌ها از شکل دارویی و دوز یکسان ساخته شده و در صورت اثبات برابری فراهمی زیستی و عوامل فارماکوکیتیک کارکرد یکسانی دارند(۱).

برای مقایسه عوامل فارماکوکیتیکی بیشتر از روش آماری آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده می‌شود. متغیرهایی که در نمونه آزمون و مرجع ارزیابی می‌شوند در بردارنده سطح زیر منحنی غلظت پلاسمایی در برابر زمان (AUC_0^{last} ، AUC_0^{inf})، بیشینه غلظت پلاسمایی (C_{\max}) و نیز زمان رسیدن به این غلظت (T_{\max}) است(۲-۶).

سطح زیر منحنی غلظت پلاسمایی در برابر زمان تا آخرین نقطه قابل اندازه‌گیری (AUC_0^{last}) و نیز سطح زیر منحنی غلظت پلاسمایی در برابر زمان تا زمان فرضی بی‌نهایت (AUC_0^{∞}) معیارهای اصلی میزان ورود دارو به جریان خون است، بیشینه غلظت پلاسمایی (C_{\max}) بیشینه غلظت پلاسمایی دارو را نشان می‌دهد و بیانگر سرعت و میزان ورود دارو به جریان خون

آزمون هم ارزی زیستی (بایوکی والانت) از مهم‌ترین مطالعات آزمایشگاهی بالینی برای بررسی عملکرد فراورده‌های دارویی است. طی این آزمون فراهمی زیستی یک فراورده ژنریک ساخته شده با فراهمی زیستی فراورده رفرانس مقایسه شده و در صورت استوانش نبود تفاوت معنی‌دار آماری فاکتورهای فراهمی زیستی، فراورده ژنریک پرونده ورود به چرخه درمان را پیدا می‌کند و با فراورده رفرانس، بیوکی والانت (هم ارز زیستی) نامیده می‌شود(۱ و ۲).

فراهمی زیستی به اندازه یک دارو که از شکل دارویی آزاد می‌شود و پس از جذب وارد جریان خون عمومی بدن شده و نیز سرعت ورود آن به جریان خون گفته می‌شود. به بیانی دیگر، فراهمی زیستی بیانگر میزان داروی در دسترس در محل اثر دارو است(۱).

در صورت برابری شکل دارویی و نیز ویژگی‌های فیزیک و شیمیایی ماده موثره دارویی (مانند نوع نمک و پلی مرفیسم)، هر گونه اختلاف در فراهمی زیستی می‌تواند نشان‌دهنده اختلاف و کاستی در فرمولاسیون فراورده باشد(۳).

نسخه کامل (Full Version) مبالغه معمولاً گزارنده می‌خواهد. به همین دلیل تهیه نسخه کامل این نرم‌افزارها توسط دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقاتی ایران دشوار است.

همچنین، به دلیل مشکلات موجود بیشتر این نرم‌افزارها به محققان ایرانی فروخته نمی‌شوند و استفاده از نرم‌افزارهای قفل شکسته (Pirated-Version) نیز به علت نداشتن امکان بازنمود نتایج در مقاله‌ها شدنی نیست.

در صورت امکان خرید یک بسته نرم‌افزاری محاسبه همارزی زیستی این نرم‌افزارها به صورت همگردن (کامپایل) شده ارائه (Source) می‌شوند و شرکت‌های تولیدکننده از ارائه کد منبع (Source) نرم‌افزار خودداری می‌کنند. این مساله باعث می‌شود که کاربر امکان ایجاد تغییر و دگرگونی در نرم‌افزار مانند افزودن فرمول برای سازش با خط مشی‌های (Guideline) جدید را نداشته باشد و در صورت تغییر با خط مشی‌های موجود نیاز به خرید دوباره نسخه‌های جدید نرم‌افزار خواهد داشت.

هدف این مطالعه طراحی نرم‌افزاری بومی، آسان و کاربرپسند برای کمک به اجرای مطالعات همارزی زیستی بوده و طی آن نرم‌افزار کاملی برای کاربرد در مطالعات همارزی زیستی آماده و با داده‌های راستین آزمون شد. این نرم‌افزار که BioequiWin نامگذاری شده، محیطی ساده و کاربر پسند بوده و بدون درگیر کردن کاربر در محاسبات پیچیده فارماکوکیتیک و آماری نتایج مورد نیاز محقق داروساز را در چارچوب جدول و نمودار از داده‌های خام غلظت خونی برونو آورده و به نمایش می‌گذارد.

مواد و روش‌ها

۱-۲ برنامه‌نویسی: برای تهیه این نرم‌افزار از زبان برنامه‌نویسی نسل سوم شی‌گرای VB نسخه ۱۴ استفاده شد. همه نمودارها توسط Dynaplot و جداول توسط Ms Flexgird طراحی شده‌اند.

این برنامه با سیستم عامل Windows (همه نسخه‌های موجود) اجرا می‌شود. برنامه به صورت بسته‌ای کامل نصب ارائه شده است. این بسته توان زدایش (Uninstall) برنامه را نیز دارد.

۲-۲ محاسبه متغیرهای فارماکوکیتیکی

است و در صورت ثابت ماندن میزان ورود دارو، مهم‌ترین شاخص بررسی سرعت جذب دارو است. زمان رسیدن به حداقل غلظت پلاسمایی دارو (T_{max}) نیز از شاخص‌های اصلی مورد بررسی بوده و بیانگر سرعت جذب دارو بدون در نظر گرفتن میزان ورود آن به جریان خون است (۶-۷).

از دید آماری، در این آزمون‌ها توان $0/8 = \beta$ و خطای نوع اول $\alpha = 0/1$ انتخاب می‌شود (۷). همچنین، در مورد بیشتر داروها نسبت متغیرهای فارماکوکیتیکی در یک فاصله اطمینان (Interval Confidence) برابر با 90 درصد باید حداقل تا میزان 20 درصد \pm اختلاف داشته باشد. به بیانی دیگر متوسط متغیرها بین $8/0$ تا $2/0$ باشد (۱۰-۱۲). اگرچه در مورد برخی داروها به ویژه داروهای با اندکس درمانی کوچک، شاخص سختگیرانه‌تر CI بین $90-110$ درصد در نظر گرفته می‌شود (۹).

محاسبات آماری مربوط به مطالعات هم ارزی زیستی با توجه به تعدد عوامل و نیاز به بررسی آزمون‌های آماری در مورد تک تک عوامل همسان، بسیار پیچیده است. نرم‌افزارهای اینوی براي بررسی آزمون‌های آماری وجود دارد ولی استفاده از نرم‌افزارهای فرآگیر آماری و صفحه گسترده مانند (SPSS, Excel,...) با توجه به پیچیدگی بالا، لزوم ورود فرمول‌های پیچیده محاسبات فارماکوکیتیک با فرمت ویژه نرم‌افزار مربوطه و نیز تکرار آزمون‌ها برای عوامل مختلف و گمانه تفسیر نشدن درست برونداد آزمون‌ها توسط کاربر تازه کار دشوار است.

امروزه تعدادی نرم‌افزار تخصصی برای محاسبات هم ارزی زیستی وجود دارد. حسن این نرم‌افزارها آن است که کاربر نیازی به دانستن چگونگی محاسبات فارماکوکیتیک و آماری ندارد. این نرم‌افزارها تمامی فرمول‌های مربوطه را در خود داشته و در مورد مناسب استفاده می‌کنند؛ بدین ترتیب کاربر بدون این که درگیر چگونگی محاسبه شود می‌تواند با وارد کردن غلظت‌های خونی نتایج را دریافت کند.

نرم‌افزارهای موجود برای مطالعات همارزی زیستی بیشتر به صورت نسخه نمایشی (Demo Version) هستند. در نسخه نمایشی معمولاً کاربر امکان دسترسی به بخش‌های مهم نرم‌افزار را ندارد و شرکت‌های تولیدکننده برای نمایاندن

نتایج

پس از کارگزاری و اجرای برنامه، صفحه‌ای برای گرفتن اطلاعات اولیه مطالعه باز می‌گردد که در آن نام ژنریک دارو، نام‌های تجاری فرآورده‌های آزمون و مرجع، دوز دارو، شکل دارویی، تاریخ ساخت و تاریخ مصرف فرآورده‌های آزمون و مرجع، نام شرکت‌های تولیدکننده فرآورده آزمون و مرجع، شماره بچ فرآورده آزمون و مرجع، تعداد درخواستگران مورد مطالعه، تعداد نمونه‌های گرفته شده از هر یک از آنها، تعداد نقاط مورد استفاده جهت محاسبه شبیه فاز حذف از کاربر گرفته می‌شود. در این صفحه همچنین، امکان انتخاب نخستین بیشینه غلظت نمودار یا بیشترین غلظت موجود، به عنوان امکان دارد(شکل ۱).

C_{max}

(۱) C_{max} و T_{max} به طور مستقیم از داده‌های ورودی استخراج می‌شوند.

(۲) AUC_0^{lqc} به روش ذوزنقه محاسبه می‌شود:

$$AUC_0^{lqc} = \sum_0^n \left(\frac{C_{n-1} + C_n}{2} (t_n + t_{n-1}) \right)$$

$$AUC_{lqc}^{\infty} = \frac{C_{lqc}}{K_{el}} \quad AUC_{lqc}^{\infty} \text{ رابطه محاسبه می‌گردد.} \quad (3)$$

(۴) AUC_0^{∞} حاصل جمع AUC_0^{lqc} و AUC_{lqc}^{∞} است.


(۵) K_{el} قدر مطلق شبیه خط رگرسیون حاصل از بخش

انتهایی نمودار لگاریتم غلظت_زمان است.

$$T_{1/2} = \frac{0.693}{K_{el}} \quad T_{1/2} \text{ با استفاده از فرمول محاسبه می‌گردد.} \quad (6)$$

می‌گردد.

شکل ۱. صفحه ابتدایی ورود به برنامه Bioequiwin جهت دریاف اطلاعات اولیه در مورد داوطلبان و نوع دارو



در مورد دو فرآورده آزمون و مرجع بدین شرح است(جدول ۱)

جدول ۱. متغیرهای فارماکوکیتیک استخراج شده توسط نرم افزار


Reference Parameters	Test Parameters
C_{max}	C_{max}
T_{max}	T_{max}
$T_{1/2}$	$T_{1/2}$
K_{el}	K_{el}
AUC_0^{lqc}	AUC_0^{lqc}
AUC_0^{∞}	AUC_0^{∞}
AUC_{lqc}^{∞}	AUC_{lqc}^{∞}

پس از به پایان رساندن اطلاعات گامه نخست و پذیرش آن، صفحه‌ای برای ورود اطلاعات داوطلبان و داده‌های غلظت پلاسمایی باز می‌شود(شکل ۲). در این صفحه نام دارو در بخش بالا نشان داده شده و قسمتی برای گرفتن اطلاعات مربوط به هر داوطلب مانند جنس، قد، وزن، سن و یک مشخصه اختیاری دیگر (که توسط کاربر می‌تواند افروده شود) وجود دارد. پس از ورود اطلاعات غلظت‌های خونی و با کلیک بر دگمه Analyse متغیرهای فارماکوکیتیک محاسبه و نمودار میانگین غلظت‌ها در برابر زمان و نیز لگاریتم میانگین غلظت در برابر زمان رسم می‌شود. متغیرهای مشخص شده

موجود مانند رنگ، رنگ پس زمینه و غیره را می توان با کلیک بر نمودار مربوطه و فشردن دکمه p تغییر داد(شکل ۲).

در این نمودارها فراورده مرجع به رنگ سبز و فراورده آزمون با رنگ قرمز نشان داده می شود. مشخصات کلیه نمودارهای

شکل ۲. صفحه اصلی برنامه و محاسبات مربوط به پروفایل غلظت خونی




Calculate Truncated AUC گزینه Commands امکان پذیر است.

پس از وارد کردن اطلاعات مربوط به کلیه داوطلبان دکمه Results کشگر می شود. با کلیک بر این دکمه پنجره ارائه اطلاعات جدول بندی شده و آماری داروی مورد مطالعه باز می شود(شکل ۳). در گوشه چپ بالای صفحه منوی Commands وجود دارد که امکان چاپ و بستن صفحه Results را برای کاربر آماده کرده است. این صفحه به دلیل حجم بالای اطلاعات به صورت زبانه دار (Tabbed) طراحی شده است. با کلیک بر هر زبانه صفحه مورد نظر باز شده و اطلاعات مربوط را نمایش می دهد.

در این صفحه واحدهای مربوط به زمان و غلظت برای یادآوری نشان داده شده است ولی امکان تغییر آن تنها در صفحه آغازین موجود است. کل صفحه مربوط به هر داوطلب را با انتخاب گزینه Commands>Print File>Save همچنین، در هر قسمت از کار با انتخاب گزینه as می توان پروژه موجود را در یک فایل اندوخت. فایل اندوخته پسوند (Beq) خواهد است.

با انتخاب گزینه Commands>Change initial data می توان اطلاعات صفحه ابتدایی ورود به برنامه را تغییر داد. توسط این برنامه می توان قسمتی از AUC را برای هر داوطلب محاسبه کرد. این کار با استفاده از منوی

شکل ۳. صفحه نمودارهای استخراج شده از محاسبات فارماکوکنیتیک



افزوده تعیین شدنی، تقسیم‌بندی می‌شود و در مورد مشخصه جنس نسبت مرد به زن و در مورد دیگر مشخصات میانگین تعیین می‌شود(شکل ۴).

زبانه‌های این صفحه به تفکیک، نتایج محاسبات را در چارچوب جداول متعدد نمایش می‌دهد. این جداول شامل موارد زیر است:

جدول دموگرافی داوطلبان: مشخصات دموگرافی داوطلبان بر حسب مشخصات سن-جنس-قد-وزن و یک مشخصه

شکل ۴. صفحه جدول اطلاعات دموگرافیک مطالعه

The screenshot shows a software window titled "Results". At the top, it displays "Time Unit: Hours" and "Concentration Unit: mcg/mL". Below this are four tabs: "Pharmacokinetic Parameters", "Log of Pharmacokinetic Parameters", "Concentration after administration", and "Statistical Comparison". The "Demographic table" tab is currently selected. On the left, there are summary statistics for gender, weight, height, age, and Tsh. On the right, a table lists individual volunteer details: Gender, Age, Weight, Height, and Tsh (mcg). The data for seven volunteers is provided.

Volunteers	Gender	Age	Weight	Height	Tsh (mcg)
1	Male	21	75	180	1
2	Male	25	70	173	2
3	Female	23	55	165	1.3
4	Male	24	89	183	5
5	Female	30	60	173	2.3
6	Male	32	90	184	3
7	Female	26	78	178	1.5

جدول مقایسه پارامترهای فارماکوکیتیک: در این جدول متغیرهای AUC_{Lqc} , AUC_{inf} , C_{max} , T_{max} فراورده آزمون و مرجع در هر یک از داوطلبان در کنار هم قرار گرفته است. همچنین، در مورد متغیرهای C_{max} و AUC نسبت دو متغیر و در مورد متغیر T_{max} تفاصل دو متغیر محاسبه می‌گردد. همچنین، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات هر یک از متغیرها به طور جداگانه محاسبه می‌گردد(شکل ۵).

متغیرهای فارماکوکیتیک برای هر داوطلب: در این صفحه نتایج محاسبات فارماکوکیتیک در مورد هر داوطلب بصورت جداگانه برای فراورده آزمون و مرجع مشخص می‌گردد. متغیرهای بیان شده عبارتند از: AUC_{inf} , C_{max} , T_{max} و AUC_{Lqc} . همچنین، میانگین انحراف معیار استاندارد و ضریب تغییرات هر متغیر نیز مشخص می‌گردد.

شکل ۵. صفحه متغیرهای فارماکوکیتیک محاسبه شده

The screenshot shows a software window with tabs for "Graphs", "Demographic table", "Parameters of each volunteer", "Pharmacokinetic Parameters", "Log of Pharmacokinetic Parameters", "Concentration after administration", and "Statistical Comparison". The "Pharmacokinetic Parameters" tab is selected. It displays a table of pharmacokinetic parameters for Test and Reference products across various volunteers. The parameters include AUC_{Lqc} , AUC_{inf} , C_{max} , and T_{max} .

	Pharmacokinetic parameters of Test and Ref. products											
	AUC_{Lqc}			AUC_{inf}			C_{max}			T_{max}		
	T	R	F	T	R	F	T	R	F	T	R	Dif
1	430.5	457	0.9	431.2	457.4	0.9	117	120	1	3	3	0
2	432.3	458.7	0.9	432.6	458.9	0.9	122	128	1	2	2	0
3	631.9	621.5	1	632	621.6	1	163	156	1	2	2	0
4	571.5	577.1	1	571.6	577.2	1	153	150	1	2	2	0
5	568.9	592.2	1	569	592.3	1	145	163	0.9	2	2	0
6	531.1	501.4	1.1	537.2	501.8	1.1	115	120	1	3	2	1
7	347.2	400.3	0.9	352.4	403.4	0.9	101	122	0.8	2	2	0
Mean	501.9	515.5	1	503.7	516.1	1	130.9	137	1	2.3	2.1	0.1
SD	142.6	116.9	0.1	141	115.9	0.1	32.3	26.4	0.1	0.7	0.5	0.4
CV %	30	20	10	30	20	10	20	20	10	30	20	280

غلظت‌های خونی: در این صفحه در دو جدول جدأگانه هر یک از غلظت‌های خونی دیده شده در هر نوبت از نمونه‌گیری در مورد هر یک از داوطلبان برای فراورده‌های آزمون و مرجع نشانزد می‌شود. همچنین، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات غلظت‌های خونی در هر زمان نمونه‌گیری معین می‌گردد(شکل ۶).

لگاریتم متغیرهای فارماکوکنیتیک: در این جدول متغیرهای AUC_{Lqc} , C_{max} , T_{max} برای هر دو فراورده آزمون و مرجع به صورت لگاریتمی محاسبه می‌گردد. سایر مشخصات این صفحه مانند صفحه پیشین است.

شکل ۶. غلظت‌های خونی بدست آمده از نمونه‌گیری

Graphs		Demographic table		Parameters of each volunteer			
Pharmacokinetic Parameters		Log of Pharmacokinetic Parameters		Concentration after administration		Statistical Comparision	
Concentraion after administration of test product		Sampling time (Hours) / Concentration (mcg/mL)		Concentration after administraion of Ref. product		Sampling time (Hours) / Concentration (mcg/mL)	
1	10	56	117	101	83	1	12
2	43	122	97.3	70	55	2	45
3	79	163	125.3	98.2	83.2	3	78
4	26	153	118.3	97.8	76.2	4	24
5	55	145	108	90	82.5	5	45
6	43.2	100	115	100	89.1	6	45
7	36	101	83.2	70.21	40	7	48
Mean	41.7	120	109.2	89.6	72.7	Mean	42.4
SD	21.8	43.4	45.7	47.7	51.1	SD	20.7
CV %	50	40	40	50	70	CV %	50


CI با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردیده است:

$$CI = Mean \pm t_{n-1,\alpha} \left(\frac{SD}{\sqrt{n}} \right)$$

در این صفحه در جدول دیگری این متغیرهای آماری برای لگاریتم C_{max} , AUC_{Lqc} , AUC_{inf} و T_{max} نیز مشخص می‌گردد.

محاسبات آماری: در این صفحه برای هر یک از متغیرهای AUC_{Lqc} , AUC_{inf} , C_{max} , T_{max} میانگین_انحراف معیار، P_{value} و همچنین محدوده اطمینان[Confidence Interval] درصد محاسبه می‌گردد (شکل ۷).

شکل ۷. نتایج مربوط به محاسبات آماری



بحث و نتیجه‌گیری

ACSL Biomed نیز نرم افزاری حجمی، پیچیده و بسیار گران است. این برنامه توسط شرکت Pharmacia & Upjohn طراحی گردیده و هدف اصلی آن شبیه سازی کارآزمایی‌های بالینی است. این نرم افزار همچنین، امکانات نسبتاً گسترده‌ای در مورد مطالعات همارزی زیستی دارد. این نرم افزار در اینترنت موجود نبوده و باید یکراست از شرکت مربوطه خریداری شود(۱۵).

NONMEM به عنوان پروژه‌ای در دانشگاه کالیفرنیا و با استفاده از زبان فورترن طراحی گردیده است. جهت استفاده از این نرم افزار وجود همگردان کننده (کامپایلر) زبان فورترن لازم است. با توجه به دیرینه بودن این زبان امکانات گرافیکی آن کم بوده و فقط تحت سیستم عامل DOS اجرا می‌گردد. این نرم افزار برروی اینترنت موجود نبوده و باید مستقیماً از شرکت تهیه کننده آن (Globo Max LLC) تهیه گردد(۱۶). نرم افزار NONLIN Win نیز یکی از نرم افزارهای متداول جهت مطالعات فارماکوکیتیک و همارزی زیستی می‌باشد. این نرم افزار امکان آنالیز غیرکمپارتمانی را نیز مهیا می‌کند. مهم‌ترین حسن این نرم افزار آموزش و کمک نسبتاً کامل برخط است این نرم افزار امکان ارائه داده‌ها به صورت عددی و نموداری و همچنین چاپ اطلاعات را دارد(۱۷و۱۸).

نرم افزار Kinetica نیز یکی از نرم افزارهای متداول در زمینه مطالعات فارماکوکیتیک_فارماکودینامیک می‌باشد. این نرم افزار از مدل غیرکمپارتمانی استفاده می‌کند و امکانات نسبتاً کاملی در زمینه محاسبات آماری و همچنین نمودارهای گرافیکی دارد. نسخه نمایشی این نرم افزار مستقیماً از طریق سایت شرکت تولیدکننده قابل تهیه می‌باشد(۱۹و۲۰).

نرم افزار PK for R توسط دو محقق مستقل ولفسگر و جکی جهت مطالعات فارماکوکیتیک_هم ارزی زیستی طراحی گردیده است. این نرم افزار کتابخانه نسبتاً کاملی جهت محاسبات مربوط به این مطالعات ارائه می‌کند و برای این نوع مطالعات بسیار کاربردی می‌باشد. این نرم افزار بعنوان افزونه‌ای برای محیط آماری R طراحی گردیده و جهت اجرا نیاز به این محیط و آشنایی با زبان برنامه نویسی مربوطه می‌باشد(۱۲).

Pksolver نیز افزونه‌ای جهت مطالعات همارزی زیستی و فارماکوکیتیک می‌باشد. این افزونه برروی نرم افزار اکسل

مطالعات همارزی زیستی مانند مطالعات کاربردی بسیار متداول در گستره علوم دارویی هستند. افزون بر مشکلاتی مانند مدیریت درست مطالعه، چالش‌های اخلاقی کار با نمونه‌های انسانی و غیره، محاسبات پیچیده بیوفارماسیوتیکال از مهم‌ترین چالش‌ها در اجرا و تفسیر نتایج این نوع مطالعات هستند(۱۰).

پژوهشگران این رشته راههای متفاوتی برای چیرگی بر این چالش بکار بسته‌اند. در گذشته این محاسبات به صورت دستی انجام می‌شد که افزون بر دشواری کار گمانه اشتباه در خور نگرش انسانی در محاسبات بسیار بالا بود. در حال حاضر عموماً از نرم افزارهای عمومی آماری نظری SPSS جهت تفسیر نتایج این مطالعات استفاده می‌شود(۱۱).

گرچه این نرم افزارها به علت گستره عملکرد و درستی نتایج از اقبال محققین بر خوردارند، پیچیدگی بالا و اختصاصی نبودن آنها جهت این نوع از مطالعات و لزوم آموزش کامل نرم افزار و نیز چیره‌دستی بر تحلیل‌های آماری، فرایند استفاده از این نرم افزارها را ناکارآمد می‌کند(۱۲).

همچنین، با توجه به این که قسمت عمده‌ای از محاسبات مقایسه‌ای روی عوامل فارماکوکیتیکی (و نه داده‌های خام) انجام می‌شوند، فرمول‌های کمایش پیچیده فارماکوکیتیک باید به فرمت این نرم افزار (و یا نرم افزارهای مشابه) تبدیل شوند که این امر نیز مشکل بوده و احتمال اشتباه را هم بالا می‌برند(۱۳).

جهت رفع این مشکل، تعدادی نرم افزار اختصاصی ارائه گردیده است. نرم افزار Equiv Test یکی از نرم افزارهای موجود جهت ارزی مطالعات همارزی زیستی است. این برنامه زیر سیستم عامل ویندوز اجرا می‌گردد و متغیرهای فارماکوکیتیکی مانند T_{max} , C_{max} , AUC به صورت عددی بیان گردیده و غاظت‌های خونی به صورت نمودار مشخص می‌گردد. در این برنامه امکان محاسبه محدوده اطمینان به کمک آزمون‌های یک طرفه و دو طرفه موجود است. این نرم افزار را به نرخ ۸۰۰ دلار از وبسایت این شرکت می‌توان آماده کرد(۱۴).

ویندوز نصب و اجرا می شود و پس از ورود به محیط نرم افزار، محیطی ساده و کاربر پسند دارد.

پس از اجرا، کاربر بدون درگیر شدن با محاسبات پیچیده و تنها با ورود کمینه اطلاعات می تواند به محاسبات مربوطه پرداخته و نتایج حاصله را به صورت گراف و جداول استاندارد دیده و چاپ کند.

همچنین، به دلیل سادگی، محیط این نرم افزار می تواند به عنوان ابزاری کمک آموزشی در آموزش اصول فارماکوکیتیک به دانشجویان بکار برده شود.

این نرم افزار جهت اجرا به هیچ نرم افزار ثانوی نیاز نداشته و به صورت بسته ای کامل نصب و حذف ارائه شده و با کلیه نسخه های ویندوز موجود هماهنگ است. نویسنده اگان اعلام می دارند که هیچ گونه تضاد منافعی ندارند.

نصب می گردد و عملگرهای مربوط به محاسبات فارماکوکیتیک را بر آن می افزاید. با توجه به ناتوانی اکسل در عملگرهای آماری جهت تکمیل محاسبات، خروجی محاسبات فارماکوکیتیک باید توسط نرم افزارهای آماری دیگر پردازش گردد که کارایی نرم افزار را در تنگنا می گذارد(۱۳). همچنین، با بازنگری مقالات چاپ شده در این زمینه به تعدادی نرم افزار برمی خوریم که در پروژه های دانشگاهی_تحقیقاتی طراحی گردیده اند ولی طراحان به دلایل نامعلومی از تهیه نسخه تجاری و ارائه آن به مراکز دیگر خودداری کرده اند(۲۱-۳۲).

نرم افزار BioequiWin که نام آن اختصاری از Bioequivalence for Windows است به آسانی در محیط

منابع

- Shargel L, Yu A. Applied Biopharmaceutics and pharmacokinetics. 7th Edition. Mc Graw Hill.2015: 453-798.
- FDA Guidance for industry: Bioavailability and Bioequivalence studies for orally administered Drug products. March 2003. Available From URL: http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/03/briefing/3995_B1_07_GFI-BioAvail-BioEquiv.pdf
- Michael E. Burton . Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Principles of Therapeutic Drug Monitoring. 4th Edition, LWW; 2005: 158-176
- Leon Shargel, Isadore Kanfer. Generic Drug Product Development: Solid Oral Dosage Forms, Second edition, CRC Press; 2013: 11-27
- Sarfaraz K. Niazi. Handbook of Bioequivalence Testing, Second Edition. CRC Press; 2014: 70-72.
- Endrenyi L, Tothfalusi L. Truncated AUC evaluates effectively the bioequivalence of drugs with long half lives. Int J Clin Pharmacol Ther 1997; 35: 142-150.
- Bolton S, Bon C. Pharmaceutical Statistics. 5th Edition. New York: CRC Press; 2009; 393-473.
- Banker GS. Modern Pharmaceutics. 4th Edition .New York: CRC Press; 1996; 751-766.
- Burns M. Management of narrow therapeutic index drugs. J Thromb Thrombolysis.1999; 7: 137-143.
- Benet LZ, Goyan JE. Bioequivalence and narrow therapeutic range drugs. Pharmacotherapy.1995;15: 433-440.
- el-Tahtawy AA, et al. Evaluation of bioequivalence of highly variable drugs. Pharm Res.1998; 15: 98-104.
- Jaki T, Wolfsegger MJ. Estimation of pharmacokinetic parameters with the R package PK. Pharmaceutical Statistics 2011; 10 284–288.
- Zhang Y, Huo M, Zhou J, Xie S. PKSolver: An add-in program for pharmacokinetic and pharmacodynamic data analysis in Microsoft Excel. Comput Methods Programs Biomed. 2010; 99: 306-314.
- Equiv TestSoftware description , Available From:URL: <https://www.statcon.de/shop/en/software/statistics/equiv-test>
- Kimko H, Duffull SB. Simulation for Designing Clinical Trials: A Pharmacokinetic-Pharmacodynamic modeling perspective. New York: CRC Press; 2004: 212-230
- Combrink M, McFadyen ML, Miller R. A comparison of the standard approach and the NONMEM approach in the estimation of bioavailability in man. J Pharm Pharmacol 1997; 49: 731-733.
- Heatherington AC, Vicini P, Golde H. A pharmacokinetic/pharmacodynamic comparison of SAAM II and PC/Win Nonlin modeling software. J Pharm Sci. 1998; 87: 1255-1263.
- Shen J, Li S, Bowsher RR, Vick A. Using DTA and DTAARRAY variables and programming in WinNonlin ASCII models to streamline user-defined calculation and data analysis. AAPS J. 2015; 17: 474-478.
- Kinetica software description, Available FromURL: www.thermofisher.com/order/catalog/product/INF-24000
- Morales-Alcelay S, de la Torre de Alvarado JM, García-Arieta A. On the Incorrect Statistical Calculations of the Kinetica Software Package in Imbalanced Designs. AAPS J. 2015; 17: 1033-1034 .

21. Hyslop T, Hsuan F, Holder DJ. A small sample confidence interval approach to assess individual bioequivalence. *Stat Med*. 2000; 19: 2885-2897.
22. Abdallah HY, Ludden TM. A spreadsheet program for simulation of bioequivalence and bioavailability studies. *Comput Biol Med*. 1995; 25: 349-354.
23. Meineke I, de Mey C .The assessment of bioequivalence in a two-period cross-over design: development of a simple BASIC program. *Comput Methods Programs Biomed*. 1991; 35: 151-153.
24. Durisova M, Trnovec T. BEQUIV interactive microcomputer program for testing equivalence in two-group comparative bioavailability trials. *Methods Find Exp Clin Pharmacol*. 1988; 10: 129-133.
25. Wijnand HP, Timmer CJ. Mini-computer programs for bioequivalence testing of pharmaceutical drug formulations in two-way cross-over studies. Including a survey of current parametric evaluation techniques. *Comput Programs Biomed*. 1983; 17: 73-88.
26. Kaufmann B. KINPAK--a program for standardized pharmacokinetic analysis. *Methods Find Exp Clin Pharmacol*. 1986; 8: 615-624.
27. Bianchi E, Segre G. A program in BASIC for calculating randomization tests. *Comput Methods Programs Biomed*. 1989; 30: 305-306.
28. Franck KR, Bertino Jr JS. KINI: a one compartment intravenous pharmacokinetic analysis program. *Comput Methods Programs Biomed*. 1994; 42: 157-165.
29. Walton R, Dovey S, Harvey E, Freemantle N. Computer support for determining drug dose: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 1999; 318: 984-990.
30. Kowalski KG .An algorithm for estimating the terminal half-life in pharmacokinetic studies. *Comput Methods Programs Biomed*. 1994; 42: 119-126.
31. Tod M, Aouimer A, Petitjean O. Estimation of pharmacokinetic parameters by orthogonal regression: comparison of four algorithms. *Comput Methods Programs Biomed*. 2002; 67: 13-26.
32. Ritschel WA. AUC-RPP: BASIC computer program for compartment model independent pharmacokinetic analysis. *Methods Find Exp Clin Pharmacol*. 1986; 8: 633-640.

Bioequiwin: Design of a Bioequivalence Software

*Aboutaleb E (PhD)¹- Manoochehri S (PhD)¹

***Corresponding Address:** Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Guilani University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

Email: e_aboutaleb@gums.ac.ir

Received: 07/Mar/2018 Revised: 17/Jun/2018 Accepted: 09/Oct/2018

Abstract

Introduction: Bioequivalence studies are the most important way of evaluating the quality and efficacy of pharmaceutical formulations. In a bioequivalence study, the rate and extent of drug absorption into the general circulation is measured and the pharmacokinetic parameters should be calculated and statistically evaluated for the reference and test products. Pharmacokinetic parameters such as Cmax, Tmax, AUC, and K_{el} are the principles to determine the rate extent of drug entry into the bloodstream, which are achieved from complex calculations over the initial blood concentrations. Complex pharmacokinetic and statistical calculations parameters from these studies are the most important challenges in these types of studies which leads to an interpretation of the wrong results. In the present study, a software was designed for this type of calculations. The user interface is easy for researchers and may be used without engaging the operator in pharmacokinetic and statistical processes.

Objective: Design a domestic, easy and user-friendly software to help implement bioequivalence studies.

Materials and Methods: Microsoft Visual Basic 14 was utilized in order to create the software and its main scientific reference guide was the FDA Guidance for Industry for Bioavailability and Bioequivalence Studies.

Conclusion: The present software can be used as a complete package for bioequivalence studies.

Conflict of interest: non declared

Key words: Bioequiwin\ Software\ Bioequivalence

Journal of Guilani University of Medical Sciences, No: 108, Pages: 35-44

Please cite this article as: Aboutaleb E, Manoochehri S. Bioequiwin: Design of a Bioequivalence Software. J of Guilani University of Med Sci 2019; 27(108):35-44. [Text in Persian]