

Review Paper

Effectiveness of Reishi (*Ganoderma lucidum*) in Preventing the Aging Process: A Review Study



*Sharareh Rezaeian¹ , Hamid Reza Pourianfar¹

1. Department of Industrial Fungi Biotechnology Research, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Khorasan Razavi Branch, Mashhad, Iran.



Citation Rezaeian S, Pourianfar HR. Effectiveness of Reishi (*Ganoderma lucidum*) in Preventing the Aging Process: A Review Study. *Journal of Guilan University of Medical Sciences*. 2023; 32(3):166-183. <https://doi.org/10.32598/JGUMS.32.3.2068.1>

doi <https://doi.org/10.32598/JGUMS.32.3.2068.1>



Received: 23 Nov 2022

Accepted: 30 Jan 2023

Available Online: 01 Oct 2023

Keywords:

Reishi, *Ganoderma lucidum*, Anti-aging, Immunomodulation, Antioxidant

ABSTRACT

Background Reishi (*Ganoderma lucidum*) is a mushroom that has been used in Asian countries for many years as a culinary-medicinal mushroom to treat a variety of diseases.

Objective This study aims to review the studies conducted on the anti-aging effects of Reishi.

Methods This is a review study. A search was conducted in Scopus, PubMed, Google Scholar, SID, and MagIran databases for articles published from 1989 to 2023 using the following keywords: Reishi mushroom, *G. lucidum*, anti-aging, antioxidant activities, free radicals,

Results The studies showed that the extracts of Reishi have measurable anti-aging properties, especially in the heart, liver and brain tissues. The anti-aging activity of Reishi is mainly due to its ability to modulate the immune system, scavenge free radicals, inhibit oxidative stress, increase mitochondrial dehydrogenases, strengthen the electron transport chain, and prevent neurodegenerative diseases caused by oxidative stress. Bioactive compounds, such as polysaccharides and triterpenes, have been suggested to be involved in the anti-aging activity of Reishi.

Conclusion Reishi is a suitable candidate for preparing extracts or compounds with anti-aging properties. However, more in-vivo studies are needed to gain deeper insight into the mechanisms underlying the anti-aging effects of Reishi. In addition, there is a lack of clinical trials in the field of anti-aging effects of Reishi extracts, especially in Iran.

* **Corresponding Author:**

Sharareh Rezaeian

Address: Department of Industrial Fungi Biotechnology Research, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Khorasan Razavi Branch, Mashhad, Iran.

Tel: +98 (51) 31997438

E-Mail: sharare.rezaeian@yhao.com



Copyright © 2023 Guilan University of Medical Sciences. Published by Guilan University of Medical Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).
Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

Introduction

G*anoderma lucidum* (Curtis) P. Karst (commonly known as Reishi) is a medicinal mushroom belonging to the Agaricomycetes class, Polyporales order, and the Ganodermataceae family. Reishi is best known for boosting the immune system and being extremely important in treating and preventing many diseases. This mushroom has been used for medicinal and therapeutic purposes for many years in Asian countries. Research in the field of modern food chemistry has discovered about 400 bioactive compounds from the groups of polyphenols, polysaccharides, steroids, triterpenoids, nucleotides, amino acids, nutritious minerals, trace elements, and various vitamins in fruits (sporophores), mycelia, and spores of reishi [1]. Some of these bioactive compounds, including polysaccharides, triterpenes, and peptides, have anti-aging properties. Previous studies have paid their most attention to ethanol and aqueous extracts of fruiting bodies, mycelium extracts, and spore extracts of reishi to study their anti-aging effects [2]. This study aims to review the anti-aging effects of reishi and its possible mechanisms at the cellular and molecular level.

Methods

This is a review study. Relevant articles in Persian or English published from 1989 to 2023 were searched in databases such as PubMed, Scopus, Google Scholar, SID, and Magiran using the following keywords: Reishi, *G. lucidum*, anti-aging properties, antioxidant properties, free radicals, and neurodegenerative diseases/disorders. Emphasis was placed on selecting original research articles rather than review studies.

Results

Aging has been shown to be one of the most important risk factors for impaired immune system. With aging, the efficiency of T lymphocytes and their ability to produce cytokines decrease, leading to a decrease in the thymus. This problem is the main cause of weakened immunity in the elderly. With aging, the bone marrow's ability to regulate the function of B lymphocytes and the ability of these lymphocytes to secrete immunoglobulins also decreases. In-vitro and in-vivo studies have shown the effectiveness of Reishi in improving the cognitive function and oxidative stress response, and increasing immune activity [3]. Evidence showed that the extracts of Reishi can protect the heart, liver and brain of normal mice against aging, mainly due to their antioxidant nature.

Aging and subsequent changes are also important risk factors for common neurocognitive or neurodegenerative disorders such as mild cognitive impairment, Alzheimer's disease, cerebrovascular disease, and Parkinson's disease. *G. lucidum* polysaccharides are one of the promising compounds for the treatment of neurodegenerative diseases [4]. In fact, the effect of *G. lucidum* extracts or compounds on treating or preventing neurodegenerative diseases is directly related to the prevention of aging process. According to studies, Reishi avoids the activation of the core protein kappa B (NF- κ B), preventing endotoxin from binding to its cellular receptor TLR4 and initiating inflammatory pathways [5]. Reishi's extracts have also been shown to reduce the expression of a set of genes associated with Alzheimer's and Parkinson's disease in mice's microglial cells stimulated with bacterial endotoxin [6]. However, there are still limited animal studies on the effectiveness of Reishi extract in preventing brain tissue damage and preventing neurodegenerative diseases.

One concern with Reishi and other herbal compounds is their unknown adverse effects on normal cells and possible interference with chemotherapeutic drugs. In this regard, one of the interesting assumptions is that the anti-aging and anti-cancer properties of *G. lucidum* compounds are applied by protecting rather than damaging cellular DNA, while chemotherapeutic drugs work by damaging cellular DNA [7].

Conclusion

In summary, this review study showed that various extracts of Reishi or *G. lucidum* have measurable anti-aging properties, especially in three tissues: Heart, liver and brain. These effects are primarily attributed to modulation of the immune system, antioxidant activity and free radicals scavenging, the increase of mitochondrial dehydrogenases, and the prevention of oxidative stress-induced neurodegeneration. However, still more clinical trials on human models are needed to fully explain the mechanisms underlying the anti-aging properties of Reishi.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

In this study, no experiments were conducted on animal or human models. In this regard, no ethical considerations were needed.

Funding

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Authors' contributions

Data collection and search in databases: Sharareh Rezaeian; Writing and editing: Hamid Reza Pourianfar; Final approval: The both authors.

Conflicts of interest

The authors declared no conflict of interest.



مقاله مروری

مروری بر اثرات قارچ ری شی (گانودرما لوسیدوم) در پیشگیری از پیشرفت فرایند پیری

*شراره رضائیان^۱، حمیدرضا پوریانفر^۱

۱. گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی، سازمان جهاد دانشگاهی، خراسان رضوی، مشهد، ایران.



Citation Rezaeian S, Pourianfar HR. Effectiveness of Reishi (*Ganoderma lucidum*) in Preventing the Aging Process: A Review Study. *Journal of Guilan University of Medical Sciences*. 2023; 32(3):166-183. <https://doi.org/10.32598/JGUMS.32.3.2068.1>

doi <https://doi.org/10.32598/JGUMS.32.3.2068.1>

چکیده

تاریخ دریافت: ۰۲ آذر ۱۴۰۱

تاریخ پذیرش: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۲

زمینه: قارچ ری شی با نام علمی گانودرما لوسیدوم یک قارچ چتری است که با قدمتی بیش از چند هزار سال به عنوان یک قارچ خوراکی - دارویی برای درمان بیماری های مختلف در کشورهای آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف: این مطالعه با هدف مرور پژوهش های انجام گرفته در زمینه اثرات ضدپیری قارچ ری شی انجام شد.

روش ها: این یک مطالعه مروری است. کلیدواژه های قارچ ری شی، گانودرما لوسیدوم، خواص ضدپیری، خواص آنتی اکسیدانی و رادیکال های آزاد به فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی پابمد، اسکوپوس، گوگل اسکولار، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و مگایران در محدوده سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۳ جست و جو شد.

یافته ها: پژوهش های انجام شده تا به امروز حاکی از آن هستند که عصاره های پدست آمده از قارچ ری شی دارای خواص ضدپیری قابل اندازه گیری به ویژه در بافت های قلبی، کبدی و مغزی هستند. این اثرات عمدتاً از طریق تنظیم سیستم ایمنی، مقابله با اکسیداسیون، به دام انداختن رادیکال های آزاد، افزایش دهیدرونازهای میتوکندری، تقویت عناصر مجموعه های ۱ و ۲ زنجیره انتقال الکترون و پیشگیری از تحلیل عصبی ناشی از تنش اکسیداتیو اعمال می شوند. حضور مولکول های فعال زیستی در این قارچ به ویژه پلی ساکاریدها و تری ترپن ها اهمیت این قارچ را در تحقیقات مرتبط با پیری پررنگ کرده است.

نتیجه گیری: قارچ ری شی یک کاندیدای مناسب جهت تهیه عصاره ها یا ترکیبات با خواص ضدپیری است. اما شناخت مکانیسم های توجیه کننده اثرات ضدپیری قارچ ری شی هنوز نیازمند پژوهش های پایه و درون تنی بیشتری است. همچنین جای خالی کارآزمایی های بالینی در زمینه اثرات ضدپیری عصاره های قارچ ری شی به ویژه در کشور ما وجود دارد.

کلیدواژه ها:

ری شی، گانودرما لوسیدوم، خواص ضدپیری، تعدیل سیستم ایمنی، خواص آنتی اکسیدانی

* نویسنده مسئول:

شراره رضائیان

نشانی: مشهد، خراسان رضوی، سازمان جهاد دانشگاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی، گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی.

تلفن: ۳۱۹۹۷۴۳۸ (۵۱) +۹۸

رایانامه: sharare.rezaeian@yahoo.com



Copyright © 2023 Guilan University of Medical Sciences. Published by Guilan University of Medical Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).
Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.

مقدمه

پارکینسون، آلزایمر و بیماری هانتینگتون می‌شود. علاوه بر استرس اکسیداتیو، پیری همچنین با ایجاد نقص‌های ساختاری و عملکردی در سیستم ایمنی ارتباط نزدیکی دارد. اختلال عملکرد ایمنی می‌تواند علت افزایش حساسیت جمعیت سالمند به عفونت‌های باکتریایی و ویروسی باشد که معمولاً در افراد مسن دیده می‌شود [۷].

اگرچه قارچ ری‌شی هزاران سال است که به‌عنوان یک اکسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما ادعای اثرات ضدپیری و افزایش طول عمر مرتبط با قارچ ری‌شی تنها نوک کوه یخ است. بنابراین اینکه آیا قارچ ری‌شی واقعاً طی مکانیسم‌های مشخصی اثرات ضدپیری دارد یا نه، سؤال است که تحقیقات متعدد تلاش کرده‌اند که به آن پاسخ روشنی بدهند. از سوی دیگر، تحقیقات متعدد قبلی نشان از وجود و تأیید چندین گونه از قارچ جنس گانودرما و از جمله ری‌شی (گانودرما لوسیدوم) در محیط طبیعی ایران دارد [۸، ۹]. علی‌رغم مطالعات متعدد بر روی جنبه‌های مختلف دارویی این قارچ در کشور ما [۱۰]، در زمینه اثرات ضدپیری این قارچ به‌ویژه انواع بومی آن هنوز مطالعه تحقیقاتی آزمایشگاهی، حیوانی یا بالینی به زبان فارسی منتشر نشده است. همچنان که مطالعات قبلی نویسندگان این مقاله نشان داده است، اثرات آنتی‌اکسیدانی قارچ‌های دارویی بومی ایران در مقایسه با انواع تجاری آن بسیار قابل توجه است [۱۱]. بنابراین قارچ‌های بومی ایرانی جنس گانودرما و به‌خصوص قارچ ری‌شی (گانودرما لوسیدوم) می‌تواند در زمینه اثرات ضدپیری آن مورد مطالعه قرار گیرد. از این‌رو هدف این مقاله مروری آن است که از یک‌سو زمینه را برای روشن کردن کامل مکانیسم‌های بالقوه قارچ ری‌شی در زمینه اثرات ضدپیری آن به منظور ترویج کاربرد بالینی آن به‌عنوان یک داروی طبیعی ضدپیری فراهم کند. از سوی دیگر، مقاله مروری حاضر ممکن است در زمینه گشودن پنجره‌های جدیدی در زمینه تشویق به تحقیقات آزمایشگاهی، حیوانی یا بالینی بر روی اثرات ضدپیری قارچ ری‌شی به‌ویژه انواع بومی آن برای پژوهشگران داخل کشور مفید باشد.

روش‌ها

در نگارش این مقاله مروری، اثرات ضدپیری قارچ ری‌شی و مکانیسم این اثرات بررسی شد. جست‌وجوی مقالات چاپ‌شده در محدوده زمانی سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۳ با استفاده از کلیدواژه‌های قارچ ری‌شی، گانودرما لوسیدوم، خواص ضدپیری، خواص آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌های آزاد به هر دو زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه‌های اطلاعاتی پاب‌مد، اسکوپوس، گوگل اسکولار، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و مگ‌ایران به‌صورت مجزا و ترکیبی انجام شد. در میان مقالات یافت‌شده، تلاش شد تا بیشتر آن‌هایی مورد استناد قرار گیرند که کار تحقیقاتی کرده باشند و نه اینکه خود مقاله مروری باشند. همچنین تلاش شد تا از مطالعات مرتبط داخل کشور تا جایی که به موضوع مرتبط باشد، استفاده شود.

قارچ چتری (کلاهک‌دار) ری‌شی (که به تسامح و البته غیردقیق در زبان فارسی گانودرما نامیده می‌شود) با نام علمی گانودرما لوسیدوم^۱ و نام‌های انگلیسی ری‌شی (برخاسته از ژاپن) یا لینگزئی (برخاسته از چین)، یک گونه متعلق به رده آگاریکومیست‌ها^۲ و راسته قارچ‌های حفره‌دار (متخلخل)^۳ و از خانواده گانودرماتاسه^۴ است. تحقیقات در حوزه شیمی غذایی تا کنون وجود حدوداً ۴۰۰ ترکیب زیست‌فعال از گروه‌های پلی‌فنول‌ها، پلی‌ساکاریدها، استروئیدها، تری‌ترپنوئیدها، نوکلئوتیدها، اسیدهای آمینه، مواد معدنی، عناصر کمیاب و انواع ویتامین‌ها را در اندام میوه‌دهی، میسلیم و اسپورهای قارچ ری‌شی به اثبات رسانده است [۱]. مکمل‌یاری با قارچ گانودرما لوسیدوم در بیشتر موارد به کاهش قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و کاهش مقاومت به انسولین در دیابت ملیتوس میانجامد که ناشی از ترکیبات مؤثره این قارچ شامل پلی‌ساکاریدهای استخراج‌شده، نوع پروتئین‌ها و تری‌ترپنوئیدهای موجود در آن است. همچنین به نظر می‌رسد خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی آن نیز بتواند از عوارض دیابت بکاهد [۲]. برخی از این ترکیبات زیست‌فعال از جمله پلی‌ساکاریدها، تری‌ترین‌ها و پپتیدها دارای عملکرد ضدپیری هستند. عصاره اتانولی و عصاره آبی میوه قارچ، عصاره میسلیم و عصاره اسپورهای (گانودرماسیت‌های C، B، A و D) قارچ ری‌شی بیشترین محل توجه محققین برای بررسی عملکردهای ضدپیری مرتبط با قارچ ری‌شی بوده‌اند [۳].

افزایش سن تقریباً همیشه با کاهش عملکرد فیزیولوژیکی بدن و به‌دنبال آن، افزایش برخی اختلالات همراه است. در میان تئوری‌های متعدد مرتبط با پیری، نظریه‌های استرس اکسیداتیو و تجمع رادیکال‌های آزاد بیش از همه برجسته هستند. سیستم آنتی‌اکسیدانی به‌عنوان تابعی از سن عمل می‌کند و با افزایش سن ضعیف‌تر می‌شود. ضعف این سیستم موجب ایجاد اختلال در تعادل بین تولید و حذف گونه‌های فعال اکسیژن^۵ و سایر رادیکال‌های آزاد می‌شود که در نهایت به آسیب سلولی اکسیداتیو منجر می‌شود [۴]. اندام‌ها و بافت‌هایی مانند مغز، قلب و ماهیچه‌های اسکلتی در مقایسه با سایر اندام‌ها بیشتر مستعد پیری هستند [۵]. انقباض قلب به فسفوریلاسیون اکسیداتیو و زنجیره انتقال الکترون میتوکندری وابسته است، بنابراین تجمع رادیکال‌های آزاد و اختلال عملکرد میتوکندری، به تغییرات ساختاری و عملکردی در ماهیچه قلب و در نتیجه به پیری قلب منجر می‌شود [۶]. در مغز نیز تجمع رادیکال‌های آزاد و تضعیف فعالیت آنزیم زنجیره تنفسی باعث آسیب به میتوکندری‌های مغزی شده و باعث شروع برخی بیماری‌های تخریب‌کننده عصبی مانند

1. *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst.
2. Agaricomycetes
3. Polyporales
4. Ganodermataceae
5. Reactive oxygen species (ROS)

یافته‌ها

اثر ضدپیری قارچ ری‌شی با بهبود عملکرد سیستم ایمنی

طبیعی برساند [۱۳]. در تحقیق دیگری این نکته بررسی شد که آیا پلی‌ساکارید قارچ گانودرما آتروم^۷ (گونه دیگری از جنس گانودرما)^۸ می‌تواند تنش اکسیداسیون دی‌گالاکتوز و اختلال عملکرد سیستم ایمنی را در موش‌های معمولی در حال پیری شدن، تضعیف کند. یافته‌های این تحقیق نشان داد این پلی‌ساکارید در غلظت ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم توانست موجب کاهش معنی‌دار پراکسیداسیون چربی در کبد، مغز و طحال و افزایش قابل توجه فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوکاتایون پراکسیداز شود (در مقایسه با گروه آسیب‌دیده در اثر دی‌گالاکتوز). بالارفتن محتوای گلوکاتایون و پایین آمدن مقدار گلوکاتایون دی‌سولفید نیز در جانوران تیمار شده با این پلی‌ساکارید مشاهده شد. به علاوه، تیمار با PSG-1، تکثیر لنفوسیت‌های اولیه و تمایز نیافته، تکثیر لنفوسیت‌های T و B و تولید اینترلوکین-۲ را زیاد کرد. در مجموع، PSG-1 می‌تواند عامل بالقوه جدیدی برای ارتقای سلامتی و بهبود آسیب‌های دوران پیری باشد و حداقل تا حدودی این کار را از طریق اصلاح مجموعه اکسیداسیون - احیا و بهبود عملکرد سیستم ایمنی انجام می‌دهد [۱۴].

علاوه بر بررسی قارچ ری‌شی به‌تنهایی، عصاره آن همراه با عصاره‌های برخی گیاهان دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در طی یک تحقیق، اثر ضدپیری عصاره قارچ ری‌شی همراه با عصاره گیاه ریشه طلایی^۹ در موش‌های صحرایی که پیری در آن‌ها با دی‌گالاکتوز القا شده بود، بررسی شد. ترکیب GRCP^{۱۰} در دُرهای ۲۵ تا ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت تزریق درون‌معدوی تجویز شد. نتایج حاکی از بهبود کارکرد شناختی، بهبود واکنش به استرس اکسیداتیو، افزایش فعالیت ایمنی و کاهش التهاب در موش‌های صحرایی پیر بود [۱۵].

همچنین اثر قارچ ری‌شی بر عملکرد ایمنی سلولی انسانی نیز بررسی شده است. تجویز خوراکی پودر قارچ ری‌شی (۱/۵ گرم، سه بار در روز، به‌مدت ۳۰ روز) فعالیت اینترلوکین-۲، اینترفرون گاما و سلول‌های کشنده طبیعی را در ۳۰ داوطلب پیر سالم افزایش داد. نتایج مطالعه مذکور نشان داد ۲۰ روز پس از مصرف پودر قارچ ری‌شی (روز بیستم) مقدار فعالیت این عناصر به اوج خود رسید (جدول شماره ۱). مطالعه مذکور نتیجه گرفته است که قارچ ری‌شی قادر است عملکرد سیستم ایمنی در افراد پیر را بهبود بخشد [۱۵].

کاملاً روشن شده است که پیری یکی از مهم‌ترین ریسک‌فاکتورهای ضعف عملکرد سیستم ایمنی است. با افزایش سن، عملکرد لنفوسیت‌های T و توانایی تولید سایتوکاین‌ها کم می‌شود و تیموس، تحلیل می‌رود و همین مسئله علت اصلی کم‌کار بودن سیستم ایمنی در سالمندان است. با افزایش سن همچنین توانایی مغز استخوان برای تنظیم عملکرد لنفوسیت‌های B و توانایی این لنفوسیت‌ها برای ترشح ایمنوگلوبولین نیز کم می‌شود. اختلال عملکرد سیستم ایمنی به مستعدتر شدن جمعیت مسن برای ابتلا به عفونت‌های باکتریایی و ویروسی میانجامد؛ این مسئله در بین سالمندان به‌وفور دیده می‌شود [۳]. در تحقیقاتی که با هدف بررسی اثر قارچ ری‌شی بر بهبود عملکرد سیستم ایمنی هم‌زمان با پیری انجام می‌شود، از روش سنجش سلول تشکیل‌دهنده پلاک^۶ استفاده می‌شود. سنجش سلول تشکیل‌دهنده پلاک با هدف بررسی توانایی یک فرد برای ایجاد یک پاسخ ایمنی هومورال (پاسخ آنتی‌بادی) به یک آنتی‌ژن خاص صورت می‌گیرد. این نوع سنجش یک روش اختصاصی برای بررسی اثر شیوه‌های درمانی بر عملکرد ایمنی هومورال جانوران است. یک مطالعه قدیمی نشان داد تزریق سه نوع پلی‌ساکارید قارچ ری‌شی (BN₃C و BN₃A و BN₃B) به داخل صفاق موش‌های مسن ۱۴ ماهه (که سلول تشکیل‌دهنده پلاک در آن‌ها تحت تأثیر دریافت گلبول قرمز گوسفند القا شده بود) موجب بازگشت به حالت طبیعی شد (یعنی شبیه به موش‌های ۳ ماهه غیر تیمار شده شد). این سه نوع پلی‌ساکارید با تحریک تولید کانکائوالین A و اینترلوکین-۲ در موش‌های معمولی مسن ۱۴ ماهه در محیط آزمایشگاه، تکثیر لنفوسیت‌ها را به‌صورت معنی‌داری زیاد کردند [۱۲]. در تحقیق دیگری روشن شد که واکنش انواع لنفوسیت‌ها در محیط آزمایشگاه به آلوآنتی‌ژن‌ها (تشکیل‌شده از آنتی‌ژن‌های مختلف)، تکثیر خودکار و تولید اینترلوکین-۲ در سلول‌های طحال موش‌های ۲۴ ماهه به‌صورت معنی‌داری کمتر از موش‌های ۳ ماهه بود. پلی‌ساکاریدهای قارچ ری‌شی (در غلظت‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر) توانستند مقدار این عوامل ایمنی سلولی را در موش‌های ۲۴ ماهه به‌طور معنی‌داری به سطح طبیعی برگردانند. فعالیت DNA پلی‌مراز آلفا در سلول‌های طحال موش‌های ۲۴ ماهه، ۳۵/۶ تا ۴۳/۳ درصد و کمتر از موش‌های معمولی ۳ ماهه بود. تزریق درون‌صفافی پلی‌ساکاریدهای قارچ ری‌شی به سلول‌های طحال موش‌های ۲۴ ماهه مسن (۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، یک‌بار در روز، به‌مدت ۴ روز) توانست فعالیت DNA پلی‌مراز آلفا را زیاد کند (به ترتیب ۴۴/۰ درصد و ۵۸/۴ درصد) و آن را به وضعیت

7. Ganoderma atrum polysaccharide (PSG-1)

8. Ganoderma atrum

9. Rhodiola rosen

10. Ganoderma lucidum Rhodiola compound preparation (GRCP)

6. Plaque-forming cell assay

جدول ۱. تأثیر قارچ ری‌شی بر عملکرد سیستم ایمنی سلولی ۳۰ داوطلب پیر (برگرفته از مطالعه تائو و یی [۱۵] که با اندکی تغییرات بازطراحی شده است)

گروه‌های مطالعه	اینترلوکین-۲ (واحد بر میلی لیتر)	اینترفرون گاما (واحد بر میلی لیتر)	درصد سلول‌های کشته شده طبیعی
قبل از مصرف قارچ ری‌شی	۱۳۴/۱±۳۹/۴	۸/۳±۳/۹	۴۰/۱±۱۰/۳
۱۰ روز بعد از مصرف قارچ ری‌شی	۱۵۰/۷±۴۱/۳*	۱۰/۶±۴/۳	۴۸/۷±۹/۶**
۲۰ روز بعد از مصرف قارچ ری‌شی	۱۵۹/۲±۳۹/۴**	۱۱/۵±۵/۳*	۵۰/۷±۸/۳*
۱۰ روز غیرپیوسته بعد از مصرف قارچ ری‌شی	۱۵۷/۸±۴۱/۹**	۱۲/۱±۵/۹**	۵۰/۱±۹/۳*

داده‌ها بر حسب میانگین ± انحراف معیار بیان شده‌اند؛ * $P < 0.05$ ؛ ** $P < 0.01$ در مقایسه با قبل از تیمار

مجله دانشگاه علوم پزشکی کیران

اثر ضدپیری قارچ ری‌شی با مهار تنش اکسیداتیو

مشخص شده است که تنش اکسیداتیو^{۱۱} و تجمع گونه‌های فعال اکسیژن و سایر رادیکال‌های آزاد، یکی از عوامل مهم و کلیدی در تخریب DNA سلولی، پروتئین، لیپیدها و در نهایت تسریع فرایند پیری است [۱۶]. با افزایش سن، عملکرد آنتی‌اکسیدانی بدن رو به زوال می‌رود، تعادل بین تولید و حذف رادیکال‌های آزاد به هم می‌ریزد و نهایتاً سلول‌ها به‌خاطر اکسیداسیون آسیب می‌بینند. تجمع رادیکال‌های آزاد و تضعیف فعالیت مجموعه‌های آنزیمی زنجیره تنفسی مغز موجب آسیب دیدن میتوکندری در سلول‌های مغزی می‌شود [۱۷]. اختلال عملکرد این سلول‌ها می‌تواند به شروع بعضی بیماری‌های تحلیل‌رونده اعصاب مانند پارکینسون، آلزایمر، هانتینگتون و نظایر آن‌ها بیانجامد. واکنش‌های اکسیداسیون و رادیکال‌های آزاد می‌توانند در گذر سن به لیپیدها، غشاهای سلولی، پروتئین‌ها و آنزیم‌ها، اسیدهای نوکلئیک و کروموزوم‌ها آسیب بزنند. پراکسیداسیون لیپیدها و تولید بیش از حد رادیکال‌های آزاد می‌تواند به آسیب سلولی، بافتی و اندامی بیانجامد. هرچند پیر شدن بر تمام انواع سلول‌های هسته‌دار تأثیر می‌گذارد، اما بافت‌های فاقد تقسیم سلولی یا دارای تقسیم سلولی اندک، از نظر تئوری محل‌های مستعدتری برای تجمع آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. بر همین اساس، بسیاری از تغییرات قابل توجه مرتبط با پیری به‌دلیل تنش اکسیداتیو در بافت‌های پسمیتوزی مانند مغز، قلب و ماهیچه اسکلتی ظاهر می‌شوند [۱۵].


تحقیقات روشن ساخته است که عصاره‌های قارچ ری‌شی می‌توانند عمدتاً به‌خاطر ماهیت آنتی‌اکسیدانی خود از قلب، کبد و مغز موش‌های معمولی در برابر پیری محافظت کنند. تصویر شماره ۱ یک تصویر شماتیک از اثرات عصاره قارچ ری‌شی بر این سه اندام حیاتی بدن در ارتباط با پیشگیری از پیری را نشان می‌دهد. پژوهش‌ها حاکی از آن هستند که تجویز قارچ ری‌شی می‌تواند افت وضعیت آنتی‌اکسیدانی ناشی از پیر شدن را بهبود بخشد؛ مسئله‌ای که تا حدودی به خاصیت این قارچ برای

پاک‌سازی رادیکال‌های آزاد برمی‌گردد. در همین ارتباط، تجویز عصاره‌های قارچ ری‌شی موجب بالارفتن معنی‌دار ($P < 0.05$) مقادیر گلوتاتیون احیاء شده و افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز منگن‌دار، گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون S ترانسفراز شد و کاهش معنی‌دار ($P < 0.05$) پراکسیداسیون لیپیدی، محصولات اکسیداسیون پیشرفته پروتئین‌ها^{۱۲} و گونه‌های فعال اکسیژن را به همراه داشت [۱۸]. در تحقیقی دیگر، اثر عصاره قارچ ری‌شی در به دام انداختن رادیکال‌های آزاد و مهار اکسیداسیون در میتوکندری‌های کبد موش‌های معمولی ۱۵ ماهه مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه، عصاره قارچ ری‌شی در دُزهای ۵۰ و ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت خوراکی و به‌مدت ۱۵ روز به موش‌های پیر BALB/c تجویز شد. فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز، سطح گلوتاتیون احیاء شده و پراکسیداسیون لیپیدها براساس میزان تولید متان دی‌کربوکسیلیک آلدئید ارزیابی شدند. گروه موش‌های معمولی جوان و پیر به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. فعالیت آنتی‌اکسیدانی میتوکندری‌های کبد در موش‌های پیر تیمار شده با عصاره‌های قارچ ری‌شی، بیشتر از موش‌های پیر گروه شاهد بود. گلوتاتیون احیاء شده، سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در گروه تیمار شده با عصاره‌های قارچ ری‌شی، بیشتر از گروه شاهد بود. عصاره‌های قارچ ری‌شی خاصیت قابل توجهی در پاک‌سازی رادیکال‌های ۲،۲-دی‌فنیل-۱-پیکریل هیدرازین و رادیکال‌های ABTS^{۱۳} و قدرت زیادی در اکسیداسیون و احیای آهن (III) داشتند. پاک‌سازی رادیکال‌های آزاد DPPH^{۱۴} و ABTS و قدرت اکسیداسیون -احیای آهن در عصاره قارچ ری‌شی قابل توجه بود. به‌علاوه، عصاره قارچ ری‌شی توانست رادیکال‌های سوپراکسید و هیدروکسیل را نیز به دام اندازد [۱۹].

همچنین نشان داده شده است که عصاره اتانولی قارچ ری‌شی بر فعالیت دهیدروژنازهای میتوکندری و مجموعه ۱ و ۲ زنجیره انتقال الکترون موش‌های صحرایی مُسن تأثیر می‌گذارد. عصاره اتانولی قارچ

12. Advanced oxidation protein products (AOPP)
13. 2,2-azino bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)
14. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

11. Oxidative stress



مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تصویر ۱. مکانیسم‌های محافظتی عصاره‌های قارچ ری‌شی در جلوگیری از پیشرفت پیری در بافت‌های به ترتیب از سمت راست قلب، کبد و مغز (ترسیم شکل از مؤلفین)

اکسیداسیون دی گالاکتوز محافظت کنند [۲۲].

در تحقیق دیگری مشخص شد که پروتئین نوترکیب و تنظیم‌کننده سیستم ایمنی جداشده از قارچ ری‌شی (rlz-8) می‌تواند جلوی پیر شدن موش‌های معمولی در اثر دی گالاکتوز را بگیرد. براساس نتایج، تزریق زیرجلدی دی گالاکتوز به موش‌های معمولی موجب کاهش معنی‌دار سطح سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوکاتایون پراکسیداز در سرم و بافت پوست، افزایش سطح مالون‌دی‌آلدئید و کاهش معنی‌دار سطح ملاتونین سرم می‌شود. این بدان معناست که تنش اکسیداتیو، مسئول ایجاد تغییرات دوران پیری ناشی از دی گالاکتوز است. با این حال، فقط دز بالای rlz-8 (۱۳۲۰ میکروگرم بر کیلوگرم) می‌تواند تمام آنتی‌اکسیدان‌های فوق‌الذکر و سطح ملاتونین سرم را به‌صورت معنی‌داری زیاد و سطح مالون‌دی‌آلدئید را کم کند. این یافته‌ها حاکی از آن هستند که rlz-8 می‌تواند فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها در موش‌های معمولی رو به پیری را زیاد کند و پیر شدن آن‌ها را به تأخیر اندازد [۲۳].

مطالعه حیوانی دیگری نیز تأیید کرده است که پلی‌ساکارید قارچ ری‌شی (۰/۵ تا ۲/۰ گرم بر کیلوگرم) توانست احیای هیدروکسی پرولین و محتوای سوپراکسید دیسموتاز پوست موش‌های صحرایی ۱۶ ماهه را به‌صورت معنی‌داری زیاد کند [۲۴].

این نکته روشن شده است که اختلال در عملکرد آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، فرایند پیری را تسریع می‌کند، زیرا این آنزیم‌ها، خط مقدم دفاع سلول‌ها از درشت‌مولکول‌های زیستی علیه تنش اکسیداتیو هستند. گلوکاتایون احیاشده، غنی‌ترین مولکول تیول‌دار غیرپروتئینی در بافت‌هاست که می‌تواند به‌واسطه واکنش مستقیم با گونه‌های فعال اکسیژن و متابولیت‌های الکترون‌دوست، جلوی تجمع گونه‌های فعال اکسیژن در بافت مغز را بگیرد. در یک تحقیق مشخص شد قارچ ری‌شی می‌تواند فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در میتوکندری‌های قلب، کبد و مغز موش‌های معمولی مسن را زیاد کند [۲۵].

ری‌شی (۵۰ و ۲۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) به‌صورت روزی یک‌بار به‌مدت ۱۵ روز برای موش‌های صحرایی نر مسن ویستار تجویز شد. همچنین گروه تیمار شده با دیال-آلفا لیپوئیک اسید (۱۰۰ میلی‌گرم/کیلوگرم) به‌عنوان شاهد مثبت انتخاب شد. طبق نتایج، عصاره قارچ ری‌شی (۵۰ و ۲۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) فعالیت پیرووات دهیدروناز، آلفا کتوگلوکوتارات، سوکسینات دهیدروناز و مجموعه ۱ و ۲ زنجیره انتقال الکترون در مغز موش‌های صحرایی تیمار شده را در مقایسه با گروه شاهد مسن، به‌صورت معنی‌داری افزایش داد. سطح مالون‌دی‌آلدئید در گروه تیمار شده با قارچ ری‌شی به‌صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد مسن بود. مهار دهیدرونازهای این پژوهش توسط عصاره قارچ ری‌شی می‌تواند تا حدودی ناشی از فعالیت آنتی‌اکسیدانی این عصاره باشد. نتایج پژوهش نشان داد عصاره قارچ ری‌شی احتمالاً برای بهبود عملکرد میتوکندری‌های مغز موش‌های صحرایی مسن، مفید است و می‌توان از آن برای درمان بالقوه بیماری‌های تحلیل‌رونده عصبی مرتبط با پیری استفاده کرد [۲۰].

اثر پلی‌ساکاریدهای قارچ گانودرما آتروم در جلوگیری از پیر شدن موش‌های معمولی در اثر دی گالاکتوز بررسی شد. نتایج نشان داد در مقایسه با گروه موش‌های معمولی در حال پیر شدن، پلی‌ساکاریدهای قارچ گانودرما آتروم در دز ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن، روزی یک‌بار به‌مدت ۱۰ هفته به‌صورت معنی‌داری فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، گلوکاتایون پراکسیداز و کاتالاز در بافت کبد و مغز را زیاد و محتوای مالون‌دی‌آلدئید را کم کرد. به‌علاوه، کاهش وزن و آتروفی بافت کبد در گروه‌های تیمار شده با این پلی‌ساکاریدها به‌طور قابل‌توجهی مهار شد. این بدان معنی است که پلی‌ساکاریدهای قارچ گانودرما آتروم اثر ضدپیری بر موش‌های معمولی در حال افزایش سن دارد و سازوکار احتمالی آن به مهار رادیکال‌های آزاد، افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها و کاهش پراکسیداسیون لیپیدها برمی‌گردد [۲۱]. پس از این تحقیق، در مطالعه دیگری نتایج مشابهی با اثر آنتی‌اکسیدانی پلی‌ساکاریدهای گانودرما آتروم به دست آمد و نشان داده شد که پلی‌ساکاریدهای گانودرما آتروم می‌توانند از مغز جانوران زنده در برابر تنش

جدول ۲: عصاره‌ها و ترکیبات قارچ ری‌شی مرتبط با خواص ضدپیری این قارچ

نوع عصاره یا ترکیب فعال	نوع بافت قارچ	غلظت مورد استفاده	مدل	مسیر تجویز	مدت زمان تیمار	عامل محرک القای پیری	سلول یا بافت هدف	نوع اثر	رفرنس
BN3A, BN3B, BN3C (فرکشن‌های پلی‌ساکاریدی)	nd	nd	موش	داخل صفاقی	nd	nd	nd	کاهش تکثیر لنفوسیت‌ها	[۱۲]
پلی‌ساکارید تام	nd	۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم	موش	داخل صفاقی	۴ روز	nd	سلول طحال	افزایش فعالیت DNA پلی‌مراز	[۱۳]
PSG-1 (یک فرکشن پلی‌ساکاریدی)	میوه	۵۰- و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم	موش	nd	nd	دی‌کالاکتوز	کبد، مغز، طحال و خون	بهبود عملکرد سیستم ایمنی	[۱۴]
GRCP (مخلوطی از عصاره تام قارچ ری‌شی همراه با عصاره تام گیاه ریشه حلالی)	میوه	۲۵ تا ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم	موش صحرائی	کاوژ	nd	دی‌کالاکتوز	خون	کاهش التهاب و افزایش فعالیت ایمنی	[۱۵]
عصاره تام	میوه	۱/۵ گرم	انسان	خوراکی	nd	nd	خون	افزایش فعالیت سیستم ایمنی	[۱۶]
عصاره اتانولی	میوه	۵۰ و ۱۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم	موش	کاوژ	۱۵ روز	nd	سلول کبدی	افزایش فعالیت آنژی‌اکسیدانی میتوکندری	[۲۰]
عصاره اتانولی	میوه	۵۰ و ۲۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم	موش صحرائی	درون صفاقی	۱۵ روز	nd	بافت مغز	افزایش فعالیت آنژی‌اکسیدانی و عملکرد میتوکندری مغز	[۲۱]
پلی‌ساکارید تام	میوه	۵۰- و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم	موش	nd	۷۰ روز	دی‌کالاکتوز	کبد و مغز	افزایش فعالیت آنژی‌اکسیدانی و کاهش پراکسی‌اسیدون	[۲۲]
^{12Z-8} (پروتئین نوکز کبک و تنظیم‌کننده سیستم ایمنی)	nd	۱۳۳۰ میکروگرم بر کیلوگرم	موش	nd	nd	nd	خون	افزایش فعالیت آنژی‌اکسیدانی	[۲۴]
پلی‌ساکارید تام	nd	۰/۲ تا ۰/۵ گرم بر کیلوگرم	موش صحرائی	nd	nd	nd	پوست	کاهش انجالی هیدروکسی پروژن	[۲۵]
پلی‌ساکارید تام	میوه	۲۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم	موش	nd	۳۳ روز	دی‌کالاکتوز	پوست	کاهش آسیب‌های پوستی	[۲۷]
پلی‌ساکارید-پیتید	میوه	۱۰۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم	موش	درون صفاقی	nd	tbuCOH	آبشده شکمی	افزایش محافظت ماکروفاژهای داخل صفاقی	[۲۸]
پلی‌ساکارید و تری‌توبین	میوه	nd	موش	nd	nd	nd	بیضه	کاهش ROS و MDA و افزایش BCL-2 و کاهش Bax	[۲۹]
تری‌توبین	میوه	۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم	موش	کاوژ	۱۴ روز	انسه کاما	کبد و مغز	کاهش پراکسی‌اسیدون لیپید و افزایش آنژی‌های آنژی‌اکسیدانی	[۳۰]

نوع عصاره یا ترکیب فعال	نوع بافت قارچ	غلظت مورد استفاده	مدل	مسیر تجویز	مدت زمان تیمار	عامل محرک القای پیروی	سلول یا بافت هدف	نوع اثر	رفرنس
پلی ساکارید تام	nd	nd	انسان	nd	nd	H ₂ O ₂	فیبروبلاست	کاهش پیروی سلولی توسط تنظیم چرخه سلولی	[۳۲]
عصاره اتانولی	میوه	۵۰ میلی گرم بر لیتر	موش	nd	۶ ساعت	H ₂ O ₂	میوبلاست	فعال سازی ژن NFR2 و ho-1	[۳۳]
کاندیریک اسید A، گانودرال A	nd	nd	پروتوزوا	nd	nd	nd	nd	افزایش بیان ژن PHGP و پروتئین آن	[۳۴]
پلی ساکارید و تری تریزین	میوه	۲۲۵ میلی گرم	انسان	خوراکی	۶ ماه	بدون عامل محرک	خون	مهار تنش اکسیداتیو	[۳۶]
مروتروپنیدهای آروماتیک	میوه	nd	انسان	خوراکی	nd	nd	نورولاست	محافظت از بیماری تخریب شونده عصبی	[۱۷]
عصاره اتانولی	nd	nd	موش	nd	nd	LPS	میکروگلیا	کاهش فعال سازی NF-Kb و کاهش اتصال LPS به TLR4	[۳۹]
پلی ساکارید	nd	۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم	موش	کپاژ	nd	nd	سلول پیش ساز عصبی	کاهش رسوب پروتئین آمیلوئید	[۴۱]
تری تریپنید	nd	۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم	موش صحرائی	کپاژ	nd	دی گلاکتوز	منز	افزایش بیان ژن FOXO4 و SIRT1	[۴۲]
پلی ساکارید-سیتید	nd	۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم	موش	درون صفاقی	۷ روز	nd	کپه	کاهش تنش اکسیداتیو و کاهش ناهنجاری های کپه	[۳۷]
عصاره آبی	میوه	۱۱/۲۵ و ۲۳/۷۵ میلی گرم بر میلی لیتر	نماد	nd	nd	nd	nd	مقاوم شدن در برابر تنش اکسیداتیو و فلز سنگین کروم و افزایش طول عمر	[۳۹]
کاندروماید A، B، C و D	اسپور	nd	مخمر	nd	nd	nd	nd	افزایش بیان ژن و UTH1	[۵۰]

عبدالله علم پزشکی گیلان

nd: تعیین نشده است یا در مطالعه مربوطه اطلاعاتی داده نشده است

ارتباط بین پیری و استرس اکسیداتیو در اثر تابش اشعه به خوبی روشن شده است. از سوی دیگر، نقشی که عصاره ها و ترکیبات قارچ گانودرما لوسیدوم در این زمینه ایفا می کنند نیز مطالعه شده است. در یک مطالعه، اثر ضدپیری قارچ گانودرما لوسیدوم در برابر تابش اشعه گاما بررسی شد. تری ترین های قارچ گانودرما لوسیدوم (۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به صورت خوراکی در طی ۱۴ روز پشت سر هم قبل از تابش اشعه گاما به موش ها تجویز شد. نتایج نشان داد این ترکیبات در کاهش پراکسیداسیون لیپید و اکسیداسیون پروتئین در بافت های کبد و مغز موش های در معرض اشعه گاما و افزایش سطح آنزیم های آنتی اکسیدان این دو اندام مؤثر بوده اند [۲۹]. هم زمان با گذر سن و افزایش عمر، پوست، بیشتر و بیشتر در معرض اشعه ماورای بنفش قرار می گیرد، بنابراین ممکن است اختلالات پوستی، ککومک و سندرم هیپرپیگمانتاسیون ایجاد شود که به نوعی با پیری پوست در ارتباط است. پلی ساکاریدهای قارچ گانودرما لوسیدوم می توانند تأثیر اشعه ماورای بنفش در ملانوزن (تولید و تجمع بیش از حد ملانین در پوست) را خنثی کنند. تحقیقات نشان داده است این ترکیبات این کار را از طریق تنظیم فسفوریلاسیون و جلوگیری از تحریک و فعال سازی مسیر MAPK^{۱۹} و همچنین جلوگیری از تحریک و فعال سازی مسیر پروتئین کیناز A در اثر تحریک اشعه ماورای بنفش انجام می دهند [۳۰].

از دید مولکولی و سلولی، پیری سلول یک فرایند پیچیده است که توسط چند ژن و چند مسیر سلولی تحت کنترل است. در این ارتباط، تأثیر پلی ساکاریدهای قارچ ری شی بر ژن های سایکلین CDK4، Rb، و P16^{INK4a} و تغییر Rb فسفریله (pRb) در سلول فیبروبلاست انسان که روند پیری آن با هیدروژن پراکسید تحریک شده بود، بررسی شده است. براساس این پژوهش، سلول های کشت شده فیبروبلاست انسان در گروه جوان، دارای شکل منشورمانند منظم و فاقد رشته های کراتینی در طول رشد بودند، اما این سلول ها در گروه مسن ظاهری نامنظم و حجیم تر داشتند و گرانول ها و واکوئل های درون سلولی آن ها نیز بیشتر بود. پلی ساکارید قارچ ری شی توانست تعداد واکوئل های درون سلولی را کم کند اما تأثیر واضحی بر فنوتیپ پیری نداشت. در قیاس با گروه جوان و گروه شاهد، زنده ماندی سلولی، بیان ژن CDK4 و فسفریله شدن ژن Rb در گروه مسن به صورت معنی داری کم بود؛ و فعالیت بتاگالاکتوزیداز، بیان ژن سایکلین CDK4، p16^{INK4a} و Rb در این گروه افزایش معنی داری داشت. اختلاف نتایج بین گروه مدل در حال پیر شدن و گروه شاهد نشان می دهد تیمار سلول های فیبروبلاست انسان با دُزهای متوسط و بالای پلی ساکارید قارچ ری شی می تواند جلوی بروز تغییر های فوق الذکر ناشی از پیر شدن با هیدروژن پراکسید را بگیرد. در مجموع، اثر پلی ساکارید قارچ ری شی در محافظت از سلول های فیبروبلاست انسان علیه پیر شدن ناشی از هیدروژن پراکسید

سازوکار آنتی اکسیدانی پلی ساکاریدهای قارچ ری شی برای به تعویق انداختن پیری پوست موش های معمولی تحریک شده با دی گالاکتوز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج آسیب شناسی ساختار بافت پوست نشان داد ضخامت درم (پوست) و اندودرم (روپوست) گروه تحریک شده، به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد سالم است. ضخامت پوست و روپوست در گروه تیمار شده با پلی ساکارید قارچ ری شی و گروه تیمار شده با ویتامین E (شاهد مثبت) به طور قابل توجهی بیشتر از گروه مدل تحریک شده بود و فقط ضخامت روپوست در گروه تیمار شده با پلی ساکارید قارچ ری شی به صورت معنی داری بیشتر از گروه تیمار شده با ویتامین E بود. فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در بافت پوست گروه در حال پیر شدن، در مقایسه با گروه شاهد سالم، کم بود. فعالیت سوپراکسید دیسموتاز گروه تیمار شده با پلی ساکارید قارچ ری شی، بیشتر از گروه مسن و گروه تیمار شده با ویتامین E بود. آستانه شروع چرخه بیانی mRNA سوپراکسید دیسموتاز مس - روی در گروه تیمار شده با پلی ساکارید قارچ ری شی، پایین تر از گروه مسن و گروه تیمار شده با ویتامین E بود. پلی ساکارید قارچ ری شی می تواند آسیب های شدید وارده به بافت پوست در اثر اکسیداسیون را که با ویتامین E قابل ترمیم نیستند، بازسازی کند. این موضوع، ارزش بالینی و بالقوه پلی ساکارید قارچ ری شی را برای درمان آسیب های ناشی از پیری نشان می دهد [۲۶].

اثر پلی ساکارید - پپتیدهای به دست آمده از قارچ گانودرما لوسیدوم در محافظت از ماکروفاژهای صفاقی (آبشامه شکم) موش در برابر گونه های فعال اکسیژن بررسی شده است. ابتدا موش ها با پلی ساکارید - پپتیدهای به دست آمده از قارچ گانودرما لوسیدوم تیمار شدند و سپس ماکروفاژهای صفاقی آن ها استخراج و در کشت سلولی در معرض ترت بوتیل هیدروپراکسید^{۱۶} به عنوان یک اکسیدکننده و تولیدکننده گونه های فعال اکسیژن قرار گرفتند. نتایج نشان داد پلی ساکارید پپتیدهای به دست آمده از قارچ گانودرما لوسیدوم در دُزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر وزن بدن به صورت تریق داخل صفاقی توانست ماکروفاژهای موش را در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از tBuOOH در شرایط آزمایشگاهی^{۱۷} محافظت کند. این اثر حتی در ماکروفاژهای به دست آمده از موش هایی که با قارچ گانودرما لوسیدوم درمان شده بودند نیز در کشت سلول این ماکروفاژها دیده شد [۲۷].

اثر آنتی اکسیدانی عصاره حاوی پلی ساکارید و تری ترین های قارچ گانودرما لوسیدوم از طریق کاهش عوارض پیری بر ساختار و عملکرد بافت بیضه موش بررسی شده است. این مطالعه مجدداً تأیید کرد که خاصیت ضدپیری این قارچ از طریق کاهش گونه های فعال اکسیژن و مالون دی آلدئید^{۱۸}، افزایش فعالیت ژن ضد آپوپتوزی Bcl-2 و کاهش فعالیت ژن های تحریک کننده آپوپتوز نظیر Bax اعمال می شود [۲۸].

16. tert-Butyl hydroperoxide (tBuOOH)

17. In vitro

18. Malondialdehyde

19. Mitogen-activated protein

عروق مغزی و پارکینسون محسوب می‌شود. شیوع بالای این دسته از اختلالات مغزی تحلیل‌رونده غیرقابل‌برگشت در سراسر جهان توجه‌کننده استفاده از روش‌های درمانی نوین و غیرتهاجمی با عوارض کمتر است [۳۶]. بنابراین تأثیری که عصاره‌ها یا ترکیبات قارچ گانودرما لوسیدوم می‌تواند بر درمان یا پیشگیری از بیماری‌های نورودژنراتیو داشته باشد، به‌طور مستقیم بر جلوگیری از فرایند پیری مؤثر است. در یک پژوهش آزمایشگاهی بر روی سلول‌های گرانول مخچه، آپوپتوز القا شده توسط تنش اکسیداتیو ناشی از آب‌اکسیژنه در کشت سلولی سلول‌های گرانول مخچه موش صحرایی توسط پلی‌ساکاریدهای قارچ گانودرما لوسیدوم خنثی شد [۳۷]. در مطالعات آزمایشگاهی بعدی مشخص شد ترکیباتی از قارچ گانودرما لوسیدوم اثر محافظتی از سلول‌های عصبی (نوروبلاستوما) انسانی SH-SY5Y در برابر استرس اکسیداتیو دارند. این ترکیبات شامل مروتینوئیدهای آروماتیک بودند. از آنجایی که پیری خود یک فاکتور خطر برای بیماری‌های تخریب‌کننده بافت عصبی (نظیر پارکینسون و آلزایمر) محسوب می‌شود، بنابراین نتایج این تحقیق، اساسی را برای کارآزمایی‌های بالینی برای کاربرد ترکیبات به‌دست‌آمده از قارچ گانودرما لوسیدوم به منظور استفاده از اثرات ضدپیری آن از طریق محافظت در برابر بیماری‌های تخریب‌کننده بافت عصبی فراهم می‌کند [۱۶]. در یک مطالعه دیگر، اثر بالقوه عصاره اتانولی قارچ گانودرما لوسیدوم بر بیماری‌های تخریب‌کننده بافت عصبی بررسی شد. این مطالعه بر روی سلول‌های میکروگلیای موش تحریک‌شده با اندوتوکسین باکتریایی (لیپوپلی‌ساکارید) انجام شد. سلول‌های میکروگلیا شبیه به ماکروفاژها عمل می‌کنند و اولین سد دفاعی در مغز در برابر آسیب‌ها، عفونت‌ها و التهابات مغزی هستند، اما فعالیت بیش از اندازه آن‌ها موجب تولید سایتوکاین‌های التهابی و عوامل سیتوتوکسیک می‌شود که در نتیجه می‌تواند موجب ایجاد بیماری‌های تخریب‌کننده بافت عصبی نظیر آلزایمر و ام‌اس شود. این مطالعه نشان داد عصاره اتانولی قارچ گانودرما لوسیدوم از فعال‌سازی پروتئین‌های هسته‌ای کاپا - بی^{۲۴} و نیز از اتصال اندوتوکسین به پذیرنده سلولی خود یعنی TLR4 و شروع مسیر التهابی جلوگیری می‌کند [۳۸]. مکانیسم دقیق اثر عصاره قارچ گانودرما لوسیدوم در مطالعه مستقل بعدی تعیین و تأیید شد، به‌طوری‌که نشان داده شد عصاره قارچ گانودرما لوسیدوم در سلول‌های میکروگلیای موش تحریک‌شده با اندوتوکسین باکتریایی می‌تواند از یک‌سو سطح سایتوکاین‌ها و کموکاین‌ها به‌ویژه کموکاین RANTES^{۲۵} و MIP3α^{۲۶} را به‌طور بسیار زیادی کاهش دهد و از سوی دیگر بیان مجموعه ژن‌های مرتبط با آلزایمر و پارکینسون یعنی NF-κB، CHUK و IK-BKE را کاهش دهد [۳۹].

احتمالاً مربوط به تنظیم چرخه تکثیر سلولی است [۳۱]. همچنین مکانیسم مولکولی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی قارچ گانودرما لوسیدوم با جزئیات بیشتری در مطالعات اخیر بررسی شده است. یافته‌های یکی از این مطالعات نشان داد عصاره اتانولی قارچ گانودرما لوسیدوم اثرات تنش اکسیداتیو القا شده در سلول میوبلاست (باخته پیش‌ساز جنینی به‌وجودآورنده سلول ماهیچه) توسط آب اکسیژنه (H₂O₂) را کاهش می‌دهد. مکانیسم عمل از طریق فعال‌سازی ژن Nrf2^{۲۰} به‌عنوان یک تنظیم‌کننده اصلی برای شروع واکنش‌های آنتی‌اکسیدانی در سطح سلول و همچنین ژن HO-1^{۲۱} به‌عنوان ژن تولیدکننده یک آنزیم آنتی‌اکسیدانی تحت تأثیر فعالیت ژن Nrf2 و مسئول کاتالیز گروه‌های هم^{۲۲} صورت می‌گیرد [۳۲]. اخیراً در یک مطالعه، به‌طور مفصل و با جزئیات، مکانیسم مولکولی آنتی‌اکسیدانی عصاره آبی قارچ گانودرما لوسیدوم و همچنین ترکیباتی از این قارچ شامل پلی‌ساکاریدهای قارچ گانودرما لوسیدوم، گانودریک اسید A، گانودرال A و ارگوسترول بررسی شده است. این مطالعه بر روی یک پروتوزوا به‌عنوان یک مدل انجام شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد این ترکیبات موجب افزایش بیان ژن‌های کلیدی آنتی‌اکسیدانی از جمله PHGP^{۲۳} و افزایش تولید آنزیم آنتی‌اکسیدانی PHGP می‌شوند. این ترکیبات علاوه بر کاهش استرس اکسیداتیو موجب حفظ تمامیت غشای سلولی از طریق کاهش اکسیداسیون لیپیدها در غشای سلولی نیز می‌شوند. همچنین نشان داده شد که ترکیبات قارچ گانودرما لوسیدوم از طریق غشای سالم سلولی وارد سلول می‌شوند و در آنجا واکنش‌هایی را علیه فرایند پیری تحریک می‌کنند [۳۳]. همچنین مشخص شده است اثر ضدپیری مرتبط با آنتی‌اکسیدانی عصاره قارچ گانودرما آتروم (گونه دیگری از جنس گانودرما) به‌خاطر فعال‌سازی اتوفاژی و کاهش تنش اکسیداتیو در میتوکندری سلول‌های پیر است [۳۴].

علاوه بر تحقیقات در شرایط آزمایشگاهی و حیوانی، کارآزمایی‌های بالینی نیز حاکی از تأثیر ضدپیری عصاره‌های قارچ گانودرما لوسیدوم از طریق مهار تنش اکسیداتیو هستند. نتایج یک کارآزمایی بالینی نشان داد مصرف قارچ گانودرما لوسیدوم غنی از پلی‌ساکاریدها و تری‌ترپنوئیدها (۲۲۵ میلی‌گرم در روز به‌مدت ۶ ماه) از طریق مهار تنش اکسیداتیو می‌تواند اثرات ضدپیری داشته باشد [۳۵].

اثر ضدپیری قارچ‌ری‌شی با جلوگیری و درمان اختلالات عصبی - شناختی

افزایش سن و تغییرات متعاقب آن، ریسک فاکتور مهمی برای بیماری‌های رایج عصبی - شناختی یا تخریب‌کننده بافت عصبی (نورودژنراتیو) مانند اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر، بیماری

24. Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB)
25. Regulated upon activation, normal T cell expressed and presumably secreted
26. Macrophage inflammatory protein-3α

20. The nuclear factor erythroid 2-related factor 2
21. heme oxygenase-1
22. Haem
23. Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase

اثر ضدپیری قارچ ری‌شی با بهبود آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون^{۳۰}

کاملاً روشن شده است که هم‌زمان با پیری به‌عنوان یک ریسک‌فاکتور، آسیب‌های کلیوی از جمله آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون شدیدتر می‌شود [۴۴]. اثر پلی‌ساکارید - پپتیدهای به‌دست‌آمده از قارچ گانودرما لوسیدوم در بهبود آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون بررسی شده است. هنگام برقراری مجدد جریان خون پس از ایسکمی، آسیب‌های دیگری همچون تجمع کلسیم، نفوذ نوتروفیل‌ها به داخل بافت کلیوی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن به وجود می‌آید. تولید گونه‌های فعال اکسیژن در میتوکندری سلول، خود آسیب‌های دیگری همچون آپوپتوز و آسیب به غشای سلولی را به همراه دارد. در یک مطالعه حیوانی بر روی موش‌های دچار آسیب کلیوی ایسکمی نشان داده شد پلی‌ساکارید - پپتیدهای به‌دست‌آمده از قارچ گانودرما لوسیدوم در ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت تزریق درون‌صفاقی به‌مدت ۷ روز قبل از القای آسیب کلیوی ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون یا به‌صورت درمان با شروع برقراری مجدد جریان خون توانستند ناهنجاری کلیوی و آسیب‌های وارده به آن را کاهش دهند. این اثرات از طریق کاهش استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از آن در میتوکندری اعمال شد [۴۶].

تداخلات اثرات ضدپیری قارچ ری‌شی با داروهای شیمی‌درمانی

یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در مورد قارچ گانودرما لوسیدوم و سایر ترکیبات گیاهی، احتمال اثرات ناشناخته و غیرمطلوب آن‌ها بر سلول‌های نرمال و تداخل با داروهای شیمی‌درمانی است. در این ارتباط، یکی از موضوعات جالب آن است که خاصیت ضدپیری و ضدسرطانی ترکیبات قارچ گانودرما لوسیدوم از طریق حفاظت از DNA سلولی اعمال می‌شود و نمی‌تواند از طریق آسیب به DNA سلولی باشد، حال آنکه داروهای شیمی‌درمانی از طریق آسیب به DNA سلول‌های سرطانی به درمان سرطان کمک می‌کنند. نتایج یک تحقیق آزمایشگاهی با استفاده از روش القای فاز درون سلول باکتریایی در اثر عوامل آسیب‌زننده به DNA باکتری (که در حقیقت یکی از واکنش‌های SOS به یک باکتری در مقابل عوامل آسیب‌زننده به DNA آن است) با استفاده از داروی شیمی‌درمانی دوکسوروبیسین^{۳۱} (به‌عنوان یک دارو با اثرات شناخته‌شده اتصال به DNA سلولی و تخریب آن) نشان داد عصاره‌های قارچ گانودرما لوسیدوم آسیبی به DNA وارد نمی‌کنند و بنابراین این عصاره‌ها در کاربرد سنتی آن‌ها به‌عنوان ترکیبات ضدپیری کاربرد دارند [۴۷].

مطالعات حیوانی بر روی تأثیر عصاره‌های قارچ گانودرما لوسیدوم در جلوگیری از آسیب به بافت مغزی و جلوگیری از اختلالات نورودژنراتیو به‌طور محسوسی اندک است. در مطالعه‌ای بر روی موش سوری مدل آلزایمر (APP/PS1 transgenic mice) پلی‌ساکاریدهای به‌دست‌آمده از قارچ گانودرما لوسیدوم توانستند در ۳۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن (به‌صورت گاوژ) تکثیر سلول‌های پیش‌ساز عصبی^{۲۷} موش را افزایش دهند و از رسوب پروتئین آمیلوئید (یکی از شاخص‌های بیماری آلزایمر) جلوگیری کنند. هر دوی این مکانیسم‌ها به خاصیت ضدپیری قارچ گانودرما لوسیدوم نسبت داده است [۴۰]. در این مطالعه همچنین نشان داده شد پلی‌ساکاریدهای به‌دست‌آمده از قارچ گانودرما لوسیدوم احتمالاً از طریق فعال‌سازی پذیرنده FGFR^{۲۸} (که نقش مهمی در نورون‌زایی دارد) نقش آنتی‌نورودژنراتیو خود را انجام می‌دهند. در مطالعه دیگری، عصاره حاوی تری‌ترپنوئید قارچ گانودرما لوسیدوم (خلوص ۲۸ درصد) در ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن (به‌صورت گاوژ) به موش‌های صحرایی که علائم پیری در آن‌ها به واسطه دی‌گالاکتوز القا شده بود، تجویز شد. نتایج حاکی از اثر مثبت عصاره این قارچ در بهبود یادگیری و حافظه موش‌های صحرایی پیر و کاهش سطح التهاب در آن‌ها بود. همچنین اختلال در متابولیسم لیپید (که در اثر دی‌گالاکتوز القا شده بود) را تخفیف داد. این عصاره همچنین موجب بهبود مجموعه علائم مرتبط با پیری در بافت هیپوکامپ موش‌های صحرایی پیر شد. در این مطالعه روشن شد که از نظر مکانیسم مولکولی، عصاره حاوی تری‌ترپنوئید قارچ گانودرما لوسیدوم بیان ژن‌های ضد آپوپتوز^{۲۹} FOXO4 و SIRT1 (یکی از اعضای خانواده Sirtuin) را افزایش داد و مسیر تکثیر سلولی PI3K/Akt/mTOR را فعال و در نتیجه بیان ژن‌های آپوپتوتیک (نظیر خانواده کاسپاز) را کاهش داد [۴۱].

یکی از نکات جالب در مورد خواص آنتی‌نورودژنراتیو قارچ گانودرما لوسیدوم این است که ترکیبات مؤثره‌ای که این خواص را به قارچ اعطا می‌کنند به‌طور عمده‌ای به ترکیب و فرمولاسیون بستر کشت قارچ بستگی دارند. به‌طور مشخص در طی یک تحقیق مقایسه‌ای بر روی چندین بستر کشت نشان داده شده است که استفاده از کاه - کلش خالص گندم (یعنی بدون هیچ افزودنی دیگر در فرمولاسیون بستر کشت) بیشترین اثر مثبت را بر ترکیبات مفید دارویی میوه قارچ گانودرما لوسیدوم دارد. از نظر مولکولی و مکانیسم عمل، عصاره این قارچ خاصیت آنتی‌نورودژنراتیو خود را از طریق کاهش فعالیت تیروزیناز و استیل‌کولین استراز به نمایش می‌گذارد [۴۲].

به هر حال با توجه به یک مقاله مروری بسیار جدید، قارچ گانودرما لوسیدوم و به‌ویژه پلی‌ساکاریدهای آن یکی از ترکیبات امیدبخش برای مقابله با اختلالات نورودژنراتیو هستند [۴۳].

27. Neural progenitor cells (NPC)

28. Fibroblast growth factor/FGF receptor (FGFR)

29. Forkhead box protein O4

30. Renal ischemia reperfusion injury

31. Doxorubicin

مطالعه اثرات ضدپیری قارچ ری‌شی در جانداران با ساختار ساده

علاوه بر پژوهش‌های حیوانی بر روی موش، پژوهش‌های دیگری در زمینه به تأخیر انداختن روند پیری در جانداران ساده‌تری مانند کرم‌های لوله‌ای و مخمرها در حال انجام است. بررسی‌های انجام‌شده روی کرم لوله‌ای الگانس (یک نوع نماتود با نام علمی کائورابدیتیس الگانس^{۳۲}) نشان داد قارچ ری‌شی اثر مطلوبی بر مقاوم‌تر شدن این کرم‌ها در برابر تنش اکسیداتیو و افزایش قابل‌توجه طول عمرشان دارد.

در یک پژوهش، از کرم لوله‌ای الگانس به‌عنوان مدل جانوری برای بررسی اثر عصاره آبی قارچ ری‌شی علیه تنش اکسیداتیو و پیری استفاده شد. نتایج نشان داد قارچ ری‌شی اثر مطلوبی بر مقاوم‌تر شدن این کرم‌ها در برابر تنش اکسیداتیو و فلز سنگین Cr^{6+} و افزایش قابل‌توجه طول عمر این جانوران دارد. براساس بررسی‌های بیشتر، قارچ ری‌شی به کمک مسیر پیام‌رسانی mTOR/S6K و مسیر محدودیت غذایی از این کرم‌ها در برابر آسیب فلزهای سنگین و علف‌کش پاراکوات محافظت کردند. این درحالی است که اثر قارچ ری‌شی بر طول عمر کرم‌های لوله‌ای عمدتاً به مسیر پیام‌رسانی سلول‌های زاینده آن‌ها بستگی دارد. از روش ریزآرایه DNA^{۳۳}، برای نمایش نمایه بیانی ژن‌ها استفاده شد. در طول روند پیری، بیان ۲۷۴۶ ژن تغییر معنی‌داری پیدا کرد؛ بیان ۲۰۸۲ ژن، کم و بیان ۶۶۴ ژن، زیاد شد که از این بین، روند بیان ۳۴ ژن پس از تیمار نماتودهای مسن با گانودرما لوسیدوم، معکوس شد.

در این میان، روند افزایشی بیان ۲۵ ژن در طول فرایند پیری، پس از تیمار با عصاره قارچ ری‌شی به‌صورت معنی‌داری کم شد و پس از تجویز این عصاره، مهار از روی بیان ۹ ژن در طول فرایند پیری برداشته شد. بیش از نیمی از این ژن‌ها به‌خوبی بررسی نشده‌اند یا عملکرد آن‌ها هنوز مشخص نیست. اما براساس پژوهش‌های انجام‌شده، پروتئین smg-1 مسئول طول عمر کرم لوله‌ای الگانس است. smg-1، سرین - ترئونین کینازی است که نقش حفاظت‌شده‌ای در تجزیه mRNA به‌واسطه کدون‌های بی‌معنی^{۳۴} در کرم‌ها و پستانداران ایفا می‌کند [۴۸].

همچنین چهار ترکیب ارگوسترولی جدید و خالص از اسپورهای قارچ ری‌شی (با نام گانودرمایید C، B، A و D) تهیه و خاصیت ضدپیری آن‌ها در مخمر بررسی شده است. براساس نتایج، این ترکیب‌ها طول عمر سویه همانندساز مخمر یعنی K6001 را به‌طور معنی‌داری افزایش دادند. گانودرماییدهای C، B، A و D بیان ژن UTH1 را تنظیم کردند. این ژن، مسئول افزایش طول

عمر مخمر همانندساز است. خاصیت ضدپیری این ترکیبات در مخمر، قابل مقایسه با ترکیب مشهوری به نام رسوراترول است [۴۹، ۵۰].

بحث و نتیجه‌گیری

درمجموع، این مقاله مروری نشان می‌دهد عصاره‌های مختلف به‌دست‌آمده از قارچ ری‌شی دارای خواص ضدپیری قابل اندازه‌گیری و قابل مشاهده به‌ویژه در سه بافت قلبی، کبدی و مغزی هستند. این اثرات عمدتاً از طریق تنظیم سیستم ایمنی، مقابله با اکسیداسیون، به دام انداختن رادیکال‌های آزاد، افزایش دهیدروژنازهای میتوکندری، تقویت عناصر مجموعه‌های ۱ و ۲ زنجیره انتقال الکترون و پیشگیری از تحلیل عصبی ناشی از تنش اکسیداتیو اعمال می‌شوند. حضور مولکول‌های فعال زیستی مختلف در این قارچ به‌ویژه پلی‌ساکاریدها و تری‌ترپن‌ها اهمیت این قارچ را در تحقیقات مرتبط با پیری پررنگ کرده است (جدول شماره ۲). از آنجایی که متابولیت‌های زیست‌فعال قارچ ری‌شی افق‌های جدیدی برای ساخت داروهای طبیعی جدید جهت جلوگیری از پیری در اختیار می‌گذارند، به دست آوردن یک تصویر کامل از تمام ترکیبات و عصاره‌های ضدپیری موجود در قارچ ری‌شی از اهمیت بالایی برخوردار است. اما همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه شواهد بالینی انسانی بیشتری برای ارائه توضیحی جامع از مکانیسم‌های زیربنایی خاصیت ضدپیری قارچ ری‌شی مورد نیاز است. با توجه به وجود چندین گونه از قارچ جنس گانودرما و از جمله ری‌شی (گانودرما لوسیدوم) در محیط طبیعی ایران از یک سو و تأیید اثرات آنتی‌اکسیدانی قابل ملاحظه قارچ‌های دارویی بومی ایران در مقایسه با انواع تجاری آن از سوی دیگر، قارچ‌های بومی جنس گانودرما و به‌خصوص قارچ ری‌شی در کشور ما می‌تواند در زمینه اثرات ضدپیری آن مورد مطالعه جدی‌تری قرار گیرد. اما در حال حاضر، جای خالی تحقیقات آزمایشگاهی، حیوانی و بالینی بر روی اثرات ضدپیری انواع بومی قارچ‌های جنس گانودرما در کشور ما احساس می‌شود. نتایج چنین تحقیقاتی علاوه بر ارزش علمی - پژوهشی، از حیث کاربرد در صنایع آرایشی - بهداشتی و دارویی در کشور ما مهم تلقی می‌شود، چراکه می‌تواند سنگ بنای صحیحی را برای استارت آب‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان علاقه‌مند به ورود به کاربردهای آرایشی - بهداشتی عصاره‌ها و ترکیبات قارچ ری‌شی پایه‌گذاری کند و از برخی ساده‌انگاری‌های غیرعلمی متکی بر نگاه صرفاً تجاری در مورد خواص ضدپیری قارچ ری‌شی و تأثیر منفی آن بر سلامت و بهداشت عمومی جامعه جلوگیری نماید. مطالعات حیوانی بر روی تأثیر عصاره‌های قارچ گانودرما لوسیدوم در جلوگیری از آسیب به بافت مغزی و جلوگیری از اختلالات نورودژنراتیو به‌طور محسوسی اندک است. بدون این مطالعات امکان کاربردی کردن نتایج آزمایشگاهی در کارآزمایی‌های بالینی وجود ندارد. همچنین مطالعات حیوانی و

32. *Caenorhabditis elegans*

33. DNA microarrays

34. Nonsense-mediated mRNA decay

کارآزمایی بالینی باید با ترکیبات شناخته شده منفرد و جدا (و نه عصاره) انجام شود. در سال‌های اخیر تمرکز مطالعات بر کشف مکانیسم‌های مولکولی و انجام آزمایشات حیوانی و کارآزمایی بالینی بوده است.

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

هیچ داده‌ای در حمایت از نتیجه‌گیری ما در پژوهش حاضر ساخته و دستکاری نشده است. تمام مطالعات در دسترس در این زمینه، برای بررسی گنجانده شده است.

حامی مالی

این تحقیق هیچ‌گونه کمک مالی از سازمان‌های تأمین مالی در بخش‌های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

مشارکت‌نویسندگان

گردآوری داده‌ها و جست‌وجو در منابع: شراره رضائیان؛ نوشتن و ویرایش مقاله: حمیدرضا پوریان‌فر؛ تصحیح و تأیید نسخه نهایی مقاله: شراره رضائیان و حمیدرضا پوریان‌فر.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

References

- [1] Rezaeian SP, Hamid R. [Principles of cultivation of medicinal mushrooms the Iran perspective (Persian)]. Mashhad: Jahad Daneshgahi Publications; 2017.
- [2] Mojani Qomi MS, Hatami M. [Effects of powder, extracts, and components of *Ganoderma lucidum* in treatment of diabetes (Persian)]. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2021; 29(4):86-101. [DOI:10.32598/JGUMS.29.4.1509.1]
- [3] Wang J, Cao B, Zhao H, Feng J. Emerging roles of *ganoderma lucidum* in anti-aging. Aging and Disease. 2017; 8(6):691-707. [DOI:10.14336/AD.2017.0410] [PMID] [PMCID]
- [4] Tajalli F, Malekzadeh K, Soltanian H, Janpoor J, Rezaeian S, Pourianfar HR. Antioxidant capacity of several Iranian, wild and cultivated strains of the button mushroom. Brazilian Journal of Microbiology. 2015; 46(3):769-76. [DOI:10.1590/S1517-838246320140180] [PMID] [PMCID]
- [5] Kayali R, Çakatay U, Akçay T, Altuğ T. Effect of alpha-lipoic acid supplementation on markers of protein oxidation in post-mitotic tissues of ageing rat. Cell Biochemistry and Function. 2006; 24(1):79-85. [DOI:10.1002/cbf.1190] [PMID]
- [6] Muscari C, Giaccari A, Giordano E, Clò C, Guarnieri C, Caldarera CM. Role of reactive oxygen species in cardiovascular aging. In: Krause EG, Vetter R, editors. Biochemical mechanisms in heart function. Boston: Springer; 1996. [DOI:10.1007/978-1-4613-1279-6_22]
- [7] Vulevic J, Drakoularakou A, Yaqoob P, Tzortzis G, Gibson GR. Modulation of the fecal microflora profile and immune function by a novel trans-galactooligosaccharide mixture (B-GOS) in healthy elderly volunteers. The American Journal of Clinical Nutrition. 2008; 88(5):1438-46. [DOI:10.3945/ajcn.2008.26242] [PMID]
- [8] Alimadadi N, Pourianfar HR, Amoozegar MA, Zabihi SS, Mahdizadeh V, Shahzadeh Fazeli SA. Molecular identification of some wild medicinal macrofungi from Northern Iran. Studies in Fungi. 2019; 4(1):26-36. [DOI:10.5943/sif/4/1/4]
- [9] Shayan A. [Field guide to Iran's mushrooms (Persian)]. Iran: Iran Shenasi Publications; 2020. [Link]
- [10] Keypour S, Riahi H, Rafati H. A review on the biological active compounds and medicinal properties of *Ganoderma lucidum*. Journal of Medicinal Plants. 2013; 12(46):13-24. [Link]
- [11] Rezaeian S, Saadatmand S, Nejad Sattari T, Mirshamsi Kakhki A. Antioxidant potency of Iranian newly cultivated wild mushrooms of *Agaricus* and *Pleurotus* species. Biomedical Research. 2015; 26(3):534-42. [Link]
- [12] Xia D. Effects of *Ganoderma* polysaccharides on immune function in mice. Journal of Beijing Medical University. 1989; 21:533-7. [Link]
- [13] Lei LS, Lin ZB. [Effects of *Ganoderma* polysaccharides on the activity of DNA polymerase alpha of splenocytes and immune function in aged mice (Chinese)]. Yao Xue Xue Bao. 1993; 28(8):577-82. [PMID]
- [14] Li WJ, Nie SP, Peng XP, Liu XZ, Li C, Chen Y, et al. *Ganoderma atrum* polysaccharide improves age-related oxidative stress and immune impairment in mice. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2012; 60(6):1413-8. [DOI:10.1021/jf204748a] [PMID]
- [15] Yuan S, Yang Y, Li J, Tan X, Cao Y, Li S, et al. *Ganoderma lucidum* Rhodiola compound preparation prevent D-galactose-induced immune impairment and oxidative stress in aging rat model. Scientific Reports. 2020; 10(1):19244. [DOI:10.1038/s41598-020-76249-1] [PMID] [PMCID]
- [16] Wang C, Liu X, Lian C, Ke J, Liu J. Triterpenes and aromatic meroterpenoids with antioxidant activity and neuroprotective effects from *Ganoderma lucidum*. Molecules. 2019; 24(23):4353. [DOI:10.3390/molecules24234353] [PMID] [PMCID]
- [17] Trushina E, McMurray CT. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in neurodegenerative diseases. Neuroscience. 2007; 145(4):1233-48. [DOI:10.1016/j.neuroscience.2006.10.056] [PMID]
- [18] Sudheesh NP, Ajith TA, Ramnath V, Janardhanan KK. Therapeutic potential of *Ganoderma lucidum* (Fr.) P. Karst. against the declined antioxidant status in the mitochondria of post-mitotic tissues of aged mice. Clinical Nutrition. 2010; 29(3):406-12. [DOI:10.1016/j.clnu.2009.12.003] [PMID]
- [19] Cherian E, Sudheesh NP, Janardhanan KK, Patani G. Free-radical scavenging and mitochondrial antioxidant activities of Reishi-*Ganoderma lucidum* (curt: Fr) P. Karst and *Arogyapachatrachopus zeylanicus* Gaertn extracts. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology. 2009; 20(4):289-307. [DOI:10.1515/JBCPP.2009.20.4.289] [PMID]
- [20] Ajith TA, Sudheesh NP, Roshny D, Abishek G, Janardhanan KK. Effect of *Ganoderma lucidum* on the activities of mitochondrial dehydrogenases and complex I and II of electron transport chain in the brain of aged rats. Experimental Gerontology. 2009; 44(3):219-23. [DOI:10.1016/j.exger.2008.11.002] [PMID]
- [21] Yu Q, Nie S, Li W, Li J, Xie M. Anti-aging effect of Polysaccharide of *Ganoderma atrum* on D-Galactose-induced mouse aging model. Shi Pin Ke Xue (Food Science). 2009; 30(17):305-7. [Link]
- [22] Li WJ, Nie SP, Xie MY, Yu Q, Chen Y, He M. *Ganoderma atrum* polysaccharide attenuates oxidative stress induced by d-galactose in mouse brain. Life Sciences. 2011; 88(15-16):713-8. [DOI:10.1016/j.lfs.2011.02.010] [PMID]
- [23] Liu K, Liu YY, Sun F, Ren LQ. Anti-aging effect of recombinant *Ganoderma lucidum* immunomodulatory protein on aging model mice. Chinese Older Medical Journal. 2018; 38:5539-40. [Link]
- [24] Lin X, Pan W. *Ganoderma lucidum* polysaccharide anti-skin senile function research. Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine. 2009; 11:174-5. [Link]
- [25] Dringen R, Gutterer JM, Hirrlinger J. Glutathione metabolism in brain metabolic interaction between astrocytes and neurons in the defense against reactive oxygen species. European Journal of Biochemistry. 2000; 267(16):4912-6. [DOI:10.1046/j.1432-1327.2000.01597.x] [PMID]

- [26] Xiang L, Jie L. Ganoderma lucidum polysaccharide prevents oxidation and skin aging. *Chinese Journal of Tissue Engineering Research*. 2013; 17(41):7272-7. [DOI:10.3969/j.issn.2095-4344.2013.41.013]
- [27] You YH, Lin ZB. Protective effects of Ganoderma lucidum polysaccharides peptide on injury of macrophages induced by reactive oxygen species. *Acta Pharmacologica Sinica*. 2002; 23(9):787-91. [Link]
- [28] Li Y, Liang W, Han Y, Zhao W, Wang S, Qin C. Triterpenoids and polysaccharides from Ganoderma lucidum Improve the Histomorphology and function of testes in Middle-Aged male mice by alleviating oxidative stress and cellular apoptosis. *Nutrients*. 2022; 14(22):4733. [DOI:10.3390/nu14224733] [PMID] [PMCID]
- [29] Smina TP, Joseph J, Janardhanan KK. Ganoderma lucidum total triterpenes prevent γ -radiation induced oxidative stress in Swiss albino mice in vivo. *Redox Report*. 2016; 21(6):254-61. [DOI:10.1080/13510002.2015.1126098] [PMID] [PMCID]
- [30] Hu S, Huang J, Pei S, Ouyang Y, Ding Y, Jiang L, et al. Ganoderma lucidum polysaccharide inhibits UVB-induced melanogenesis by antagonizing cAMP/PKA and ROS/MAPK signaling pathways. *Journal of Cellular Physiology*. 2019; 234(5):7330-40. [DOI:10.1002/jcp.27492] [PMID]
- [31] Zhao Y, Li Q, Wang M, Wang Y, Piao C, Yu H, et al. Structural characterization of polysaccharides after fermentation from Ganoderma lucidum and its antioxidant activity in HepG2 cells induced by H₂O₂. *Food Chemistry: X*. 2023;18:100682. [PMID]
- [32] Lee YH, Kim JH, Song CH, Jang KJ, Kim CH, Kang JS, et al. Ethanol extract of Ganoderma lucidum augments cellular anti-oxidant defense through activation of Nrf2/HO-1. *Journal of Pharmacopuncture*. 2016; 19(1):59-69. [DOI:10.3831/KPI.2016.19.008] [PMID] [PMCID]
- [33] Ding W, Zhang X, Yin X, Zhang Q, Wang Y, Guo C, et al. Ganoderma lucidum aqueous extract inducing PHGPx to inhibit membrane lipid hydroperoxides and regulate oxidative stress based on single-cell animal transcriptome. *Scientific Reports*. 2022; 12(1):3139. [DOI:10.1038/s41598-022-06985-z] [PMID] [PMCID]
- [34] Guo M, Zhang K, Zhang D, Zhou Y, Liu L, Wu Y, et al. Ganoderma atrum polysaccharide relieves mitochondrial dysfunction to alleviate hydrogen peroxide-induced senescence via activating autophagy. *Journal of Future Foods*. 2022; 2(3):241-52. [DOI:10.1016/j.jfutfo.2022.06.005]
- [35] Chiu HF, Fu HY, Lu YY, Han YC, Shen YC, Venkatakrishnan K, et al. Triterpenoids and polysaccharide peptides-enriched Ganoderma lucidum: A randomized, double-blind placebo-controlled crossover study of its antioxidation and hepatoprotective efficacy in healthy volunteers. *Pharmaceutical Biology*. 2017; 55(1):1041-6. [DOI:10.1080/13880209.2017.1288750] [PMID] [PMCID]
- [36] Komaki A, Salehi I, Keymoradzadeh A, Taheri Azandaryani M, Golipour Z. [Effect of long-term exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields on β -amyloid deposition and microglia cells in an alzheimer model in rats (Persian)]. *Journal of Guilan University of Medical Sciences*. 2021; 30(3):218-29. [DOI:10.32598/JGUMS.30.3.1609.2]
- [37] Sun XZ, Liao Y, Li W, Guo LM. Neuroprotective effects of ganoderma lucidum polysaccharides against oxidative stress-induced neuronal apoptosis. *Neural Regeneration Research*. 2017; 12(6):953-8. [DOI:10.4103/1673-5374.208590] [PMID] [PMCID]
- [38] Yoon HM, Jang KJ, Han MS, Jeong JW, Kim GY, Lee JH, et al. Ganoderma lucidum ethanol extract inhibits the inflammatory response by suppressing the NF- κ B and toll-like receptor pathways in lipopolysaccharide-stimulated BV2 microglial cells. *Experimental and Therapeutic Medicine*. 2013; 5(3):957-63. [DOI:10.3892/etm.2013.895] [PMID] [PMCID]
- [39] Hilliard A, Mendonca P, Soliman KFA. Involvement of NF κ B and MAPK signaling pathways in the preventive effects of Ganoderma lucidum on the inflammation of BV-2 microglial cells induced by LPS. *Journal of Neuroimmunology*. 2020; 345:577269. [DOI:10.1016/j.jneuroim.2020.577269] [PMID] [PMCID]
- [40] Huang S, Mao J, Ding K, Zhou Y, Zeng X, Yang W, et al. Polysaccharides from Ganoderma lucidum promote cognitive function and neural progenitor proliferation in mouse model of alzheimer's disease. *Stem Cell Reports*. 2017; 8(1):84-94. [DOI:10.1016/j.stemcr.2016.12.007] [PMID] [PMCID]
- [41] Wang A, Xiao C, Zheng J, Ye C, Dai Z, Wu Q, et al. Terpenoids of Ganoderma lucidum reverse cognitive impairment through attenuating neurodegeneration via suppression of PI3K/AKT/mTOR expression in vivo model. *Journal of Functional Foods*. 2020; 73:104142. [DOI:10.1016/j.jff.2020.104142]
- [42] Čilerdžić JL, Sofrenić IV, Tešević VV, Brčeski ID, Duletić-Laušević SN, Vukojević JB, et al. Neuroprotective potential and chemical profile of alternatively cultivated Ganoderma lucidum basidiocarps. *Chemistry & Biodiversity*. 2018; 15(5):e1800036. [DOI:10.1002/cbdv.201800036] [PMID]
- [43] Liu X, Yang L, Li G, Jiang Y, Zhang G, Ling J. A novel promising neuroprotective agent: Ganoderma lucidum polysaccharide. *International Journal of Biological Macromolecules*. 2023; 229:168-80. [DOI:10.1016/j.ijbiomac.2022.12.276] [PMID]
- [44] Kusaka J, Koga H, Hagiwara S, Hasegawa A, Kudo K, Noguchi T. Age-dependent responses to renal ischemia-reperfusion injury. *The Journal of Surgical Research*. 2012; 172(1):153-8. [DOI:10.1016/j.jss.2010.08.034] [PMID]
- [45] Muroya Y, He X, Fan L, Wang S, Xu R, Fan F, et al. Enhanced renal ischemia-reperfusion injury in aging and diabetes. *American Journal of Physiology*. 2018; 315(6):F1843-54. [DOI:10.1152/ajprenal.00184.2018] [PMID] [PMCID]
- [46] Zhong D, Wang H, Liu M, Li X, Huang M, Zhou H, et al. Ganoderma lucidum polysaccharide peptide prevents renal ischemia reperfusion injury via counteracting oxidative stress. *Scientific Reports*. 2015; 5:16910. [DOI:10.1038/srep16910] [PMID] [PMCID]
- [47] Gurovic MSV, Viceconte FR, Pereyra MT, Bidgain MA, Cubitto MA. DNA damaging potential of Ganoderma lucidum extracts. *Journal of Ethnopharmacology*. 2018; 217:83-8. [DOI:10.1016/j.jep.2018.02.005] [PMID]

- [48] Cuong VT, Chen W, Shi J, Zhang M, Yang H, Wang N, et al. The anti-oxidation and anti-aging effects of *Ganoderma lucidum* in *Caenorhabditis elegans*. *Experimental Gerontology*. 2019; 117:99-105. [DOI:10.1016/j.exger.2018.11.016] [PMID]
- [49] Weng Y, Xiang L, Matsuura A, Zhang Y, Huang Q, Qi J. Ganodermasides A and B, two novel anti-aging ergosterols from spores of a medicinal mushroom *Ganoderma lucidum* on yeast via UTH1 gene. *Bioorganic & Medicinal Chemistry*. 2010; 18(3):999-1002. [DOI:10.1016/j.bmc.2009.12.070] [PMID]
- [50] Weng Y, Lu J, Xiang L, Matsuura A, Zhang Y, Huang Q, et al. Ganodermasides C and D, two new anti-aging ergosterols from spores of the medicinal mushroom *Ganoderma lucidum*. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*. 2011; 75(4):800-3. [DOI:10.1271/bbb.100918] [PMID]