

بررسی فراوانی نسبی فاکتورهای همراه پولیپ در بیماران تحت عمل پولیپکتومی

در بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) رشت

دکتر هوشنگ گرامی* - دکتر عبدالرحیم کوشان* - دکتر کامبیز فرقان پرست** - دکتر حمیدرضا کریمی***

*استادیار گروه گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

**دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

***دستیار گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ دریافت مقاله: ۸۵/۴/۳۱

تاریخ پذیرش: ۸۵/۱۰/۳۰

چکیده

مقدمه: پولیپ بینی ساکی مخاطی حاوی ادم، بافت فیبرو، رگ، سلول‌های التهابی و غده است که از مخاط بینی یا سینوس‌ها ی اطراف بینی منشاء می‌گیرد و از شایع ترین توده‌های خوش‌خیم بینی محسوب می‌شود.

هدف: بررسی فراوانی نسبی برخی عوامل همراه پولیپ بینی در بیماران پولیپکتومی شده مراجعه کننده به بخش گوش، گلو و بینی و جراحی سر و گردن بیمارستان امیرالمؤمنین رشت.

مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود و در این تحقیق پروندهای بیشکی پولیپکتومی در سال‌های ۱۳۸۳-۸۴ بررسی شدند. متغیرهای مورد بررسی شامل: سن، جنس، ابتلای به آسم، وجود پولیپ دوطرفه، حساسیت به آسپرین، دیابت، آتوپی، مصرف سیگار، ائوزینوفیلی، گروه خون و حساسیت به پنی‌سیلین بوده است. نتایج: از ۱۰۲ بیمار پولیپکتومی شده، ۴۳٪ زن و ۵۷٪ مرد بودند. تنها ۱۸/۶٪ آنان سابقه پولیپکتومی داشتند. ۵۷/۸٪ پولیپ دوطرفه و بقیه (۴۲/۲٪) پولیپ یک‌طرفه داشتند. فراوانی آسم، حساسیت به آسپرین ۱/۹٪، دیابت، ۷/۸٪، آتوپی، ۹/۹٪ و حساسیت به پنی‌سیلین، ۰/۹٪ بود. ۱۴/۷٪ بیماران سیگاری بودند و ائوزینوفیلی در ۱۱/۷٪ بیماران وجود داشت.

نتیجه‌گیری: آسم، حساسیت به آسپرین و پنی‌سیلین نسبت به سایر گزارش‌ها شیوع کمتری داشت. با این حال بهتر است بورسی‌های بیشتر برای تعیین شیوع عوامل همراه پولیپ بینی در جمیعت عمومی انجام شود.

کلید واژه‌ها: آسپرین/ آسم/ پنی‌سیلین‌ها/ پولیپ‌های بینی/ دیابت شیرین

مقدمه

پولیپ بینی در جمیعت عادی ۱ تا ۴٪ است(۷-۹) و در کودکان کمتر است جز در مواقعي که با فیبروز کیستی همراه باشد(۱۰). پولیپ‌ها معمولاً در سن ۳۰ تا ۴۰ سالگی ظاهر می‌شوند. بروز آن در مردان بسیار بیشتر و قابل توجه است(نسبت ۲ به ۱ و ۴ به ۱)(۱۱). از کارافتادگی(Morbidity) ناشی از پولیپ بستگی به محل و اندازه آن دارد. پولیپ بینی می‌تواند بر کیفیت زندگی بیش از رینیت آرژیک دائمی مؤثر باشد(۱۲). تقریباً در ۳۰٪ این بیماران نتیجه آزمایش نسبت به مواد

پولیپ‌های بینی شایع ترین توده‌های خوش‌خیم بینی هستند که التهاب غشای مخاطی بینی و سینوس‌ها ایجاد می‌شوند. علت این بیماری مشخص نیست(۱-۴). مشخصه آن وجود توده‌های دچار ادم از مخاط ملتهب است که ساقه‌دار بوده و بر پایه پهنه یا نازکی استوار شده است. اغلب پولیپ‌ها از کمپلکس اوستئومتال منشاء می‌گیرند(۵) که به داخل حفره بینی کشیده شده و سبب انسداد بینی، ترشح، از دست رفتن حس بویایی، سردرد و کاهش کیفیت زندگی می‌شوند(۶). به طور کلی شیوع

نویسنده مسئول: دکتر هوشنگ گرامی؛ رشت- خیابان ۱۷ شهریور- پشت دادگستری- بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)- واحد آموزش

دو طرفه بودن (به معاینه قبل از عمل یا یافته‌های حین عمل استناد می‌شد).

حساسیت به پنی‌سیلین (چون پروتکل درمانی قبل و بعد از جراحی، تجویز پنی‌سیلین یا هم خانواده‌های آن است، در همه بیماران، تست پنی‌سیلین انجام و در پرونده ثبت شد).

حساسیت به آسپیرین (چون حساسیت به آسپیرین تست تشخیصی پوستی و تست دوز معین ندارد، در نتیجه سابقه کهیر، آنژیو ادم و واکنش‌های آنافیلاکسی پس از مصرف آسپیرین و NSAIDs، می‌تواند حساسیت به آسپیرین را مطرح کند و نبود چنین مواردی نداشتن حساسیت را بیان می‌نماید).

آتوبی (بیمارانی هستند که اختلال وابسته به IgE و آلرژی به صورت افزایش پاسخ‌دهی در اعضای مورد نظر مثل ریه، پوست و بینی تظاهر می‌کند. لذا در این موارد به تاریخچه و پرونده بیماران استناد شد).

اُوزینوفیلی (تعداد شمارش اُوزینوفیل بیش از ۵۰۰ عدد در میکرو لیتر خون) (۲۴).

در ضمن بیمارانی در تحقیق وارد شدند که برای بار اول کاندیدای جراحی شده بودند یا اینکه روش‌های جراحی قبلی در آنها غیر آندوسکوپی بود.

نتایج

۱۰۲ نفر از بیماران دچار پولیپ بینی بررسی شدند. توزیع فراوانی ابتلای به پولیپ بر حسب جنس نشان داد که ۴۴ نفر (۴۳٪) زن و ۵۸ نفر (۵۷٪) مرد بودند. کمترین سن ابتلا ۹ ساله و بیشترین آن در ۷۶ سالگی بدست آمد (جدول ۱). سابقه پولیپکتومی قبلی در ۱۹ نفر (۱۸/۶٪) وجود داشت و در بقیه یعنی ۸۳ نفر (۸۱/۳٪) منفی بود. وجود پولیپ دو طرفه در ۵۷/۸٪ بیماران گزارش شد در حالی که ۴۲/۱٪ دچار پولیپ

حساسیت‌زای محیطی مثبت است. با این وجود احتمال ایجاد بیماری به علت آلرژی، جای تردید دارد (۵۰/۱۳).

شیوع پولیپ در بیماران دچار فیبروز کیستیک و حساسیت شدید به آسپیرین سه برابر است. با وجود اهمیت اپیدمیولوژی پولیپ و عوامل همراه، اطلاعات دقیقی در دست نیست و گزارش‌های کمی در این مورد به ثبت رسیده است (۱۱). با پی بردن به درصد فراوانی عوامل همراه این بیماری می‌توان با پیشگیری، از عوارض بیشتر پولیپ جلوگیری کرد.

در ایران بررسی‌های اپیدمیولوژی در این مورد کم بوده است. لذا هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی نسبی عوامل همراه پولیپ بینی در بیماران پولیپکتومی است.

مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی است، پرونده بیماران دچار پولیپ که در سال‌های ۸۳ و ۸۴ در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) رشت پولیپکتومی شده بودند بررسی شد. پرسشنامه جمع‌آوری داده‌ها تهیه شدو پس از تکمیل، تجزیه و تحلیل نهایی با نرم‌افزار آماری SPSS.10 و آمار توصیفی انجام شد.

پرسشنامه شامل موارد زیر بود:

سن، جنس، گروه خونی، مصرف سیگار (تعداد در روز و سال‌های مصرف)،

آسم (متخصصان بیهوشی کلیه بیماران را قبل از عمل معاينه می‌کردند و در صورت سابقه علائم آسم یا مصرف داروهای آن، کاندیدای اسپیرومتری و ویزیت متخصص ریه می‌شدند که بدین ترتیب تشخیص آسم محرز یا رد می‌شد) (۲۴).

دیابت (در صورت بالاتربودن قندخون ناشتا، از mg/dl ۱۲۶، بار دیگر بررسی می‌شد و در صورت دو نوبت بالای از ۱۲۶ mg / dl، تشخیص دیابت مطرح می‌شد).

التهاب مزمن بینی سبب بروز پولیپ بینی می‌شود. وضعیت‌های مختلفی با ایجاد پولیپ مربوطند. رینیت آرژیک و غیرآرژیک، سینوزیت آرژیک قارچی، حساسیت به آسپیرین، آسم، سندرم چرج-اشترووس (تب، آسم، ائوزینوفیلی و گرانولوما) از جمله این موارد هستند. پولیپ بینی معمولاً در سن ۳۰ تا ۴۰ سالگی ظاهر می‌شود(۱۱). نتایج مطالعه ما نشان داد که پولیپ بینی با بیشترین فراوانی در دو گروه سنی ۱۰-۱۹ و ۲۰-۲۹ ساله مشابه و ۲۵/۴٪ است. در حالی‌که در مطالعات دیگر بروز آن در بالای ۲۰ سالگی بدست آمده و در سن پائین‌تر کمتر شایع است(۱۴). تفاوت جنسی در بروز آن گزارش نشده، اما در بررسی Kirts Reesakul، بروز پولیپ بینی در مردان بسیار بیشتر و قابل توجه به نسبت ۲ به ۱ و ۴ به ۱ بوده است(۱۱). در مطالعه افتخاری نیز شیوع پولیپ آنتروکوآنال و پولیپ ساده، در مردان بیشتر و نسبت مرد به زن در پولیپ ساده و پولیپ آنتروکوآنال، به ترتیب، ۱/۵ به ۱ و ۵/۵ به ۱ بدست آمد(۱۵). در بررسی ما تفاوت قابل توجهی بین ابتلای زنان(۴۳٪) و مردان(۵۷٪) گزارش نشد. ۸۱/۴٪ بیماران برای اولین بار بود که پولیپکتومی می‌شدند و تنها ۱۸/۶٪ آنها سابقه ای از پولیپکتومی قبلی را ذکر می‌کردند. با توجه به جوان بودن اکثر بیماران (بیش از ۵۰٪ آنان در رده‌های سنی ۱۰-۲۹ سالگی) قراردادشند، قاعده‌تاً انتظار می‌رود که اکثر بیماران سابقه ای از پولیپکتومی نداشته باشند. در بررسی افتخاری در ۹۳٪ موارد پولیپ آنتروکوآنال، یک سویه و در ۶۹/۵٪ در سمت راست بود، اما پولیپ ساده، در ۷۸٪ موارد دو سویه بود. در بررسی ما ۵۷/۸٪ بیماران پولیپ دوطرفه و ۴۲/۲٪ آنها پولیپ یکطرفه داشتند که نشانده شیوع بالای پولیپ دوطرفه در جامعه مورد مطالعه است(۱۵) که مشابه آمارهای ارائه شده در مطالعات

یکطرفه بودند. توزیع فراوانی ابتلای به آسم، حساسیت به آسپیرین، دیابت، آتوپی و حساسیت به پنی سیلین در جدول ۲ ارائه شده است. توزیع فراوانی مصرف سیگار در ۱۵ نفر (۱۴/۷٪) از بیماران مثبت و در بقیه یعنی ۸۷ نفر (۸۵/۳٪) منفی بود. بیشترین بیماران گروه خونی O مثبت داشتند: ۴/۳۳٪ و پس از آن به ترتیب A مثبت ۵/۲۸٪، B مثبت در ۹/۲۱٪، AB مثبت در ۳/۷/۸٪ منفی ۲/۳٪، A منفی ۲/۹۸٪، B منفی ۲/۹۸٪ AB منفی در ۷/۶۸٪ بدست آمد ۱۲ نفر (۱۱/۷٪)، ائوزینوفیلی داشتند.

جدول ۱: توزیع فراوانی سن در بیماران تحت عمل پولیپکتومی

سن(سال)	تعداد(٪)
<۹	۱۰/۹
۱۰-۱۹	۲۶/۲۵/۴
۲۰-۲۹	۲۶/۲۵/۴
۳۰-۳۹	۱۷/۱۶/۶
۴۰-۴۹	۹/۸/۸
۵۰-۵۹	۱۳/۱۲/۷
۶۰-۶۹	۸/۷/۸
>۷۰	۲/۱/۹
جمع	۱۰۲/۱۰۰

جدول ۲: توزیع فراوانی آسم، آتوپی و حساسیت به آسپیرین و پنی سیلین در بیماران تحت عمل پولیپکتومی

متغیر	تعداد(٪)
آسم	۷/۶/۸
آتوپی	۱۰/۹/۸
حساسیت به آسپیرین	۲/۱/۹
حساسیت به پنی سیلین	۱۰/۹
جمع	۱۰۲/۱۰۰

بحث و نتیجه‌گیری
پولیپ بینی با التهاب عفونی یا غیرعفونی و ناهنجاری آنatomی و ژنتیکی همراه است. طبق اغلب فرضیه‌ها،

آلرژیک بودند. شیوع ۱۰ درصدی رینیت آلرژیک در بررسی طبرستانی اختلاف قابل توجهی با آمار بدست آمده ندارد(۲۲). از کل بیماران ۷/۱۴٪ نسیگاری بودند گه همه آنها را مردان تشکیل می‌دادند(۸٪). با توجه به زمینه‌های فرهنگی جامعه مورد مطالعه شیوع کمتر مصرف سیگار در زنان قابل توجیه است. البته شیوع ۷/۱۴٪ بسیار کمتر از بررسی‌های مشابه یعنی ۵٪(۲۳) است(۲۳) که شاید به علت مصرف کمتر سیگار در جامعه ما باشد.

در صد گروه‌های خونی A₁O و B مثبت به ترتیب: ۴/۳۳، ۵/۲۸ و ۹/۲۱ بیشترین میزان فراوانی را در افراد داشتند. در بررسی طبرستانی نیز گروه‌های خونی A₁O، B مثبت از بیشترین میزان فراوانی برخوردار بودند(۲۲).

پولیپ بینی بیماری چند فاکتوری با اتیولوژی‌های مختلف است. هیچ‌کدام از علل مطرح شده به تنها ی توجیه‌کننده پاتوژن پولیپ بینی نیست. در اغلب تئوری‌های موجود تأثیر التهاب مزمن و پایدار بینی پولیپ بینی مطرح می‌شود. التهاب مزمن و پایدار بینی صرفنظر از اتیولوژی آن یک فاکتور مسلم در ایجاد پولیپ بینی محسوب می‌شود. چون آمارهای بدست آمده از شیوع بیمارستانی پولیپ و ارتباط آن با برخی عوامل همراه در جامعه محدودی از افراد مبتلا انجام شده است پیشنهاد می‌شود، مطالعات بیشتر در مورد شیوع پولیپ بینی در حجم گسترده‌تر و در جمعیت عادی انجام گیرد.

دیگر است.

فرضیه‌های مختلفی در مورد نحوه ایجاد پولیپ مطرح شده است. تئوری اول ارتباط بین آلرژی و پولیپ است. اغلب پولیپ‌های بینی با ائزوینوفیلی و آسم ارتباط دارند و نشانه‌های آلرژی را تقلید می‌کنند. ممکن است آرژن‌های تنفسی به خصوص آرژن‌های دائمی که از راه هوا منتقل می‌شوند، نقش آشکاری در پاتوژن پولیپ داشته باشند. به این صورت که سبب تحریک دائم مخاط بینی و سینوس‌ها بشوند.

در مطالعه، آسم در ۸/۶٪ بیماران وجود داشت که شیوعی بسیار کمتر از آمارهای جهانی (۴۰-۲۰٪) را نشان می‌دهد(۱۶). ممکن است علت آن کشف یا شیوع کمتر پولیپ در بیماران آسمی و در نتیجه مراجعت کمتر این بیماران برای پولیپکتومی باشد. البته امکان دارد که ارتباط اتیولوژی آسم با پولیپ در جامعه ما کمتر باشد که یافتن پاسخ به این سوال نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. حساسیت به آسپرین در ۹/۱٪ بیمار(۱۶) دیده شد که تفاوت قابل توجهی با آمارهای ذکر شده در مراجع(۲۶-۸٪) دارد(۱۷) با توجه به تفاوت قابل توجه شیوع آسم و حساسیت به آسپرین در بیماران به نظر می‌رسد تفاوتی در اتیولوژی پولیپ بین این بیماران وجود داشته باشد. در بررسی ما حساسیت به پنی سیلین در یک بیمار دیده شد که نسبت به سایر آمار(۷٪) بسیار کمتر است(۱۸). دیابت در ۸/۷٪ افراد وجود داشت که تقریباً برابر شیوع آن در جامعه است(۱۰٪)(۱۹). شیوع آتوپی ۸/۹٪ بود که همه آنها دچار رینیت

منابع

- Dykewicz MS, Fineman S, Skoner DP, Nicklas R, Lee R, Blessing-Moore J, Li JT, Bernstein IL, Berger W, Spector S, Schuller D. Diagnosis and Management of Rhinitis: Complete Guidelines of the Joint Task Force on Practice Parameters in

Allergy, Asthma and Immunology. Ann Allergy Asthma Immunol 1998; 81(5 Pt 2):478-518.

- Settipane GA, Klein DE, Settipane RJ. Nasal Polyps. State of the Art. Rhinol Suppl 1991; 11: 33-6.

3. Lund VJ .Diagnosis and Treatment of Nasal Polyps. BMJ 1995; 311(7017): 1411-4.
4. Mygind N, Dahl R, Bachert C. Nasal polyposis, Eosinophil Dominated Inflammation, and Allergy. Thorax 2000; 55(Suppl 2): S79-83.
5. Slavin RG.Nasal Polyps and Sinusitis. JAMA 1997; 278(22):1849-54.
6. Assanasen P, Naclerio RM. Antiallergic Anti-Inflammatory Effects of H1-antihistamines in Humans. Clin Allergy Immunol 2002;17:101-39.
7. Weschta M, Rimek D, Formanek M, Polzehl D, Riechelmann H. Local Production of Aspergillus Fumigatus Specific Immunoglobulin E in Nasal Polyps. Laryngoscope 2003; 113(10):1798-802.
8. Settipane GA.Epidemiology of Nasal Polyps. Allergy Asthma Proc 1996; 17(5):231-6.
9. Klossek JM, Neukirch F, Pribil C, Jankowski R, Serrano E, Chanal I, El Hasnaoui A. Prevalence of Nasal Polyposis in France: A Cross-Sectional, Case-Control Study. Allergy 2005; 60(2):233-7.
10. Larsen PL, Tos M, Baer S. En bloc removal of the Ethmoid and Ostialmeatal Complex in Cadavers, with a Practical Application. Rhinology 1994; 32(2): 62-4.
11. Kirtsreesakul V.Update on Nasal Polyps: Eiopathogenesis. J Med Assoc Thai 2005; 88(12): 966-72.
12. Mcclay JE.Nasal Polyps.Available in :www.emedicine.com/ped/topic 1550.htm
13. Kirtsreesakul V. Nasal Polyps: The Relationship to Allergy, Sinonasal Infection and Histopathological Type. J Med Assoc Thai 2004; 87(3): 277-82
14. Pawankar R. Nasal Polyposis: An Update. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 2003; 3(1):1-6.
- ۱۵- اقتداری، فردین؛ اقتداری، معصومه: پولیپ آنتروکوآنال: بررسی سه ساله در شیراز (۱۳۷۶ تا ۱۳۷۴). مجله تحقیقات پزشکی (فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، ۱۳۸۲؛ دوره ۱ شماره ۴، صص: ۶۰-۶۶.
16. Drake Lee AB.Nasal polyps. In: Scott-brown's Otolaryngology. Vol 4. Oxford; Batter worth-Heinemann, 1997.ch10:1-6.
17. szceklik A, Nizankowska E, Sanak M, Swierczynska M. Aspirin Induced Rhinitis and Asthma.Curr Opin Allergy Immunol 2001;1:27-33.
18. Deweese HR.Saunder's Otolaryngology, Head and Neck.8th ed. Philadelphia; Mosby, :
19. Braunwald E,Fauci DL,Hausler SL,Longo DL,Larry J.Harrison's Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York; MG Grow-Hill,2004.
20. Larsen K, Tos M. Clinical Course of Patients with Primary Nasal Polyps. Acta Otolaryngol 1994; 114:556-9.
21. Caplin I, Haynes JT. Possible Genetic Links Between Cystic Fibrosis of the Pancreas and Aspirin Sensitive Asthma. Ann Allergy. 1973; 31(7): 320-7.
- ۲۲- طبرستانی، مجتبی. خون‌شناسی پزشکی. مشهد. سازمان چاپ و نشر مشهد، ۱۳۶۴
23. Collins MM, Pang YT, Loughrans Wilson JA. Environment Risk Factors and Gender in Nasal Polyposis. Clinical Otolaryngology & Allied Science 2002; 27:314.
24. Robert M. Kliegman, Karen J. Marcdante, Hal B. Jenson, Richard E. Behrman Nelson Essentials of Pediatrics 2004; 744- 786.

Survey the Frequency of Associated Factors with polyps in Patients who Polypectomized at Amir-Al-Momenin Hospital/ Rasht

Gerami H.(MD), Koosha A.R(MD), Forghan Parast K.(MD), Karimi HR(MD)

Abstract

Introduction: Nasal polyps are mucosal sac which contain edema, fibrian tissue, vessels, inflammatory cell and glands which origin from paranasal sinuses and nasal mucosa and is one of the most common benign nasal mass.

Objective: Determine the relative frequency of some associated factors in patient with nasal polyp who operated at Amir- Al Momenin hospital, Rasht.

Materials and Methods: This is a analytical- descriptive study; which files of patients with nasal polyps who underwent polypectomy at Amir-Al-Momenin hospital during 2003-4 were collected. Variables including age, gender, history of previous polypectomy, smoking, blood group, serum eosinophilia, bilateral polyp, presence of polyp in the other side, presence of asthma, penicillin allergy, aspirin intolerance, diabetes and atopy were studied.

Results: Put of 102 patients with nasal polyps 43% were female and 57% were male. More than 50% of patients were in 10-19 and 20-29 years age group. Only 18.6% of them had a history of previous polypectomy.57% of them had bilateral polyps and 42.2% had unilateral ones. Incidence of asthma, aspirin intolerance, diabetes, atopy and penicillin intolerance in these patients were 6.8%, 1.9%, 8.8%, 9.7% and 0.9%. 14.7% of patients were smoker. Eosinophilia was seen in 11.7% of the patient.

Conclusion: Asthma, aspirin intolerance, penicillin allergy are seen with lower frequency than other reports so researcher advised to perform more study to determine the prevalence of associated factors with nasal polyps in population.

Key words: Aspirin/ Asthma/ Diabetes Mellitus/ Nasal Polyp/ Penicillins